

# Dynamika punktu materialnego

B. Szafran

3 marca 2022

Ciało o masie  $m = 1\text{kg}$  porusza się w potencjale

$$V(x) = -\exp(-x^2) - 1.2 \exp(-(x-2)^2) [J] \quad (1)$$

W chwili początkowej ciało znajduje się w spoczynku  $v = 0$  w punkcie  $x = 2.8\text{m}$ .

Definicja prędkości:

$$\frac{dx}{dt} \equiv v \quad (2)$$

II zasada Newtona:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{m} \frac{dV}{dx} \quad (3)$$

## Jawny Schemat Eulera.

Dla  $x_n \equiv x(n\Delta t)$ ,  $v_n \equiv (v(n\Delta t))$

$$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t \quad (4)$$

$$v_{n+1} = v_n - \frac{1}{m} \frac{dV}{dx} \Big|_{x_n} \Delta t \quad (5)$$

### zadanie 1. całkowanie równań ruchu jawnym schematem Eulera (25 pkt).

Narysować  $x(t)$ ,  $v(t)$ , energię kinetyczną  $E_k(t) = mv(t)^2/2$ , potencjalną  $V(x(t))$ , oraz całkowitą  $E_k(t) + V(t)$  dla  $t \in (0, 30)$  dla kroku czasowego  $\Delta t = 0.01\text{s}$  oraz  $\Delta t = 0.001\text{s}$ .

Narysować portret fazowy  $(x(t), v(t))$  dla  $t \in (0, 100)$  oraz  $t \in (0, 1000)$ , dla  $\Delta t = 0.01\text{s}$  oraz  $\Delta t = 0.001\text{s}$

### Opory ruchu

Do wzoru (3) dodajemy czynnik oporów ruchu:  $\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{m} \frac{dV}{dx} - \alpha v$  z parametrem tłumienia  $\alpha > 0$ . Schemat (5) przybiera formę

$$v_{n+1} = v_n - \frac{1}{m} \frac{dV}{dx} \Big|_{x_n} \Delta t - \alpha v_n \Delta t. \quad (6)$$

### zadanie 2. całkowanie równań z oporami ruchu (25 pkt).

Wstawiamy  $\Delta t = 0.01\text{s}$  oraz  $\alpha = 0.5, 5, 201$ . Powtarzamy rachunki z zadania (2).

### Całkowanie równań ruchu wzorem trapezów

We wzorze trapezów zmiana położenia i prędkości brana jest na podstawie średniej arytmetycznej z chwil  $n$  oraz  $n+1$

- $x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2} (v_{n+1} + v_n)$
- $v_{n+1} = v_n + \frac{\Delta t}{2} \left( -\frac{1}{m} \frac{dV}{dx} \Big|_{x_{n+1}} - \alpha v_{n+1} - \frac{1}{m} \frac{dV}{dx} \Big|_{x_n} - \alpha v_n \right)$

Ze względu na obecność prędkości z chwili  $n + 1$  po prawej stronie równania wykonanie kroku czasowego wymaga rozwiązania układu równań nieliniowych  $F_1 = 0$  oraz  $F_2 = 0$  dla

- $F_1(x_{n+1}, v_{n+1}) = x_{n+1} - x_n - \frac{\Delta t}{2} v_{n+1} - \frac{\Delta t}{2} v_n$
- $F_2(x_{n+1}, v_{n+1}) = v_{n+1} - v_n - \frac{\Delta t}{2} \left( -\frac{1}{m} \frac{dV}{dx} \Big|_{x_{n+1}} - \alpha v_{n+1} \right) - \frac{\Delta t}{2} \left( -\frac{1}{m} \frac{dV}{dx} \Big|_{x_n} - \alpha v_n \right)$

$x_{n+1}$  oraz  $v_{n+1}$  wyznaczymy metodą iteracyjną, przy czym  $x_{n+1}^\mu$  oraz  $v_{n+1}^\mu$  oznacza wartości w  $\mu$ -tej iteracji. Przy tych oznaczeniach przepis metody Newtona dla układu równań ma postać:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial F_1}{\partial v_{n+1}} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial F_2}{\partial v_{n+1}} \end{pmatrix} \Big|_{x_{n+1}^\mu, v_{n+1}^\mu} \begin{pmatrix} x_{n+1}^{\mu+1} - x_{n+1}^\mu \\ v_{n+1}^{\mu+1} - v_{n+1}^\mu \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_1(x_{n+1}^\mu, v_{n+1}^\mu) \\ F_2(x_{n+1}^\mu, v_{n+1}^\mu) \end{pmatrix}, \quad (7)$$

która przy naszym układzie równań redukuje się do

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{\Delta t}{2} \\ \frac{\Delta t}{2m} \frac{d^2V}{dx^2} \Big|_{x_{n+1}^\mu} & 1 + \frac{\Delta t}{2} \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n+1}^{\mu+1} - x_{n+1}^\mu \\ v_{n+1}^{\mu+1} - v_{n+1}^\mu \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_1(x_{n+1}^\mu, v_{n+1}^\mu) \\ F_2(x_{n+1}^\mu, v_{n+1}^\mu) \end{pmatrix} \quad (8)$$

**zadanie 3. Iteracja we wzorze trapezów (25 pkt).**

Wstawić  $\alpha = 0$ ,  $\Delta t = 0.01s$ . Iterujemy równanie kilka razy aż osiągniemy  $F_1 = F_2 = 0$  z zadowalającą dokładnością. Udokumentować zbieżność dla pierwszego kroku czasowego.

**zadanie 4. Całkowanie równań ruchu metodą trapezów (25 pkt).**

Powtórzyć zadanie 1 (dla  $\alpha = 0$ ) oraz 2 wzorem trapezów.