

ALGEBRA WYŻSZA

materiały do wykładu dla kierunku Informatyka stosowana WFiIS AGH

Elżbieta Adamus

Wydział Matematyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kraków 2023

References

- [1] Z. Furdzik, J. Maj-Kluskowa, A. Kulczycka, M. Sękowska, *Nowoczesna matematyka dla inżynierów. Część I - Algebra*, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1993
- [2] B. Gleichgewicht, *Algebra*, PWN, Warszawa, 1983, wydanie III zmienione
- [3] T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, *Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory*, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2020, wydanie XXII
- [4] T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, *Algebra liniowa. Definicje, twierdzenia, wzory*, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2015, wydanie VIII poprawione

TEMAT: Zbiory i relacje. Działania i wybrane struktury algebraiczne

1.1 Zbiory i relacje

Definicja 1.1.1. Parą uporządkowaną (a, b) nazywamy zbiór $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ podzbiorów zbioru $\{a, b\}$.

a - element
 $\{a\}$ - zbiór 1-elementowy
 SINGLETON
 $\{a, b\}$ - zbiór 2-element.
 $\{\{b, a\}\}$

Twierdzenie 1.1.2. Dwie pary $(a, b), (c, d)$ są równe wtedy i tylko wtedy, gdy $a = c \wedge b = d$.

Możemy zdefiniować n -kę uporządkowaną:

$$\begin{aligned} (a_1, a_2, a_3) &:= ((a_1, a_2), a_3) \\ (a_1, a_2, a_3, a_4) &:= ((a_1, a_2, a_3), a_4) \\ &\dots \\ (a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) &:= ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n) \end{aligned}$$

Można uzasadnić, że

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} a_i = b_i.$$

Definicja 1.1.3. *Iloczynem kartezjańskim* zbiorów A i B nazywamy zbiór

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}.$$

Analogicznie definiujemy

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}.$$

Oznaczamy $A^2 = A \times A$ oraz $A^n = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n\text{-razy}}$.

Przykład 1.1.4. Wyznacz $A \times B, B \times A, B^2$.

i) $A = \{3, 4, 5\}, B = \{5, 7\}$

$$A \times B = \{(3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 5), (5, 7)\}$$


$$B \times A = \{(5, 3), (5, 4), (5, 5), (7, 3), (7, 4), (7, 5)\}$$

$B \times B = B^2 = \{(5, 5), (5, 7), (7, 5), (7, 7)\}$


ii) przedziały $A = (0, 1) \subset \mathbb{R}, B = (1, 2) \subset \mathbb{R}$

$$A \times B = \{(x, y) : 0 < x < 1 \wedge 1 < y < 2\}$$

$$B \times A = \{(x, y) : 1 < x < 2 \wedge 0 < y < 1\}$$



iloczyn nieprzemienne



iii) $A = B = \mathbb{R}$

$$A \times B = B \times A = A^2 = B^2$$

Oznaczamy $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ - płaszczyzna rzeczywista

Definicja 1.1.5. Niech A, B będą dowolnymi zbiorami. Każdy podzbiór $R \subseteq A \times B$ nazywamy dwuargumentową relacją w iloczynie kartezjańskim $A \times B$. Gdy $A = B$, to mówimy o dwuargumentowej relacji w zbiorze A .

Dla $(x, y) \in A \times B$ piszemy $xRy \Leftrightarrow (x, y) \in R$.

Przykład 1.1.6. i) Relacja równości $=$ w zbiorze \mathbb{N}

$n = m$

ii) Relacja \leq w zbiorze \mathbb{N} (lub $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$)

iii) Relacja inkluzji \subseteq w zbiorze potęgowym $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$

iv) Relacja podzielności $|$ w zbiorze \mathbb{N} , tj. $m|n \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} \quad n = mk$

Definicja 1.1.7. Niech $R \subset A \times A$ będzie relacją w zbiorze A . Relację R nazywamy

i) zwrotną, jeżeli $\forall x \in A \quad xRx$,

refleksywna

$\mathbb{R} \quad a \leq a$
 $\mathbb{R} \quad \sim (a < a)$

ii) przeciwzwrotną, jeżeli $\forall x \in A \quad \sim (xRx)$,

iii) symetryczną, jeżeli $\forall x, y \in A \quad xRy \Rightarrow yRx$,

$\mathbb{N} \quad = \quad a = b, b = a$

iv) przeciwsymetryczną, jeżeli $\forall x, y \in A \quad xRy \Rightarrow \sim (yRx)$,

$\mathbb{R} \quad < \quad a < b \Rightarrow \sim (b < a)$

v) antysymetryczną, jeżeli $\forall x, y \in A \quad (xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y$,

$a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$

vi) przechodnią, jeżeli $\forall x, y, z \in A \quad (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz$,

transytywna $a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$

vii) spójną, jeżeli $\forall x, y \in A \quad xRy \vee yRx \vee x = y$.

$a \leq b \vee b \leq a \vee a = b$
 $a < b \vee b < a \vee a = b$

Definicja 1.1.8. Niech A będzie zbiorem niepustym.

i) Relację $R \subset A \times A$ nazywamy relacją równoważności w zbiorze A , jeśli jest ona zwrotna, symetryczna i przechodnia.

ii) Niech R będzie relacją równoważności w zbiorze A , zaś $x \in A$. Zbiór

ozn. $[x]_R = \{y \in A : xRy\}$

nazywamy klasą równoważności lub klasą abstrakcji relacji równoważności R wyznaczoną przez element x . Element x nazywamy reprezentantem klasy równoważności $[x]_R$.

$:=$ z definicji


iii) Niech R będzie relacją równoważności w zbiorze A . Zbiór

ozn. $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$

nazywamy zbiorem ilorazowym zbioru A przez relację R .

Twierdzenie 1.1.9. Niech A będzie zbiorem niepustym, zaś R relacją równoważności w zbiorze A . Wówczas dla dowolnych $x, y \in A$

A



- i) $x \in [x]_R$,
- ii) $[x]_R = [y]_R \Leftrightarrow xRy$,
- iii) $[x]_R \neq [y]_R \Rightarrow [x]_R \cap [y]_R = \emptyset$.

Dowód. iii) $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset \Leftrightarrow \exists z \in [x]_R \cap [y]_R \Leftrightarrow \exists z : z \in [x]_R \wedge z \in [y]_R \Leftrightarrow zRx \wedge zRy \Leftrightarrow zRx \wedge yRz \Rightarrow xRy$. Na mocy ii) mamy, że $[x]_R = [y]_R$. \square

Uwaga 1.1.10. Określenie relacji równoważności w danym zbiorze A jest równoznaczne z dokonaniem podziału tego zbioru na niepuste i rozłączne zbiory, których suma mnogościowa równa jest temu zbiorowi. Taki podział nazywamy rozbiciem zbioru A .

$$A = \bigcup_{x \in A} [x]_R$$

Przykład 1.1.11. i) $A = \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ ustalone $xRy \Leftrightarrow n|(x - y)$
 $xRy \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : kn = x - y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : y = x + kn$

Jest to relacja równoważności zwana *relacją przystawania modulo n* .

Piszemy $x \equiv y \pmod{n}$ lub $x \equiv_n y$.

$\mathbb{Z} / \equiv_n = \{[0], [1], \dots, [n - 1]\}$ zbiór reszt modulo n

ii) $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, gdzie $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $(x, y)R(u, v) \Leftrightarrow xv = yu$

$$(x, y)R(x, y) \Leftrightarrow xy = yx$$

$$(x, y)R(u, v) \Leftrightarrow xv = yu \Leftrightarrow uy = vx \Leftrightarrow (u, v)R(x, y)$$

przechodność - **ĆWICZENIE**

} rel. równow.

Jest to relacja równoważności. Liczba wymierna $\frac{x}{y}$ to klasa abstrakcji.

$$[(x, y)]_R = \{(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* : (x, y)R(u, v)\} = \{(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* : xv = yu\} = \{(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* : \frac{x}{y} = \frac{u}{v}\}$$

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / R$$

Działania $+$, \cdot w \mathbb{Q} nie zależą od wyboru reprezentanta.

- iii) Wektory zaczepione i wektory swobodne płaszczyzny euklidesowej
 Wektor swobodny to klasa abstrakcji wektorów zaczepionych.



Definicja 1.1.12. Niech A będzie zbiorem, zaś $R \subset A \times A$ relacją w A .

- i) Relację R nazywamy *relacją częściowo porządkującą* lub *porządkiem częściowym* w zbiorze A , jeżeli jest ona zwrotna, antysymetryczna i przechodnia. Mówimy wówczas, że zbiór A jest częściowo uporządkowany.
- ii) Relację R nazywamy *porządkiem liniowym* w zbiorze A , jeśli jest ona porządkiem częściowym i jest spójna. Mówimy wówczas, że zbiór A jest liniowo uporządkowany.

\mathbb{R}, \leq
 POSET

Dwa elementy $x, y \in A$ nazywamy *porównywalnymi* jeśli xRy lub yRx . Jeśli zbiór jest liniowo uporządkowany, to każde dwa elementy tego zbioru są porównywalne.

Oznaczamy symbolem \leq ustalony porządek częściowy.

Wówczas piszemy $x < y$, gdy $x \leq y$ oraz $x \neq y$.

Relacja $<$ jest przeciwzwrotna, asymetryczna i przechodnia. Nazywamy ją *silnym porządkiem częściowym*.

spójność
 $xRy \vee yRx \vee x=y$

Przykład 1.1.13. i) $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$ z relacją inkluzji \subseteq

$$A \subseteq A$$

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$$

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Leftrightarrow A \subseteq C$$

Jest to porządek częściowy, który nie jest porządkiem liniowym.

Jeśli $A \cap B = \emptyset$, to ani $A = B$, ani $A \subseteq B$, ani $B \subseteq A$.

- ii) (\mathbb{R}, \leq) zbiór liniowo uporządkowany

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x \leq y \vee y \leq x \vee x = y$$

Wszystkie liczby rzeczywiste są porównywalne.

$A \cap B = \emptyset$
 żadne z porównywalne

1.2 Działania wewnętrzne i ich własności

Niech A będzie zbiorem niepustym.

Definicja 1.2.1. Dowloną funkcję $h : A \times A \rightarrow A$ nazywamy działaniem wewnętrznym w zbiorze A . Wartość funkcji $h(a, b) \in A$ nazywamy wynikiem działania dla pary argumentów $a, b \in A$.

Przykład 1.2.2. i) Dodawanie jest działaniem wewnętrznym w \mathbb{N} .

ii) Odejmowanie nie jest działaniem wewnętrznym w \mathbb{N} .

$$5 - 6 = -1 \notin \mathbb{N}$$

iii) Dodawanie nie jest działaniem wewnętrznym w $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
L. niewymierne

$$-\sqrt{2} + \sqrt{2} = 0 \in \mathbb{Q}$$

Własności działań wewnętrznych

Definicja 1.2.3. Niech $*$: $A \times A \rightarrow A$ będzie działaniem wewnętrznym.

i) Działanie $*$ nazywamy przemienne, jeśli $\forall a, b \in A \quad a * b = b * a$.

ii) Działanie $*$ nazywamy łącznym, jeśli $\forall a, b, c \in A \quad (a * b) * c = a * (b * c)$.

$$a * b * c$$

iii) Element $e \in A$ nazywamy elementem neutralnym działania $*$, jeśli

$$\forall a \in A \quad a * e = e * a = a.$$

Przykład 1.2.4. i) Dodawanie jest działaniem wewnętrznym łącznym i przemienne w \mathbb{R} . 0 jest elementem neutralnym.

ii) Mnożenie jest działaniem wewnętrznym łącznym i przemienne w $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 1 jest elementem neutralnym.

Twierdzenie 1.2.5. Jeżeli element neutralny istnieje to jest jedyny.

Dowód. Przypuśćmy, że istnieją $e_1, e_2 \in A$ będące elementami neutralnymi w A . Wówczas $e_2 = e_1 * e_2 = e_1$. \square

Przykład 1.2.6. Niech X to dowolny zbiór.

i) Zbiór pusty \emptyset jest elementem neutralnym w $(P(X), \cup)$.

ii) Zbiór X jest elementem neutralnym w $(P(X), \cap)$.

Definicja 1.2.7. Niech $*$: $A \times A \rightarrow A$ będzie działaniem wewnętrznym, posiadającym element neutralny $e \in A$. Dla dowolnego $a \in A$ każdy element $a' \in A$ taki, że $a * a' = a' * a = e$, nazywamy elementem symetrycznym do a względem działania $*$.

inverse

Przykład 1.2.8. i) W $(\mathbb{R}, +)$ elementem symetrycznym do 5 jest -5 (tzw. element przeciwny).

$$5 + (-5) = 0$$

ii) W (\mathbb{R}^*, \cdot) elementem symetrycznym do 5 jest $\frac{1}{5}$ (tzw. element odwrotny).

$$5 \cdot \frac{1}{5} = 1$$

działanie przemienne

iii) W (\mathbb{R}, \circ) , gdzie $x \circ y = x + y + 1$, elementem neutralnym jest -1 , zaś elementem symetrycznym do x jest $-2 - x$.

$x \circ e = x$
1-narobności

$\Leftrightarrow x + e + 1 = x \Rightarrow e = -1 \in \mathbb{R}$
 $x' \in \mathbb{R} (?)$

$x \circ x' = e \Leftrightarrow x + x' + 1 = -1$

$x' = -x - 2 \in \mathbb{R}$

Twierdzenie 1.2.9. Jeżeli działanie wewnętrzne jest łączne oraz posiada element neutralny, to każdy element posiada co najwyżej jeden element symetryczny.

Dowód. Rozważmy zbiór A z działaniem łącznym \circ . Niech e będzie elementem neutralnym działania \circ . Niech a', a'' to dwa elementy symetryczne do $a \in A$. Wówczas

$$\begin{aligned} a \circ a' = e &\Rightarrow a'' \circ (a \circ a') = a'' \circ e \\ (a'' \circ a) \circ a' &= a'' \\ e \circ a' &= a'' \\ a' &= a'' \end{aligned}$$

□

1.3 Podstawowe struktury algebraiczne

Niech G będzie zbiorem niepustym, zaś $* : G \times G \rightarrow G$ działaniem wewnętrznym w G .

Definicja 1.3.1. i) Parę $(G, *)$ nazywamy *półgrupą*, jeżeli działanie jest łączne.

ii) Parę $(G, *)$ nazywamy *monoidem*, jeżeli działanie jest łączne i posiada element neutralny.

iii) Parę $(G, *)$ nazywamy *grupą*, jeżeli działanie jest łączne, posiada element neutralny oraz każdy element G posiada element symetryczny względem $*$ w G .

Jeśli dodatkowo działanie $*$ jest przemienne, to mówimy o *półgrupie przemiennej*, *monoidzie przemiennym*, *grupie przemiennej (abelowej)*.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Przykład 1.3.2. Oznaczmy $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

	$(\mathbb{N}, +)$	(\mathbb{Z}, \cdot)	$(\mathbb{Q}, +)$	(\mathbb{Q}, \cdot)	$(\mathbb{R}^*, +)$	(\mathbb{R}^*, \cdot)
wewnętrzność	✓	✓	✓	✓	nie $-1 + 1 = 0$ $0 \notin \mathbb{R}^*$	✓
łączność	✓	✓	✓	✓		✓
przemienność	✓	✓	✓	✓		✓
el. neutralny	brak $0 \notin \mathbb{N}$	✓ $1 \in \mathbb{Z}$	✓ $0 \in \mathbb{Z}$ Q	✓ $1 \in \mathbb{Z}$ Q		✓ $1 \in \mathbb{R}^*$
el. symetryczny		brak $2 \cdot b = 1$ $b = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$	✓ $a + a' = 0$ $a' = -a \in \mathbb{Q}$	brak $a \cdot a' = 1$ $a' = \frac{1}{a}$ nie dla $a = 0$		✓ $a \cdot a' = 1$ $a' = \frac{1}{a}$ $\forall a \in \mathbb{R}^*$
	półgrupa przemienna bez el. neutr.	monoid przemienny	grupa abelowa	monoid przemienny		grupa abelowa

Przykład 1.3.3. Niech $X = \{1, 2, 4, \dots, 2^n, \dots\}$, $n \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, zaś działanie \circ to mnożenie liczb. Czy (X, \circ) jest półgrupą/grupą (abelową)?

Jeśli $a, b, c \in X$, to istnieją $k, m, n \in \mathbb{N}_0$ takie, że $a = 2^n, b = 2^m, c = 2^k$.

wewnętrzne $a \circ b = 2^n \cdot 2^m = 2^{n+m} \in X$

przemienne $a \circ b = 2^n \cdot 2^m = 2^{n+m} = 2^{m+n} = 2^m \cdot 2^n = b \circ a$

łączne $(a \circ b) \circ c = 2^{n+m} \cdot 2^k = 2^{n+m+k} = 2^n \cdot 2^{m+k} = a \circ (b \circ c)$

el. neutralny $e = 2^s$, $s \in \mathbb{N}_0$ $a \circ e = a$ $\Leftrightarrow 2^{n+s} = 2^n \Rightarrow s = 0, e = 1 \in X$

brak el. odwrotnego $a \circ b = 1 \Leftrightarrow 2^{n+m} = 2^0 \Leftrightarrow m = -n \Rightarrow m = -n \notin \mathbb{N}_0$

Wniosek: monoid przemienny (tj. półgrupa przemienna z jedyneką)

Nie grupa

Definicja 1.3.4. Zespól $(A, \circ, *)$ złożony z niepustego zbioru A i określonych w nim działań wewnętrznych $\circ : A \times A \rightarrow A$, $*$: $A \times A \rightarrow A$ nazywamy *pierścieniem*, jeśli (A, \circ) jest grupą abelową, zaś działanie $*$ jest łączne oraz rozdzielne względem działania \circ , tzn.

$$\forall a, b, c \in A \quad (a \circ b) * c = (a * c) \circ (b * c) \wedge c * (a \circ b) = (c * a) \circ (c * b).$$

RING
P, R, S

Pierścień, w którym działanie $*$ posiada element neutralny, nazywamy *pierścieniem z jedyneką* lub *z jednością*. Pierścień, w którym działanie $*$ jest przemienne, nazywamy *pierścieniem przemiennym* lub *komutatywnym*.

Notacja addytywna		Notacja multiplikatywna	
$\circ / +$	dodawanie	$* / \cdot$	mnożenie
$a + b$	suma	$a \cdot b$	iloczyn
$e = 0$	zero	$e = 1$	jedyńka
$a' = -a$	element przeciwny	$a' = a^{-1}$	element odwrotny

$$\begin{array}{ll}
 na = \underbrace{a + \dots + a}_n, & n \in \mathbb{N} \\
 0 \cdot a = 0 & \\
 m \in \mathbb{Z}, m < 0 & ma = \underbrace{(-a) + \dots + (-a)}_m
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_n \\
 a^0 = e = e = 1 & \\
 a^m = \underbrace{a^{-1} \cdot \dots \cdot a^{-1}}_n
 \end{array}$$

Definicja 1.3.5. Zespól $(K, \circ, *)$ złożony ze zbioru K zawierającego co najmniej dwa elementy i określonych w nim działań wewnętrznych $\circ : K \times K \rightarrow K$, $*$: $K \times K \rightarrow K$ nazywamy ciałem, jeśli

- (K, \circ) jest grupą abelową (z elementem neutralnym e_\circ),
- $(K \setminus \{e_\circ\}, *)$ jest grupą abelową,
- działanie $*$ jest rozdzielne względem działania \circ .

FIELD

Zatem ciało to pierścień przemienny z jedyneką (różną od zera, tj. $1 = e_* \neq e_\circ = 0$), w którym wszystkie niezerowe (tj. różne od elementu neutralnego e_\circ) elementy są odwracalne.

Zatem w ciele można zdefiniować operację *dzielenia* w sposób następujący:

$$\frac{a}{b} := a * b^{-1}, \quad a, b \in K, b \neq 0.$$

Przykład 1.3.6. i) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ciało liczb rzeczywistych

$(\mathbb{R}, +)$ grupa addytywna ciała

(\mathbb{R}^*, \cdot) grupa multiplikatywna ciała

ii) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ciało liczb wymiernych

iii) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ pierścień przemienny z jedyneką, ale nie ciało (bowiem np. $2^{-1} \notin \mathbb{Z}$)

iv) $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +_p, \cdot_p)$, gdzie $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$
 $+_p, \cdot_p$ dodawanie i mnożenie modulo p

$\mathbb{R}[x]$ pierścień wielomianów zmienną x

$\mathbb{R}(x)$ ciało funkcji wymiernych

Jeśli p to liczba pierwsza, to $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ jest ciałem (tzw. ciało reszt modulo p).

Jeśli p nie jest liczbą pierwszą, to $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ jest pierścieniem, ale nie ciałem.

\mathbb{Z}_5

$+_5$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

\cdot_5	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

\cdot_4	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Definicja 1.3.7. Niech $(A, +, \cdot)$ będzie pierścieniem. Elementy $a, b \in A$, $a \neq 0, b \neq 0$ nazywamy dzielnikami zera, jeśli $a \cdot b = 0$

Uwaga 1.3.8. W ciele nie ma dzielników zera.


Dowód. Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem oraz niech $a, b \in K$. Załóżmy, że $a \cdot b = 0$ oraz $a \neq 0$. Jeśli $a \neq 0$, to istnieje $a^{-1} \in K$. Otrzymujemy

$$0 = a^{-1} \cdot 0 = a^{-1} \cdot (a \cdot b) = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = 1 \cdot b = b.$$

Zatem $b = 0$. \square

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Przykład 1.3.9. Sprawdź, że zbiór \mathbb{R}^2 wraz z działaniami dodawania i mnożenia zdefiniowanymi poniżej ma strukturę ciała.



$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2 \quad (x_1, y_1) + (x_2, y_2) := (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \quad (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) := (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

$(\mathbb{C}, +)$ jest grupą abelową.

Działanie $+$ jest wewnętrzne, łączne, przemienne. Elementem neutralnym jest $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$, zaś elementem przeciwnym do $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ jest $(-x_1, -y_1) \in \mathbb{R}^2$.

$(\mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\}, \cdot)$ jest grupą abelową.

Działanie \cdot jest wewnętrzne.

przemienność:

$$(x_2, y_2) \cdot (x_1, y_1) = (x_2 x_1 - y_2 y_1, x_2 y_1) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1) = (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2)$$

łączność: $L = P$

$$\begin{aligned} L &= (a, b) \cdot [(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2)] = (a, b) \cdot (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1) = \\ &= (a x_1 x_2 - a y_1 y_2 - b x_1 y_2 - b x_2 y_1, a x_1 y_2 + a x_2 y_1 + b x_1 x_2 - b y_1 y_2) \\ P &= [(a, b) \cdot (x_1, y_1)] \cdot (x_2, y_2) = (a x_1 - b y_1, a y_1 + b x_1) \cdot (x_2, y_2) = \\ &= (a x_1 x_2 - b y_1 x_2 - a y_1 y_2 - b x_1 y_2, a x_1 y_1 - b y_1 y_2 + a y_1 x_2 + b x_1 x_2) \end{aligned}$$

el. neutralny: $e = (1, 0)$

$$\forall (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2 \quad (1, 0) \cdot (x_1, y_1) = (1 \cdot x_1 - 0 \cdot y_1, 1 \cdot y_1 + 0 \cdot x_1) = (x_1, y_1)$$

el. odwrotny do $(x_1, y_1) \neq (0, 0)$:

$$(x_1, y_1) \cdot (a, b) = (1, 0) \Leftrightarrow (a x_1 - b y_1, a y_1 + b x_1) = (1, 0) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_1 & -y_1 \\ y_1 & x_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\forall (x_1, y_1) \neq (0, 0) \quad a = \frac{x_1}{x_1^2 + y_1^2}, \quad b = \frac{y_1}{x_1^2 + y_1^2}$$

Działanie \cdot jest rozdzielne względem $+$, bowiem $L = P$.

$$L = (a, b) \cdot [(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = (a, b) \cdot (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (a x_1 + a x_2 - b y_1 - b y_2, a y_1 + a y_2 + b x_1 + b x_2)$$

$$P = [(a, b) \cdot (x_1, y_1)] + [(a, b) \cdot (x_2, y_2)] = (a x_1 - b y_1, a y_1 + b x_1) + (a x_2 - b y_2, a y_2 + b x_2)$$

Definicja 1.3.10. Zdefiniowane powyżej ciało nazywamy ciałem liczb zespolonych i oznaczamy symbolem \mathbb{C} . Elementy tego ciała nazywamy liczbami zespolonymi.

complex numbers

TEMAT: Liczby zespolone


2.1 Ciało liczb zespolonych

Motywacja



zaznaczenie

- $X^2 - 2 = 0$ równanie o współczynnikach z \mathbb{Q} , jego rozwiązania $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
 Ćwiczenie: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ jest ciałem takim, że $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{R}$



- $X^2 + 1 = 0$ równanie o współczynnikach z \mathbb{R} , jego rozwiązania $\pm i$ nie należą do \mathbb{R}
 $\mathbb{R}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{C}$

\mathbb{C} ciało *algebraicznie domknięte* - tzn. rozwiązania równań algebraicznych o współczynnikach z \mathbb{C} należą do \mathbb{C}

$$i^2 = -1$$

równanie algebraiczne
 ||
 równ.
 widomiane

Zanurzenie \mathbb{R} w \mathbb{C}

Niech $\Omega = \mathbb{R} \times \{0\} = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$. Wówczas $(\Omega, +, \cdot)$ jest ciałem.

wewnętrzność: $(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0) \in \Omega$, $(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0) \in \Omega$

przemienność: $(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0) = (x_2 + x_1, 0) = (x_2, 0) + (x_1, 0)$
 $(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0) = (x_2 x_1, 0) = (x_2, 0) \cdot (x_1, 0)$

łączność: $[(x_1, 0) + (x_2, 0)] + (x_3, 0) = (x_1 + x_2 + x_3, 0) = (x_1, 0) + [(x_2, 0) + (x_3, 0)]$
 $[(x_1, 0) \cdot (x_2, 0)] \cdot (x_3, 0) = (x_1 x_2 x_3, 0) = (x_1, 0) \cdot [(x_2, 0) \cdot (x_3, 0)]$

el. neutralne: $(0, 0)$ dla dodawania oraz $(1, 0)$ dla mnożenia

el. symetryczne do $(x_1, 0)$: $(-x_1, 0)$ względem $+$, $(\frac{1}{x_1}, 0)$ względem \cdot

rozdzielność: $[(x_1, 0) + (x_2, 0)] \cdot (x_3, 0) = (x_1 + x_2, 0) \cdot (x_3, 0) = ((x_1 + x_2)x_3, 0) = (x_1 x_3 + x_2 x_3, 0) = [(x_1, 0) \cdot (x_3, 0)] + [(x_2, 0) \cdot (x_3, 0)]$

Niech $h : \mathbb{R} \rightarrow \Omega$, $h(x) = (x, 0)$. Jest to *zanurzenie*, czyli bijekcja taka, że

$h(x_1 + x_2) = h(x_1) + h(x_2)$ oraz $h(x_1 \cdot x_2) = h(x_1) \cdot h(x_2)$.

Utożsamiamy zbiory \mathbb{R} oraz Ω i piszemy x zamiast $h(x)$. $= (x, 0)$

zgodność z działaniami

Zdefiniujemy $i := (0, 1)$ tzw. *jednostka urojona*. Wówczas

$$i^2 = i \cdot i = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$$

$$\mathbb{C} \ni z = (x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + iy$$

Postać $z = x + iy$, gdzie $x, y \in \mathbb{R}$ to tzw. *postać kanoniczna (algebraiczna, Gaussa)* liczby zespolonej. Liczbę $x \in \mathbb{R}$ nazywamy *częścią rzeczywistą* liczby z i oznaczamy $\text{Re}z$. Liczbę $y \in \mathbb{R}$ nazywamy *częścią urojoną* liczby z i oznaczamy $\text{Im}z$. Liczby postaci iy , $y \in \mathbb{R}$ nazywamy *czysto urojonymi*.

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow (\text{Re}z_1 = \text{Re}z_2 \wedge \text{Im}z_1 = \text{Im}z_2)$$

Postać algebraiczna pozwala na dodawanie i mnożenie liczb zespolonych jak wielomianów zmiennej i , przy warunku $i^2 = -1$.

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$$

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

Przykład 2.1.1. $(2 + 7i) - (4 - 2i) = -2 + 9i$

$$(3 - i) \cdot (2 + 3i) = 6 + 9i - 2i - 3i^2 = 9 + 7i$$

$$\frac{2+3i}{2-5i} = \frac{(2+3i)(2+5i)}{(2-5i)(2+5i)} = \frac{4+10i+6i+15i^2}{4-25i^2} = \frac{-11+16i}{29} = -\frac{11}{29} + \frac{16}{29}i$$


$x_1 \times x_2 + x_1 i y_2 + i y_1 x_2 + i^2 y_1 y_2$
 -1
domnanżanie przez czynnik sprzężony

Uwaga 2.1.2. W ciele \mathbb{C} nie można określić porządku liniowego.

$$-1 = i \cdot i = (-i) \cdot (-i) \quad 1 = 1 \cdot 1 = (-1) \cdot (-1)$$

Utożsamiamy liczby zespolone z punktami na płaszczyźnie lub wektorami zaczepionymi w $(0, 0)$.

Płaszczyzna zespolona - geometryczny model ciała liczb zespolonych \mathbb{C}





oś rzeczywista

Definicja 2.1.3. Niech $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\bar{z} = x - iy$$

- i) Liczbę zespoloną $w = x - iy$ nazywamy liczbą sprzężoną do liczby z . Oznaczamy ją \bar{z} .
- ii) Liczbę rzeczywistą $\sqrt{x^2 + y^2}$ nazywamy modułem liczby z . Oznaczamy ją $|z|$.



$$|z|, r$$

$x \in \mathbb{R}$
 \downarrow
 $x + 0i$
 $\bar{x} = \overline{x + 0i} = x - 0i = x$

Twierdzenie 2.1.4 (Własności liczb zespolonych). Niech $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Wówczas prawdziwe są następujące równości.

- i) $\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}z_1 + \operatorname{Re}z_2$, $\operatorname{Im}(z_1 + z_2) = \operatorname{Im}z_1 + \operatorname{Im}z_2$
- ii) $\operatorname{Re}z = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $\operatorname{Im}z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$
- iii) $\overline{\bar{z}} = z$
- iv) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$, $\overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$, $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
- iv) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$, dla $z_2 \neq 0$
- vi) $|z| = |-z| = |\bar{z}|$
- vii) $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- viii) $\operatorname{Re}z \leq |\operatorname{Re}z| \leq |z|$, $\operatorname{Im}z \leq |\operatorname{Im}z| \leq |z|$
- ix) $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

$$z + \bar{z} = x + iy + x - iy = 2x$$

$$z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - i^2y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$$

x) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (nierówność trójkąta) $\left| |z_1| - |z_2| \right| \leq |z_1 - z_2|$

Dowód. vii) $(x + iy)(x - iy) = x^2 - i^2y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$

viii) $\operatorname{Re}z = x \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$

x) $1 = \operatorname{Re}1 = \operatorname{Re}\left(\frac{z_1 + z_2}{z_1 + z_2}\right) \stackrel{i)}{=} \operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_1 + z_2}\right) + \operatorname{Re}\left(\frac{z_2}{z_1 + z_2}\right) \stackrel{\text{def}}{\leq} \left|\frac{z_1}{z_1 + z_2}\right| + \left|\frac{z_2}{z_1 + z_2}\right| \stackrel{iv)v)}{=} \frac{|z_1|}{|z_1 + z_2|} +$

$\frac{|z_2|}{|z_1 + z_2|} \Rightarrow |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

$|z_1| = |z_1 - z_2 + z_2| \leq |z_1 - z_2| + |z_2| \wedge |z_2| = |z_2 - z_1 + z_1| \leq |z_2 - z_1| + |z_1| \Rightarrow$

$\left| |z_1| - |z_2| \right| \leq |z_1 - z_2| \quad \square$

2.2 Postać trygonometryczna i wykładnicza


$$(x+iy)^{50} = ?$$

Postać trygonometryczna liczby zespolonej

Niech $z = x + iy \neq 0$. Wówczas $z = |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right)$. Ponieważ $\left(\frac{x}{|z|} \right)^2 + \left(\frac{y}{|z|} \right)^2 = 1$, więc istnieje kąt φ taki, że

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$


$$z=0 \\ |z|=0$$



$$\cos \varphi = \frac{x}{|z|}$$

$$\sin \varphi = \frac{y}{|z|}$$

$$\varphi + 2k\pi$$



$$\cos \varphi = \cos(\varphi + 2\pi)$$

Dowolny taki kąt nazywamy *argumentem* liczby z . Ten z argumentów liczby zespolonej, który leży w przedziale $[0, 2\pi)$, nazywamy *argumentem głównym* liczby z i oznaczamy $\arg z$. Zatem dowolny argument liczby z ma postać $\arg z + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Przyjmujemy, że argument liczby $z = 0$ jest nieokreślony. Dowolną liczbę $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$ możemy zatem przedstawić w postaci $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, gdzie φ to jeden z jej argumentów. Powyższe przedstawienie nazywamy *postacią trygonometryczną* liczby zespolonej z .


$$\mathbb{R} \quad \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ -1 \quad 0 \quad 1 \end{array} \\ |x| = 1$$

Gdy $z_1 \neq 0$, $z_2 \neq 0$, $z_1 = |z_1|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $z_2 = |z_2|(\cos \beta + i \sin \beta)$, to wówczas $z_1 = z_2$ wtedy i tylko wtedy gdy $|z_1| = |z_2|$ oraz $\beta = \alpha + 2k\pi$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$.

$$\mathbb{C} \\ |z|=1 \quad \text{Diagram of a unit circle in the complex plane with axes and a circle centered at the origin.$$

Przykład 2.2.1. Przedstaw podane liczby w postaci trygonometrycznej.

$$z = 7 \\ z = 7(1 + 0i)$$




$$\varphi = 0 + 2k\pi \\ \arg z = 0$$

$$z = 7(\cos 0 + i \sin 0)$$

$$z = -i \\ |z| = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1 \\ z = 1(0 + (-1) \cdot i)$$

$$\begin{cases} \cos \varphi = 0 \\ \sin \varphi = -1 \end{cases}$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \arg z = -\frac{\pi}{2}$$



$$-i = 1(\cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi)$$

$$z = -\sqrt{27} - 3i \\ |z| = \sqrt{27 + 9} = 6 \\ z = 6 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)$$

$$\begin{cases} \cos \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \varphi = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\varphi = \frac{7}{6}\pi + 2k\pi, \\ \arg z = \frac{7}{6}\pi$$

$$-\sqrt{27} - 3i = 6(\cos \frac{7}{6}\pi + i \sin \frac{7}{6}\pi)$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \\ \text{III} \quad \text{d.w.} \\ k \in \mathbb{Z}$$

Mnożenie i dzielenie liczb w postaci trygonometrycznej

Twierdzenie 2.2.2. Niech $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$,
 $z_1 = |z_1|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $z_2 = |z_2|(\cos \beta + i \sin \beta)$. Wówczas:

i) $z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| \cdot (\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta))$,

ii) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \cdot (\cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta))$,

iii) $z^n = |z|^n \cdot (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ *tzw. wzór de Moivre'a*

Dowód. i) $z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta)$
 $= |z_1| \cdot |z_2| \left(\underbrace{(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta)}_{\cos(\alpha + \beta)} + i \underbrace{(\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta)}_{\sin(\alpha + \beta)} \right)$

ii) analogicznie

iii) Na mocy i) dla $n = 2$ mamy $z^2 = z \cdot z = |z|^2(\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$.
 Przeprowadzając dowód indukcyjny, otrzymujemy tezę. \square

n=2
 $z^2 = z \cdot z$
 $= |z|^2 (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$
indukcja

Przykład 2.2.3. Oblicz $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$.

$1+i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ $1-i = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = 2(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))$

$\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} = \frac{2}{\sqrt{2}} \left(\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{7}{12}\pi\right) + i \sin\left(-\frac{7}{12}\pi\right) \right)$

$\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20} = 2^{10} \left(\cos\left(\frac{140}{12}\pi\right) + i \sin\left(\frac{140}{12}\pi\right) \right) = 2^{10} \left(\cos\left(\frac{35}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{35}{3}\pi\right) \right) =$
 $= 2^{10} \left(\cos\left(12\pi - \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(12\pi - \frac{\pi}{3}\right) \right) = 2^{10} \left(\cos\frac{\pi}{3} - i \sin\frac{\pi}{3} \right) = 2^{10} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) =$
 $= 2^9(1 - \sqrt{3}i)$

$(1+i\sqrt{3})^{20}$
 $(1-i)^{20}$
 $\cos \varphi > 0$ $\sin \varphi < 0$
 $\frac{\pi}{3} - (-\frac{\pi}{4})$
 $2\pi - \frac{\pi}{3}$
arg. zgodny

Twierdzenie 2.2.4 (Własności argumentu). Niech $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Wówczas prawdziwe są następujące równości.

i) $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ($k = 0$ lub $k = -1$)


ii) $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ($k = 0$ lub $k = -1$)

iii) $\arg(z^n) = n \cdot \arg z + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$


iv) $\arg \bar{z} = 2\pi - \arg z$, gdy $\arg z \neq 0$

Dowód. iii) Na mocy i) dla $n = 2$ mamy $\arg(z^2) = \arg(z \cdot z) = \arg z + \arg z + 2k\pi = 2\arg z + 2k\pi$. Przeprowadzając dowód indukcyjny, otrzymujemy tezę.

iv) $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ oraz $0 = \arg(|z|^2) = \arg z + \arg \bar{z} + 2k\pi$, skąd $\arg \bar{z} = -2\pi - \arg z$ \square



Przykład 2.2.5. $\arg i = \frac{\pi}{2}$ $\arg(-1) = \pi$ $\arg(-i) = \frac{3}{2}\pi$
 $i = (-1) \cdot (-i) \Rightarrow \arg i = \pi + \frac{3}{2}\pi + 2k\pi = \frac{5}{2}\pi + 2k\pi$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$, tj. $k = -1$



Postać wykładnicza liczby zespolonej

Dla $\varphi \in \mathbb{R}$ definiujemy $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Zatem dowolną liczbę zespoloną $z \neq 0$ można zapisać w postaci $z = |z|e^{i\varphi}$, gdzie φ to pewien argument liczby z .

Przykład 2.2.6. a) $e^{\frac{\pi}{2}i} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = 0 + 1 \cdot i = i$

b) $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + 0 \cdot i \Rightarrow e^{i\pi} + 1 = 0$
 najpiękniejszy wzór w matematyce

Twierdzenie 2.2.7. Niech $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Wówczas:

i) $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta}$, $e^{i(\alpha-\beta)} = \frac{e^{i\alpha}}{e^{i\beta}}$,

ii) $(e^{i\alpha})^k = e^{ik\alpha}$, dla $k \in \mathbb{Z}$,

iii) $e^{i(\alpha-2k\pi)} = e^{i\alpha}$, dla $k \in \mathbb{Z}$,

iv) $e^{i\alpha} \neq 0$, $|e^{i\alpha}| = 1$.

$e^{i\alpha} = e^{i\beta} \Rightarrow \alpha = \beta$
 nie tylko
 $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$
 $|z| = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}$

Dowód. i), ii), iii) Analogiczny jak dla własności działań na liczbach w postaci trygonometrycznej.

iv) Mamy $|e^{i\alpha}| = |\cos \alpha + i \sin \alpha| = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = 1$, zatem $e^{i\alpha} = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = \sin \alpha = 0$, co nie jest możliwe, gdyż gdy $\cos \alpha = 0$, to $\sin \alpha = \pm 1$. \square

Wniosek 2.2.8. Niech $z = re^{i\varphi}$, $z_1 = r_1 e^{i\alpha}$, $z_2 = r_2 e^{i\beta}$ będą liczbami zespolonymi w postaci wykładniczej. Wówczas:

i) $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\alpha+\beta)}$, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\alpha-\beta)}$,

ii) $z^k = r^k e^{ik\varphi}$, dla $k \in \mathbb{Z}$,

iii) $\bar{z} = r e^{-i\varphi}$.

Dowód. iii) Jeśli $\arg z = \varphi$, to $\arg \bar{z} = 2\pi - \varphi$, skąd $e^{(2\pi i - \varphi)i} = e^{2\pi i} e^{-\varphi i} = e^{-\varphi i}$. \square

Wzory Eulera

$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$

$e^{-i\varphi} = \cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi) = \cos \varphi - i \sin \varphi$

Dodając lub odejmując stronami, otrzymujemy :

$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$, $\sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$, $\varphi \in \mathbb{R}$.


Obrót o kąt φ

$z = r e^{i\alpha}$

$z \cdot e^{i\varphi} = r e^{i(\alpha+\varphi)}$

$r \cdot 1$

$e^{i\varphi} = 1 \cdot e^{i\varphi}$



TEMAT: Liczby zespolone - ciąg dalszy

3.1 Pierwiastkowanie, równania wielomianowe

Pierwiastkowanie

Niech $n \in \mathbb{N}$, $w \in \mathbb{C}$ będą ustalone.

Definicja 3.1.1. Każdą liczbę $z \in \mathbb{C}$ spełniającą równanie $z^n = w$, nazywamy pierwiastkiem n -tego stopnia z liczby w .

Przykład 3.1.2. Rozwiąż równanie $z^2 = 8 + 6i$.

I sposób:
 postać wykładnicza

$$z = |z|e^{i\varphi}, w = 8 + 6i$$

$$|z|^2 e^{2i\varphi} = w$$

$$|w| = 10 \quad 2\varphi =$$

$$w = 8 + 6i = 10\left(\frac{4}{5} + i\frac{3}{5}\right)$$

$$\varphi = \arcsin \frac{3}{5} + 2k\pi$$

$$|z| = \sqrt{10}$$

$$\varphi_k = \frac{1}{2} \arcsin \frac{3}{5} + k\pi$$

$$z = \sqrt{10}e^{i\varphi_k}, k \in \{0, 1\}$$

II sposób:
 postać algebraiczna

$$z = x + iy, w = 8 + 6i$$

$$z^2 = w$$

$$(x + iy)^2 = 8 + 6i$$

$$x^2 + 2xyi - y^2 = 8 + 6i$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 8 \\ 2xy = 6 \end{cases}$$

$$y \neq 0 \text{ (gdy } y = 0, \text{ to } z = x, x^2 \neq 8 + 6i)$$

$$x = \frac{3}{y}, \frac{9}{y^2} - y^2 = 8$$

$$y^4 + 8y^2 - 9 = 0, \Delta = 100$$

$$y^2 = 1, y = \pm 1$$

$$z = 3 + i \vee z = -3 - i$$

III sposób:
 postać algebraiczna

$$8 + 6i = 9 + 6i - 1 =$$

$$= 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot i + i^2 =$$

$$= (3 + i)^2$$

$$z = 3 + i \vee z = -3 - i$$

Twierdzenie 3.1.3. Jeśli $n \in \mathbb{N}$, $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $w = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, to wówczas równanie $z^n = w$ posiada n różnych rozwiązań. Rozwiązania te mają postać

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Dowód. Niech $z = \rho(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, wówczas

$$z^n = w \Leftrightarrow \rho^n (\cos n\alpha + i \sin n\alpha) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \Leftrightarrow \begin{cases} \rho^n = r \\ n\alpha = \varphi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Otrzymujemy $z_k = \sqrt[n]{r}(\cos \alpha_k + i \sin \alpha_k)$, gdzie $\alpha_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. \square

znana

$\rho = ?$ $\alpha = ?$

*jak $w \neq 0$
 dla $k = n$
 $\alpha_n = \frac{\varphi + 2n\pi}{n} = \frac{\varphi}{n} + 2\pi$*

! wszystkie pierwiastki

Symbolem $\sqrt[n]{w}$ oznaczamy zbiór wszystkich rozwiązań równania. Zatem

$$\sqrt[n]{w} = \{z \in \mathbb{C} : z^n = w\} = \{z_0, z_1, \dots, z_{n-1}\}.$$

\mathbb{R}
 $\sqrt{4} = 2$
 \sqrt{x}

Przykład 3.1.4. Rozwiąż równanie $z^5 = \sqrt{8} - i\sqrt{24}$.

Niech $z = \rho(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ oraz $w = \sqrt{8} - i\sqrt{24}$.

Obliczamy $|w| = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, skąd $w = 4\sqrt{2}(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)$. Zatem

$$z^5 = w \Leftrightarrow \rho^5(\cos 5\alpha + i \sin 5\alpha) = 4\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{3}) + i \sin(-\frac{\pi}{3})) \Leftrightarrow \begin{cases} \rho^5 = 4\sqrt{2} = (\sqrt{2})^5 \\ 5\alpha = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \end{cases}$$

Stąd $\rho = \sqrt{2}$, $\alpha_k = -\frac{\pi}{15} + \frac{2}{5}k\pi$ oraz $z_k = \sqrt{2}(\cos \alpha_k + i \sin \alpha_k)$, gdzie $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.


$\cos \varphi + i \sin \varphi$

$\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3}$

ten sam

Interpretacja geometryczna pierwiastka z liczby zespolonej

Liczby z_0, z_1, \dots, z_{n-1} będące rozwiązaniami równania $z^n = w$ stanowią wierzchołki n -kąta foremnego, wpisanego w koło o środku $z = 0$ i promieniu $\sqrt[n]{r}$.



$k=5$
 jak dla $k=0$

Przykład 3.1.5. Rozwiąż równanie $z^4 = (\sqrt{3} - i)^{12}$.


Równanie ma 4 rozwiązania z_0, z_1, z_2, z_3 . Będą one wierzchołkami kwadratu.

$$z^4 = ((\sqrt{3} - i)^3)^4$$

Niech $z_0 = (\sqrt{3} - i)^3 = 3\sqrt{3} - 9i - 3\sqrt{3} + i = -8i$.

Kolejne wierzchołki kwadratu otrzymujemy przez obrót o kąt $\frac{\pi}{2}$, co odpowiada mnożeniu przez $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$.

$$z_1 = z_0 \cdot i = 8, \quad z_2 = z_1 \cdot i = 8i, \quad z_3 = z_2 \cdot i = -8$$



$\frac{\pi}{2}$

obrot o kąt prosty

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = \underbrace{\cos \frac{\pi}{2}}_0 + i \underbrace{\sin \frac{\pi}{2}}_1 = i$$


Uwaga 3.1.6. Rozwiązywanie równań w \mathbb{R} i w \mathbb{C}



w \mathbb{R}	w \mathbb{C}
$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{9} = \{-3, 3\}$
$\sqrt{-1}$ nie istnieje	$\sqrt{-1} = \{-i, i\}$
$\sqrt[4]{1} = 1$	$\sqrt[4]{1} = \{-1, 1, -i, i\}$
$\sqrt{x^2} = x $	$\sqrt{z^2} = \{-z, z\}$

$$z^2 = 9$$

$$\sqrt{9} = \{z_0, z_1\}$$



Równania wielomianowe

Rozważmy wielomian zmiennej zespolonej z stopnia n .
 $W(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + c_1 z + c_0, \quad c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}, \quad c_n \neq 0$

Definicja 3.1.7. Liczbę $z_0 \in \mathbb{C}$ nazywamy *pierwiastkiem wielomianu W* , jeżeli $W(z_0) = 0$.

Twierdzenie 3.1.8 (Bézout). Liczba $z_0 \in \mathbb{C}$ jest pierwiastkiem niezerowego wielomianu W wtedy i tylko wtedy gdy istnieje wielomian P taki, że $W(z) = (z - z_0)P(z)$.

Dowód. Dzieląc przez dwumian $z - z_0$, otrzymujemy $W(z) = (z - z_0)P(z) + const.$
 Stąd $W(z_0) = 0 \Leftrightarrow W(z) = (z - z_0)P(z)$. \square

Niech $k \in \mathbb{N}$.

Definicja 3.1.9. Liczbę $z_0 \in \mathbb{C}$ nazywamy *pierwiastkiem k -krotnym wielomianu W* , jeżeli istnieje wielomian P taki, że $W(z) = (z - z_0)^k P(z)$ oraz $P(z_0) \neq 0$.

Przykład 3.1.10. Niech $W(z) = z^3 - z^2 - z + 1$. Faktoryzując, otrzymujemy $W(z) = z^2(z - 1) - (z - 1) = (z - 1)(z^2 - 1) = (z - 1)^2(z + 1)$.
 Zatem $z = 1$ jest pierwiastkiem dwukrotnym.

Twierdzenie 3.1.11 (Zasadnicze twierdzenie algebry). Każdy wielomian zespolony dodatniego stopnia ma pierwiastek w \mathbb{C} .

Wniosek 3.1.12. Każdy wielomian zespolony stopnia n ma dokładnie n pierwiastków w \mathbb{C} , licząc z krotnościami.

Dowód. Niech W będzie wielomianem stopnia n oraz niech z_1, z_2, \dots, z_m to jego wszystkie pierwiastki o krotnościach k_1, k_2, \dots, k_m , odpowiednio. Na mocy zasadniczego twierdzenia algebry i twierdzenia Bézout otrzymujemy $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$ oraz

$$W(z) = (z - z_1)^{k_1} \cdot (z - z_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (z - z_m)^{k_m}. \quad \square$$

$$z^m = w$$

$$z^m = w$$

$$z^m - w = 0$$

$$z^m + b = 0$$

row. wielom.

$$z^2 + 1 = 0$$

$$z^2 - (-1) = 0$$

$$z^2 - i^2 = 0$$

$$(z - i)(z + i)$$

Trójmian kwadratowy $az^2 + bz + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{C}, \quad a \neq 0$

Obliczamy $\Delta = b^2 - 4ac \in \mathbb{C}$ oraz $\sqrt{\Delta} = \{-\delta, \delta\}$.

$\delta^2 = \Delta$

Gdy $\Delta \neq 0$, otrzymujemy dwa różne pierwiastki zespolone $z_1 = \frac{-b-\delta}{2a}, z_2 = \frac{-b+\delta}{2a}$.

Gdy $\Delta = 0$, otrzymujemy jeden pierwiastek podwójny $z_1 = z_2 = \frac{-b}{2a}$.

Przykład 3.1.13. Rozwiąż równanie $z^2 + 2iz + 3 = 0$.

Obliczamy $\Delta = 4i^2 - 12 = -16 = 16i^2, \sqrt{\Delta} = \{-4i, 4i\}$.

Niech $\delta = 4i$, wówczas $z_1 = -3i$ oraz $z_2 = i$.

3i i

Wielomiany zmiennej zespolonej o współczynnikach rzeczywistych

Niech $k \in \mathbb{N}$.

Twierdzenie 3.1.14. Niech W będzie wielomianem zmiennej zespolonej o współczynnikach rzeczywistych. Wówczas liczba $z_0 \in \mathbb{C}$ jest k -krotnym pierwiastkiem wielomianu W wtedy i tylko wtedy, gdy liczba $\bar{z}_0 \in \mathbb{C}$ jest k -krotnym pierwiastkiem wielomianu W .

Dowód. Niech $W(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}, a_n \neq 0$. Udowodnimy twierdzenie dla pierwiastków jednokrotnych. Niech $z_0 \in \mathbb{C}$ będzie takie, że $W(z_0) = 0$. Wówczas

$$a_n z_0^n + a_{n-1} z_0^{n-1} + \dots + a_1 z_0 + a_0 = 0 \Rightarrow \overline{a_n z_0^n + a_{n-1} z_0^{n-1} + \dots + a_1 z_0 + a_0} = 0$$

$$\Rightarrow \overline{a_n z_0^n} + \overline{a_{n-1} z_0^{n-1}} + \dots + \overline{a_1 z_0} + \overline{a_0} = 0.$$

Ponieważ $\overline{a_k} = a_k$, zatem $W(\bar{z}_0) = a_n (\bar{z}_0)^n + a_{n-1} (\bar{z}_0)^{n-1} + \dots + a_1 \bar{z}_0 + a_0 = 0$. \square

Wniosek 3.1.15. Wielomian stopnia nieparzystego o współczynnikach rzeczywistych, ma przynajmniej jeden pierwiastek rzeczywisty.

Przykład 3.1.16. Rozwiąż równanie $z^3 - 3z^2 + 6z - 4 = 0$.

tabela Hornera

$$0 = (z - 1)(z^2 - 2z + 4) = (z - 1)[(z - 1)^2 + 3] = (z - 1)[(z - 1)^2 - (\sqrt{3}i)^2] =$$

$$= (z - 1)(z - 1 - \sqrt{3}i)(z - 1 + \sqrt{3}i)$$

rozwiązania $z_1 = 1, \quad z_2 = 1 + \sqrt{3}i, \quad z_3 = 1 - \sqrt{3}i, \quad \bar{z}_2 = z_3$

Przykład 3.1.17. Rozwiąż równanie $z^4 + (2 + i)z^3 + (7 + 2i)z^2 + (12 + i)z + 6 = 0$, wiedząc, że $z_1 = 2i$ jest jednym z jego rozwiązań.

dzielenie

$$(z - 2i)(z^3 + (2 + 3i)z^2 + (1 + 6i)z + 3i) = 0$$

$$(z - 2i)(z + 1)(z^2 + (1 + 3i)z + 3i) = (z - 2i)(z + 1)^2(z + 3i) = 0$$

rozwiązania $z_1 = 2i, z_2 = z_3 = -1, z_4 = -3i$

Nie prawda (na opoi) ze $-2i$ też

$z_1 \neq \bar{z}_4$

Wzory Viète'a

Twierdzenie 3.1.18. Niech $W \in \mathbb{C}[z]$, $W(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + c_1 z + c_0$, gdzie $c_n \neq 0$ ma pierwiastki (niekoniecznie różne) $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{C}$. Wówczas

$$\begin{aligned} c_n(r_1 + r_2 + \dots + r_n) &= -c_{n-1} \\ c_n \left[(r_1 r_2 + r_1 r_3 + \dots + r_1 r_n) + (r_2 r_3 + r_2 r_4 + \dots + r_2 r_n) + \dots + r_{n-1} r_n \right] &= c_{n-2} \\ c_n r_1 r_2 \dots r_n &= (-1)^n c_0 \end{aligned}$$

$az^2 + bz + c = 0$
 r_1, r_2
 $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$
 $r_1 \cdot r_2 = \frac{c}{a}$
 $n=2$

Dowód. Niech $W(z) = c_n(z - r_1)(z - r_2) \dots (z - r_n)$. Wymnażając, otrzymujemy
 $W(z) = c_n [(-1)^n r_1 r_2 \dots r_n + (-1)^{n-1} r_2 \dots r_n \cdot z + (-1)^{n-1} r_1 r_3 \dots r_n \cdot z + \dots + (-1)^{n-1} r_2 r_3 \dots r_{n-1} \cdot z + \dots + (-r_1 - r_2 - \dots - r_n) z^{n-1} + z^n]$. \square

Przykład 3.1.19. Wielomian $W(z) = 2z^3 - 5z^2 + cz - 5$, $c \in \mathbb{R}$ ma pierwiastek $z_1 = 1 - 2i$. Wyznacz pozostałe pierwiastki oraz wartość współczynnika c .

Wielomian ma współczynniki rzeczywiste, zatem $z_2 = 1 + 2i$.

Oznaczmy $a = 2$, $b = -5$, $d = -5$.

Na mocy wzorów Viète'a otrzymujemy $z_1 + z_2 + z_3 = 2 + z_3 = -\frac{b}{a} = \frac{5}{2}$.
 Zatem $z_3 = \frac{1}{2}$ oraz $W(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{5}{4} + \frac{c}{2} - 5 = 0 \Rightarrow c = 12$.

z_3

3.2 Interpretacja geometryczna

Niech $z = x + iy$, $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ będą liczbami zespolonymi w postaci algebraicznej. Niech $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$.


1) $|z_1 - z_2|$ odległość z_1 od z_2

$$|(x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2)| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

2) $|z - z_1| = r$ równanie okręgu o środku z_1 i promieniu r


$$r = |(x - x_1) + (y - y_1)i| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \Rightarrow r^2 = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$$

$|z - z_1| = r$ okrąg $|z - z_1| \leq r$ koło $|z - z_1| \geq r$ zewnętrzne koła



$$|z| = r \in \mathbb{R} \quad r > 0$$

3) $|z - z_1| = |z - z_2|$ równanie symetralnej odcinka o końcach z_1 i z_2




to ma sens
 $|z-1| < |z-2-3i|$


4) Zbiór $\{z \in \mathbb{C} : \arg z = \varphi\}$, gdzie $\varphi \in \mathbb{R}$ ustalony, to półprosta.

Przykład 3.2.1.


$$\arg z = \frac{\pi}{4}$$



$$\arg(z - 1 - i) = \frac{\pi}{4}$$




$$\frac{\pi}{4} < \arg z \leq \frac{3}{4}\pi$$




Z def.
 argument
 $z=0$
 nieokreślony

$$\arg(z - 2) = \frac{\pi}{2}$$



$$\arg\left(\frac{z+i}{z-i}\right) = \frac{\pi}{2}$$



Tak ma okrąg

5) Zbiór $\{z \in \mathbb{C} : \arg(\frac{z+i}{z-i}) = \frac{\pi}{2}\}$ to łuk na okręgu.

$$w = \frac{z+i}{z-i} = \frac{x+(y+1)i}{x+(y-1)i} = \frac{[x+(y+1)i] \cdot [x-(y-1)i]}{x^2+(y-1)^2} = \frac{x^2 - xyi + xi + xyi + y^2 - 1}{x^2+(y-1)^2}$$


$z = x + iy$
 $\cancel{x - (y-1)i} \quad -i^2(y-1)^2$

$$\operatorname{Re} w = \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + (y-1)^2}, \quad \operatorname{Im} w = \frac{2x}{x^2 + (y-1)^2} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re} w = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 \\ \operatorname{Im} w > 0 \Leftrightarrow x > 0 \end{cases}$$

$$w = \operatorname{Re} w + i \cdot \operatorname{Im} w$$

$$w = a + bi$$

$$\begin{matrix} a = 0 \\ b > 0 \end{matrix}$$



TEMAT: *Macierze i ich własności. Wyznacznik macierzy.*

3.1 Macierze i ich własności

Niech $K = \mathbb{R}$ lub $K = \mathbb{C}$.

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ Ciąg liczbowy
 $f(m) = a_m \in \mathbb{R}$ f $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Definicja 3.1.1. Funkcję $A: \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow K$, $A(i, j) = a_{ij}$ nazywamy *macierzą* (rzeczywistą gdy $K = \mathbb{R}$, zespoloną gdy $K = \mathbb{C}$) o m wierszach i n kolumnach.

Wartości a_{ij} nazywamy *wyrazami* lub *elementami* macierzy. Odwzorowanie A oznaczamy symbolem $[a_{ij}]_{m \times n}$.

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

wiersz (pionowo), *m-ta kolumna* (poziomo), *1-szy wiersz* (poziomo)

Ciąg $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ nazywamy *i -tym wierszem* macierzy A , zaś ciąg $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}$ nazywamy *j -tą kolumną* macierzy A .

Oznaczmy symbolem $M_{m \times n}(K)$ zbiór wszystkich macierzy o m wierszach i n kolumnach i elementach z K . Gdy $m = n$, piszemy krócej $M_n(K)$. Macierz $A \in M_n(K)$ nazywamy *macierzą kwadratową stopnia n* .

Dla $A, B \in M_{m \times n}(K)$, $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ mamy
 $A = B \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} a_{ij} = b_{ij}$.

Przykład 3.1.2. $A \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$, $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & 4 & 4 \\ 5 & -5 & 6 & -6 \end{bmatrix}$ *3 wiersze, 4 kolumny*

$B \in M_3(\mathbb{R})$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ *m. kwadratowa stopnia 3*

$\mathbf{0}_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$ macierz zerowa wymiaru $m \times n$

UWAGA
 $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$
 $A + \mathbf{0} = A$
 ↑ z kontekstu 2×3

Typy macierzy

Definicja 3.1.3. Macierz kwadratową $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$ nazywamy macierzą:

- diagonalną lub przekątniową, gdy $a_{ij} = 0$ dla $i \neq j$ \leftarrow nr. wiersza \neq nr. kolumny
- trójkątną górną, gdy $a_{ij} = 0$ dla $i > j$ \leftarrow nr. wiersza $>$ nr. kolumny
- trójkątną dolną, gdy $a_{ij} = 0$ dla $i < j$ **OK!**

Oznaczmy:

- $D_n(K)$ zbiór macierzy diagonalnych stopnia n
- $T_n^G(K)$ zbiór macierzy trójkątnych górnych stopnia n
- $T_n^D(K)$ zbiór macierzy trójkątnych dolnych stopnia n

$$T_n^G(K) \cap T_n^D(K) = D_n(K)$$

Przykład 3.1.4. I_n - macierz jednostkowa stopnia n

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in D_3(K)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in T_3^D(K) \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \in T_3^G(K)$$

Działania na macierzach

- Dodawanie macierzy:** Niech $A, B \in M_{m \times n}(K)$, $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$.
 $C = A + B$, $C = [c_{ij}] \in M_{m \times n}(K)$, $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ *wyraz po wyrazie*
- Mnożenie macierzy przez skalar:** Niech $\alpha \in K$, $A \in M_{m \times n}(K)$, $A = [a_{ij}]$.
 $C = \alpha \cdot A$, $C = [c_{ij}] \in M_{m \times n}(K)$, $c_{ij} = \alpha \cdot a_{ij}$
 Oznaczamy $-A = (-1) \cdot A$ oraz $A - B = A + (-B)$. $= A + (-1) \cdot B$
- Mnożenie macierzy:** Niech $A \in M_{m \times p}(K)$, $A = [a_{ik}]$, $B \in M_{p \times n}(K)$, $B = [b_{kj}]$.
 $C = A \cdot B$, $C = [c_{ij}] \in M_{m \times n}(K)$, $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$ $\leftarrow g \circ f$
 Dla $r \in \mathbb{N}$ oznaczamy $A^r = \underbrace{A \cdot \dots \cdot A}_{r\text{-razy}}$

- Transponowanie:** Niech $A \in M_{m \times n}(K)$, $A = [a_{ij}]$
 $C = A^T$, $C = [c_{ij}] \in M_{n \times m}(K)$, $c_{ij} = a_{ji}$

1 wiersz \rightarrow 1 kolumna c_{12} a_{21}
 2 wiersz \rightarrow 2 kolumna
 ...

nie tylko dla m. kwadr.
zmienia wymiar
 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$

Przykład 3.1.5.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

Jakie mnożenia są wykonalne? Wyznacz $C - 2D$, $\frac{1}{2} \cdot A^T$, AB , BA , D^2 .

$$C - 2D = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -6 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \cdot A^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} & 3 \end{bmatrix}$$

$D = AB \in M_2(\mathbb{R})$ schemat Falka

0	1	1 = 1 · 0 + 2 · 2 + 3 · (-1)
2	2	
-1	1	
1	8	
4	20	

$A \in M_{2 \times 3}$

$B \in M_{3 \times 2}$

poprawa

$G = BA \in M_3(\mathbb{R})$

1	2	3	A
4	5	6	
0	1	4	5
2	2	10	14
-1	1	3	3

$A \cdot B \in M_2(\mathbb{R})$ [1, 2, 3] · [0, 2, -1]
 $BA \in M_3(\mathbb{R})$
 $2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 10$
 $AB \neq BA$

$f \circ g \neq g \circ f$

$D^2 = D \cdot D \in M_2(\mathbb{R})$, $CA \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, zaś AC jest niewykonalne

$$CD \in M_2(\mathbb{R}), \quad DC \in M_2(\mathbb{R}), \quad CD = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 13 & 20 \end{bmatrix}, \quad DC = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 14 & 23 \end{bmatrix}, \quad CD \neq DC$$

nawet potęg wymiar się zgadza!

Własności działań na macierzach

Twierdzenie 3.1.6. Niech $A, B, C, \mathbf{0} \in M_{m \times n}(K)$, $\alpha, \beta \in K$. Wówczas prawdziwe są następujące równości.

i) $A + B = B + A$ *przemienność*

ii) $(A + B) + C = A + (B + C)$ *łączność*

iii) $A + \mathbf{0} = \mathbf{0} + A$ *d. neutralny +*

iv) $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot A$
 v) $\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B$ *rozdzielność*

vi) $(\alpha \cdot \beta) \cdot A = \alpha \cdot (\beta \cdot A)$ *mięszana łączność*

+ liab

Wniosek 3.1.7. $(M_{m \times n}(K), +)$ jest grupą abelową.

$A + (-A) = \mathbf{0}$

Twierdzenie 3.1.8. Niech A, B, C będą macierzami o elementach z K oraz niech $\alpha \in K$. Jeśli działania są wykonalne, to wówczas prawdziwe są następujące równości.

i) $(AB)C = A(BC)$ *Łączność*

ii) $(A + B)C = AC + BC$

iii) $A(B + C) = AB + AC$

iv) $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$

v) $AI = A$

vi) $IA = A$

A kwadratowa

I element neutralny

$$I = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

2 równania bo 1. i 2. reprezentują

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Wniosek 3.1.9. $(M_n(K), \cdot)$ jest półgrupą nieprzemiennej z jedyneką.

Twierdzenie 3.1.10. Niech A, B będą macierzami o elementach z K oraz niech $\alpha \in K, r \in \mathbb{N}$. Jeśli działania są wykonalne, to wówczas prawdziwe są następujące równości.

i) $(A^T)^T = A$

ii) $(A + B)^T = A^T + B^T$

iii) $(\alpha A)^T = \alpha \cdot A^T$

iv) $(AB)^T = B^T A^T$

v) $(A^r)^T = (A^T)^r$ $n=2$

$n=2$

$A \cdot A$

$(A^2)^T =$

$= (A \cdot A)^T =$

$= A^T \cdot A^T =$

$= (A^T)^2$

+ indukcja

wymiar OK

$A \cdot B = AB$

$\begin{pmatrix} 2 \times 3 & 3 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 4 \end{pmatrix}$

BA niemożliwe

$B^T \quad A^T$

$\begin{pmatrix} 4 \times 3 & 3 \times 2 \end{pmatrix}$

$(AB)^T$

4×2

B^T, A^T

4×2

Definicja 3.1.11. Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$. Sumę elementów na przekątnej $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ nazywamy śladem macierzy A i oznaczamy symbolem $\text{tr}(A)$.

Przykład 3.1.12. $\text{tr} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = 1 - 7 + 3 = -3$

"trace"

Własności śladu macierzy

Twierdzenie 3.1.13. Niech $A, B \in M_n(K), \alpha \in K$. Wówczas prawdziwe są następujące równości.

Transponowanie "nie rusza" przekątnej

i) $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$ ii) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$

iii) $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A)$ iv) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

Dowód. i), ii), iii) Wynika z definicji.

iv) Niech $C = AB = [c_{ij}], D = BA = [d_{ij}]$. Wówczas $c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{ki}$ oraz $\text{tr}C = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{ki}$. Ponadto $d_{ii} = \sum_{k=1}^n b_{ik}a_{ki}$ oraz $\text{tr}D = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ik}a_{ki}$. Zatem $\text{tr}C = \text{tr}D$. \square

$$\begin{aligned} \text{tr}(A^T B) &= \text{tr}((A^T B)^T) = \\ &= \text{tr}(B^T \cdot (A^T)^T) = \text{tr}(B^T \cdot A) \end{aligned}$$

na
prywatności

Wniosek 3.1.14. Jeśli $A, B \in M_{m \times n}(K)$, to wówczas $\text{tr}(A^T B) = \text{tr}(AB^T) = \text{tr}(B^T A) = \text{tr}(BA^T)$.

Dowód. Na mocy twierdzenia 3.1.13 i) mamy $\text{tr}(A^T B) = \text{tr}((A^T B)^T) = \text{tr} B^T A$ oraz $\text{tr}(AB^T) = \text{tr}((AB^T)^T) = \text{tr}(BA^T)$. Ponadto $\text{tr}(A^T B) = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n a_{ki} b_{ki}$ oraz $\text{tr}(AB^T) = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ik}$, skąd wynika teza. \square

Definicja 3.1.15. Macierz kwadratową $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$ nazywamy macierzą:

a) symetryczną, gdy $A = A^T$

$a_{ij} = a_{ji}$ — kwadratowa

b) antysymetryczną, gdy $A = -A^T$

$a_{ij} = -a_{ji}$ — wszczępółności

prostejtna
 $a_{ii} = -a_{ii}$

Twierdzenie 3.1.16. Każdą macierz kwadratową można przedstawić w postaci sumy macierzy symetrycznej i antisymetrycznej.

Dowód. $A = B + C$, gdzie $B = \frac{1}{2}(A + A^T)$, $C = \frac{1}{2}(A - A^T)$, $B = B^T$, $C = -C^T$. Ponadto $B^T = \left[\frac{1}{2}(A + A^T)\right]^T = \frac{1}{2}[(A + A^T)]^T = \frac{1}{2}(A^T + (A^T)^T) = \frac{1}{2}(A^T + A) = B$. Analogicznie sprawdzamy, że $C^T = -C$. \square

Przykład 3.1.17. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ macierz symetryczna

$a_{12} = a_{21} = 2$

symetria wzgl. diagonalu

$B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & -6 & 0 \end{bmatrix}$ macierz antisymetryczna

$a_{ij} = -a_{ji}$

Definicja 3.1.18. Macierz utworzoną z macierzy B_{ij} , dla $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ postaci

B_{11}	B_{12}	\dots	B_{1n}
B_{21}	B_{22}	\dots	B_{2n}
\dots	\dots	\ddots	\dots
B_{m1}	B_{m2}	\dots	B_{mn}

$[A | 0]$
 $[0 | B]$

nazywamy *macierzą blokową*. Macierze $B_{i1}, B_{i2}, \dots, B_{in}$ stojące w i -tym wierszu macierzy blokowej muszą mieć te same liczby wierszy, zaś macierze $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{mj}$ stojące w j -tej kolumnie muszą mieć te same liczby kolumn.

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \end{bmatrix}$

3.2 Wyznacznik macierzy

Definicja indukcyjna wyznacznika

Definicja 3.2.1. Wyznacznikiem macierzy kwadratowej $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$ nazywamy liczbę $\det A \in K$ określoną następująco:

- gdy $n = 1$, to $\det A = a_{11}$

- gdy $n \geq 2$, to $\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j} = (-1)^{1+1} a_{11} \det A_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} \det A_{12} + \dots + (-1)^{1+n} a_{1n} \det A_{1n}$,

gdzie A_{1j} oznacza macierz stopnia $n-1$ otrzymaną z macierzy A przez skreślenie pierwszego wiersza i j -tej kolumny.

Oznaczenia:

$$\det A = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

wyznacznik \rightarrow dla n kwadratowych
 rząd \rightarrow dla macierzy dowolnego
 wymiaru

$A = [a_{11}]$ determinant

suma n -wiersza i n -kolumny

zmiana znaku

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

Przykład 3.2.2. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

$$\det A = (-1)^{1+1} a_{11} \det A_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} \det A_{12} = 1 \cdot 1 \cdot 2 - 5 \cdot (-3) = 17$$

$$1 \cdot 2 - (-3) \cdot 5$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -3 & -6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\det B = (-1)^{1+1} a_{11} \det B_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} \det B_{12} + (-1)^{1+3} a_{13} \det B_{13} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -6 \\ -6 & 8 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} = -59$$

Metoda Sarrusa

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -3 & -6 & 8 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 8 + 2 \cdot (-6) \cdot 3 + (-3) \cdot (-2) \cdot (-6) - [3 \cdot 1 \cdot (-3) + (-6) \cdot (-6) \cdot 1 + 8 \cdot (-2) \cdot 2] = -59$$



odejmujemy

$$\det A = \det(A^T)$$

Definicja 3.2.3. Niech $A = [a_{ij}]$ będzie macierzą kwadratową stopnia n o elementach z K .

- Minorem elementu a_{ij} nazywamy wyznacznik macierzy A_{ij} stopnia $n-1$ otrzymanej poprzez skreślenie i -tego wiersza oraz j -tej kolumny macierzy A . Oznaczamy go symbolem M_{ij} .
- Dopełnieniem algebraicznym elementu a_{ij} nazywamy liczbę $D_{ij} := (-1)^{i+j} \cdot M_{ij} \in K$.

Przykład 3.2.4. $B = \begin{bmatrix} 1 & -22 & 3 \\ 11 & 17 & 16 \\ -3 & -6 & 80 \end{bmatrix}$

$a_{32} = -6$

$B_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 11 & 16 \end{bmatrix}, \quad M_{32} = \det B_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 11 & 16 \end{vmatrix} = 16 - 33 = -17$

$D_{32} = (-1)^{3+2} M_{23} = 17$ *minor*

dobrym alg. raionem

Twierdzenie 3.2.5 (Laplace'a). Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$, gdzie $n \geq 2$. Wówczas:

i) $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \det A = \sum_{k=1}^n a_{ik} D_{ik},$ *= $a_{i1} D_{i1} + a_{i2} D_{i2} + \dots + a_{in} D_{in}$ (rozwiniecie wzgledem i-tego wiersza)*

ii) $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \det A = \sum_{k=1}^n a_{kj} D_{kj}.$ *(rozwiniecie wzgledem j-tej kolumny)*

Przykład 3.2.6. $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ Rozwijamy wzgledem drugiego wiersza.

$\det C = 0 \cdot D_{21} + 2 \cdot D_{22} + (-1) \cdot D_{23} = 2 \cdot (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4$

$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

Rozwijamy wzgledem czwartej kolumny,

a potem wzgledem ostatniego wiersza.

$\det C = 4 \cdot (-1)^{5+4} M_{54} = -4 \cdot (3D_{41} + 2D_{42}) =$

$-12 \cdot (-1)^5 M_{41} - 8 \cdot (-1)^6 M_{42} = 12 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} - 8 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -40$

Wniosek 3.2.7. Niech $A = [a_{ij}] \in T_n^G(K)$ lub $A = [a_{ij}] \in T_n^D(K)$. Wówczas

$\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$ *amozlenie elementow ma przekatnej*

Przykład 3.2.8. $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -11 & 22 \\ 0 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$\det A = 5 \cdot (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & -11 & 22 \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 5 \cdot 3 \cdot (-1)^2 \begin{vmatrix} -1 & 7 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 5 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot 2$

$\det B = 10 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -60$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$A_1 \quad A_2$

Własności wyznaczników

Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$. Oznaczmy przez A_k k -tą kolumnę macierzy A , czyli $A = [A_1, A_2, \dots, A_n]$.

Twierdzenie 3.2.9. Niech $A \in M_n(K)$. Wówczas prawdziwe są następujące stwierdzenia.

$\det A =$
 $= \det B +$
 $= \det C$

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 10 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

- i) $\det A = \det(A^T)$ *wynika z tw. Laplace'a*
- ii) Jeśli pewna kolumna składa się z samych zer, to wówczas $\det A = 0$.
- iii) Jeśli macierz B powstaje z macierzy A poprzez pomnożenie jednej kolumny przez liczbę $\lambda \neq 0$, to wówczas $\det B = \lambda \cdot \det A$.
- iv) Jeśli $A_k = B_k + C_k$, to wówczas $\det A = \det[A_1, \dots, B_k, \dots, A_n] + \det[A_1, \dots, C_k, \dots, A_n]$
- v) Jeśli macierz B powstaje z macierzy A poprzez przestawienie między sobą dwóch kolumn, to wówczas $\det B = -\det A$. *$k_1 \leftrightarrow k_3$*
- vi) Jeśli istnieją $k, l \in \{1, 2, \dots, n\}$ takie, że $k \neq l$ oraz $A_k = \lambda A_l$, dla pewnego $\lambda \in K$, to wówczas $\det A = 0$. *$0 = A_k - \lambda \cdot A_l$ kolumny proporcjonalne*
- vii) Jeśli jedna z kolumn jest kombinacją liniową pozostałych, tzn. $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_{k-1}, \lambda_{k+1}, \dots, \lambda_n \in K : A_k = \sum_{j=1, j \neq k}^n \lambda_j \cdot A_j$, to wówczas $\det A = 0$.

Np

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 12 = -4$$

$2 \cdot 2 \cdot 4$
 $2 \cdot 2 \cdot 3$

viii) Jeśli do dowolnie wybranej kolumny dodamy kombinację liniową pozostałych kolumn macierzy A , to wyznacznik nie zmieni się.

$$A_1 = 2 \cdot A_2 + (-3) \cdot A_3$$


- ix) Jeśli $B \in M_n(K)$, to wówczas $\det(AB) = \det A \cdot \det B$
- x) Jeśli macierz A jest macierzą blokową postaci

tw. Cauchy'ego

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \dots & 0 \\ ? & B_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ ? & ? & \dots & B_n \end{pmatrix}$$

macierz zerowa

całkowicie



gdzie B_1, B_2, \dots, B_n są macierzami kwadratowymi (na ogół różnych stopni), 0 macierzami zerowymi, a $?$ dowolnymi macierzami odpowiednich wymiarów, to wówczas $\det A = \det B_1 \cdot \det B_2 \cdot \dots \cdot \det B_n$.

Wniosek 3.2.10.

i) Analogiczne własności zachodzą dla wierszy.

- ii) $\det(\lambda A) = \lambda^n \cdot \det A$ dla dowolnego $0 \neq \lambda \in K$
- iii) $\det(A^r) = (\det A)^r$ dla dowolnego $r \in \mathbb{N}$.

$$\det(A) = \det(A^T)$$

własność iii)

Np. $r = 2$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\det(A^2) = \det(A \cdot A) \stackrel{\text{tw. Cauchy'ego}}{=} (\det A) \cdot (\det A) = (\det A)^2 + \text{Dowod induk.}$$

Metoda operacji elementarnych obliczania wyznacznika

Operacje elementarne: $w_i \leftrightarrow w_j$ zamiana wierszy miejscami
 $\lambda \cdot w_i, \lambda \in K, \lambda \neq 0$ pomnożenie wiersza przez liczbę
 $w_i + \lambda \cdot w_j, \lambda \in K$ dodanie do w_i wielokrotności w_j

zwiększają wyznacznik
nie zmieniają wyznacznika

Przykład 3.2.11.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 10 & 1 \\ 3 & 2 & 10 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

ani jednego "0"

$$\det A \begin{matrix} w_1 \leftrightarrow w_2 \\ - \\ w_2 - 2w_1 \\ w_4 - w_1 \\ w_3 - 3w_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 10 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 10 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 10 & 1 \\ 0 & -1 & -17 & 2 \\ 0 & -1 & -20 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} w_3 - w_2 \\ - \\ - \\ - \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 10 & 1 \\ 0 & -1 & -17 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -5 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{matrix} -\frac{1}{3} \cdot w_3 \\ 3 \cdot \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 10 & 1 \\ 0 & -1 & -17 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -5 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} w_4 + 5w_3 \\ 3 \cdot \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 10 & 1 \\ 0 & -1 & -17 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{22}{3} \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot \frac{22}{3} = -22$$

tego sobieranie zaprzę

3.3 Macierz odwrotna

Definicja 3.3.1. Macierz $B \in M_n(K)$ nazywamy macierzą odwrotną do macierzy $A \in M_n(K)$, jeżeli $AB = BA = I_n$. Oznaczamy ją wówczas symbolem A^{-1} .

Przykład 3.3.2.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ?$$

$$AA^{-1} = I \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c & d \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow c = 0 \wedge c = 1 \text{ sprzeczność}$$

Zatem nie istnieje A^{-1} .

$$A^{-1} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$A \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & d \\ c & d \end{vmatrix}$$

||
 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Definicja 3.3.3. i) Macierz $A \in M_n(K)$, dla której istnieje macierz odwrotna, nazywamy macierzą odwracalną.

ii) Macierz $A \in M_n(K)$ taką, że $\det A = 0$ nazywamy macierzą osobliwą. W przeciwnym wypadku nazywamy ją macierzą nieosobliwą.

\Leftrightarrow WtU.

\rightarrow **Twierdzenie 3.3.4.** a) Macierz $A \in M_n(K)$ jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, gdy jest nieosobliwa. Macierz odwrotna jest wówczas określona jednoznacznie.

b) Niech $A \in M_n(K)$ będzie macierzą nieosobliwą, zaś $D = [D_{ij}]$ macierzą jej dopełnień algebraicznych. Wówczas $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot D^T$.

transponuj
 $a_{ij} \rightarrow D_{ij}$

$\det A \neq 0 \quad \frac{1}{\det A} \in K$

Definicja 3.3.5. Niech $A \in M_n(K)$ będzie macierzą nieosobliwą, zaś $D = [D_{ij}]$ macierzą jej dopełnień algebraicznych. Macierz D^T nazywamy macierzą dołączoną do macierzy A i oznaczamy symbolem A^D .

Wniosek 3.3.6. Zbiór macierzy kwadratowych nieosobliwych stopnia n o elementach z ciała K wraz z działaniem mnożenia macierzy tworzy grupę nieprzemianną. Grupę tę oznaczamy symbolem $GL_n(K)$ i nazywamy ogólną grupą liniową.


↑ general linear group

$GL(n, K)$

Metody wyznaczania macierzy odwrotnej

1. Za pomocą definicji

Przykład 3.3.7. $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ?$



$\det A = 11 \neq 0$, zatem A jest odwracalna.

$$AA^{-1} = I \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3a-b & 5a+2b \\ 3c-d & 5c+2d \end{bmatrix} = I \Leftrightarrow \begin{cases} 3a-b=1 \\ 5a+2b=0 \\ 3c-d=0 \\ 5c+2d=1 \end{cases} \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{11} & -\frac{5}{11} \\ \frac{1}{11} & \frac{3}{11} \end{bmatrix}$$

nieefektywne dla dużych "n"

2. Metoda dopełnień algebraicznych (metoda wyznacznikowa)

Przykład 3.3.8.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^D = ?$$

$\det A = -3 \neq 0$, zatem A jest odwracalna. Niech $M = [M_{ij}]$ oznacza macierz minorów elementów a_{ij} . Wówczas

$$M = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$4 = a_{23}$

$$D = [D_{ij}] = [(-1)^{i+j} M_{ij}] = \begin{bmatrix} 7 & -5 & 6 \\ -6 & 3 & -3 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot D^T = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 7 & -6 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

$(-1)^{2+3} \cdot M_{23} = (-1) \cdot 3$

$A \cdot A^{-1} = I_3$
 $= A^{-1} \cdot A = I_3$

3. Metoda operacji elementarnych (metoda bezwyznacznikowa)

op. elem.
 $w_i \leftrightarrow w_j$
 $\mathcal{L} \cdot w_i \quad \mathcal{L} \neq 0$
 $w_i + \beta \cdot w_j$

Niech $A \in M_n(K)$ będzie macierzą nieosobliwą.

macierz blokowa $\rightarrow [A|I] \xrightarrow[\text{tylko na wierszach!}]{\text{operacje elementarne}} [I|A^{-1}]$

Algorytm Gaussa: macierz nieosobliwa \rightarrow macierz trójkątna górna $\rightarrow I$

Metoda eliminacji Gaussa to praktyczny sposób używania metody operacji elementarnych.

Przykład 3.3.9.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = ?$$

I_4

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{w_3 - w_1} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{2}w_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{w_4 + w_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{2}w_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 - w_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 - 2w_2} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Zatem $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

Własności macierzy odwrotnej

Twierdzenie 3.3.10. Niech $A, B \in M_n(K)$, $\alpha \in K$, $\alpha \neq 0$, $r \in \mathbb{N}$. Jeśli macierze A i B są odwracalne, to wówczas macierze $A^{-1}, A^T, AB, \alpha A, A^r$ również są odwracalne i prawdziwe są następujące równości.

i) $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$

ii) $(A^{-1})^{-1} = A$

iii) $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

iv) $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} \cdot A^{-1}$

v) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

vi) $(A^r)^{-1} = (A^{-1})^r$

$(\mathcal{L} \cdot A) = \mathcal{L}^{-1} \cdot A^{-1}$
 $A = \det I = \det(A \cdot A^{-1}) \stackrel{\text{tw. Cauchy}}{=} \dots$

$= (\det A) \cdot (\det A^{-1}) \Rightarrow$

$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$

$A \cdot A^{-1} = I = (A^{-1}) \cdot A$

$(A \cdot A)^{-1} = (A^{-1}) \cdot (A^{-1}) = (A^{-1})^2$
 $(A^2)^{-1}$
 $\leftarrow \text{dow. ind}$

Twierdzenie 3.3.11. Jeśli macierz kwadratowa A jest macierzą blokowo-diagonalną

postaci $A = \begin{bmatrix} B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & B_k \end{bmatrix}$, to A jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, gdy

odwracalne są macierze B_1, B_2, \dots, B_k . Wówczas $A^{-1} = \begin{bmatrix} B_1^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2^{-1} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & B_k^{-1} \end{bmatrix}$.

TEMAT: *Macierz odwrotna. Układy równań liniowych*

4.1 Układy równań liniowych

Niech $K = \mathbb{R}$ lub $K = \mathbb{C}$. Rozważmy układ m równań liniowych z n niewiadomymi x_1, \dots, x_n o współczynnikach z K .


$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \dots & \dots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{cases}, \quad a_{ij}, b_i \in K, i \in \{1, 2, \dots, m\}, j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Liczby $a_{ij} \in K$ nazywamy *współczynnikami* układu, zaś liczby b_i *wyrazami wolnymi*. Jeśli $b_1 = \dots = b_m = 0$ to układ równań nazywamy *jednorodnym*. Jeśli $b_i \neq 0$ dla pewnego $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, to układ nazywamy *niejednorodnym*.

Rozwiązaniem układu nazywamy dowolny ciąg $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) \in K^n$ spełniający ten układ. Układ nie posiadający rozwiązań nazywamy *układem sprzecznym*, układ posiadający dokładnie jedno rozwiązanie - *układem oznaczonym*, zaś układ posiadający nieskończenie wiele rozwiązań - *układem nieoznaczonym*.


Przykład 4.1.1.

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$




układ oznaczony

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$$




układ nieoznaczony

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$$



układ sprzeczny

równania prostych ma płaszczyznę



Rozpatrywany układ równań liniowych jest równoważny z równaniem macierzowym $AX = B$, gdzie

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$


macierz współczynników

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

kolumna niewiadomych

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

kolumna wyrazów wolnych



Przykład 4.1.2.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Układy Cramera

Wzrost równań = wzrost niewiadomych $\Rightarrow A - m \cdot kwadratowy$

Definicja 4.1.3. Jeśli $m = n$ oraz macierz $A \in M_n(K)$ jest nieosobliwa, to układ równań $AX = B$ nazywamy układem Cramera.

$\det A \neq 0$

$0 \neq \det A$

Twierdzenie 4.1.4 (Cramera). Układ Cramera jest układem oznaczonym.

$AX = B$

Dowód. Ponieważ $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \exists A^{-1}$, mamy $X = A^{-1}B$. \square

Wniosek 4.1.5. Rozwiązanie układu Cramera ma postać $X = A^{-1}B$. Można je również znaleźć za pomocą wzorów Cramera

$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B$
 $I \cdot X = A^{-1}B$

$m=2 \quad W = \det A$
 w_x, w_y

$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$

gdzie A_i jest macierzą powstałą z macierzy A poprzez zastąpienie i -tej kolumny kolumną wyrazów wolnych B .

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}$
 $w_x = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad w_y = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 9 \end{vmatrix}$

Dowód. $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A^{-1}B = \frac{1}{\det A} D^T B = \frac{1}{\det A} [D_{ji}] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$

Stąd $x_j = \frac{1}{\det A} \sum_{i=1}^n b_i D_{ij} = \frac{1}{\det A} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$ \square

Przykład 4.1.6.

Układ $\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 2x + 4y = 1 \end{cases}$ jest równoważny równaniu $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$

$W = \det \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = 16 \neq 0 \Rightarrow$ układ jest układem Cramera $\Rightarrow \exists!$ rozw.

Metoda eliminacji:

$y = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}$, zatem $2x + 4(\frac{3}{2}x - \frac{5}{2}) = 1$, skąd $x = \frac{11}{8}$ oraz $y = -\frac{7}{16}$

Rozwiązanie równania macierzowego:

$X = A^{-1}B$, $A^{-1} = ?$
 $\det A = 16$, $D = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$, $X = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$
 $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 22 \\ -7 \end{bmatrix}$, $x = \frac{11}{8}$, $y = -\frac{7}{16}$

$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

Wzory Cramera:

$W = \det A = 16 \neq 0$, $W_x = \det A_1 = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 22$, $W_y = \det A_2 = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -7$,
 $x = \frac{W_x}{W} = \frac{22}{16}$, $y = \frac{W_y}{W} = -\frac{7}{16}$

Wniosek 4.1.7. i) Jedynym rozwiązaniem jednorodnego układu Cramera jest rozwiązanie zerowe $x_1 = \dots = x_n = 0$.

ii) Jeśli $\det A = 0$, to układ $AX = B$ jest nieoznaczony lub sprzeczny.

Przykład 4.1.8.

Układ $\begin{cases} 0x + 0y = 0 \\ 0x + 0y = 5 \end{cases}$ jest układem sprzecznym. Ponadto $W = W_x = W_y = 0$.

Uwaga 4.1.9. i) Można wykazać, że jeśli $\det A = 0$ oraz $\det A_k \neq 0$ dla pewnego $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, to układ jest sprzeczny.

ii) Jeśli $\det A = 0$ oraz $\det A_i = 0$ dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, to układ jest nieoznaczony lub sprzeczny.

$m \neq n$ na ogół
 \hookrightarrow równań \neq \neq niewiadomych

A - nie jest kwadratową

~~det A~~

Rząd macierzy

Definicja 4.1.10. Niech $A = [a_{ij}] \in M_{m \times n}(K)$. Minorem stopnia k macierzy A , gdzie $k \in \mathbb{N}, k \leq \min\{m, n\}$ nazywamy wyznacznik każdej macierzy kwadratowej otrzymanej z macierzy A poprzez skreślenie $m - k$ wierszy oraz $n - k$ kolumn.

Definicja 4.1.11. Rzędem macierzy $A \in M_{m \times n}(K), A \neq \mathbf{0}$ nazywamy największy stopień jej niezerowego minora. Liczbę tę oznaczamy $r(A)$ lub $\text{rank}(A)$. Ponadto przyjmujemy, że rząd dowolnej macierzy zerowej jest równy zero.

$$r(A) \leq \min\{m, n\}$$

$r(A)$

Przykład 4.1.12.

$A \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 10 & 2 & 3 & 9 \end{bmatrix}, r(A) \leq 3, \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \\ 10 & 3 & 9 \end{vmatrix} = -50 \neq 0, r(A) = 3$$

$\mathbb{R}^4 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 12 \\ 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, r(A) \leq 2, \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 12 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

$[1, 4, 3, 2] \in \mathbb{R}^4$
 $[3, 12, 9, 6]$

4×2

$$\begin{vmatrix} 4 & 12 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 0, r(B) = 1, \text{ Można zauważyć, że } k_2 = 3k_1.$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}, r(A) \leq 2, \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 0, \text{ ale } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, r(C) = 2$$

"liniowa niezależność"

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}, r(A) \leq 3, w_2 = 2w_1, w_3 = 3w_1, r(D) = 1$$

Wystarczy znaleźć jeden niezerowy

$w_3 = w_1 + w_2$

Twierdzenie 4.1.13 (Własności rzędu macierzy). Niech $A \in M_{m \times n}(K)$. Wówczas

- i) $r(A) = r(A^T)$,
- ii) operacje elementarne na wierszach (kolumnach) macierzy nie zmieniają jej rzędu.

Dowód. Teza wynika z własności wyznaczników. \square .

Definicja 4.1.14. Macierz $A \in M_{m \times n}(K)$ nazywamy *macierzą schodkową*, gdy pierwsze niezerowe elementy (tzw. schodki) w kolejnych niezerowych wierszach tej macierzy znajdują się w kolumnach o rosnących numerach. Ponadto przyjmujemy, że macierz o jednym niezerowym wierszu, a także dowolna macierz zerowa, są macierzami schodkowymi.

Przykład 4.1.15.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 6 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

4 schodki

4×6

$r(A) \leq 4$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}$$

3 schodki

Schodkami

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

to nie postać schodkowa

?

rosnący

trzeba coś jeszcze zrobić by mieć p. schodkowa

pivots

RREF

Row reduced echelon form

Twierdzenie 4.1.16. Rząd macierzy schodkowej jest równy liczbie jej niezerowych wierszy (tj. schodków).

Dowód. Skreślając wiersze zerowe i kolumny nie wyznaczające schodków, otrzymamy macierz trójkątna górną nieosobliwą. \square

Przykład 4.1.17.

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 5 & 7 & 10 \\ 4 & 6 & 8 & 9 & 3 \\ 4 & 7 & 7 & 8 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} D \in M_{4 \times 5}(\mathbb{R}) \\ r(D) \leq 4 \end{array}$$

$$D \xrightarrow[\begin{smallmatrix} w_3 - 4w_1 \\ w_4 - 4w_1 \end{smallmatrix}]{w_2 - 2w_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -7 & -17 \\ 0 & -1 & -5 & -8 & -17 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} w_4 + w_2 \end{smallmatrix}]{w_3 + 2w_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -9 & -17 \\ 0 & 0 & -6 & -9 & -17 \end{bmatrix}, \quad r(D) = 3$$

$w_4 - w_3$ $\circ \circ \circ \circ$

4.2 Twierdzenie Kroneckera-Capellego

Rozważmy układ m równań liniowych z n niewiadomymi x_1, \dots, x_n o współczynnikach z K postaci $AX = B$.

Macierz $U = [A|B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix} \in M_{m \times (n+1)}(K)$ nazywamy *macierzą uzupełnioną* układu $AX = B$.

macierz blokowa

(dwa jedno!)

Twierdzenie 4.2.1 (Kroneckera-Capellego). Układ równań liniowych $AX = B$ ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy $r(A) = r(U)$.

Dowód. Oznaczmy przez A_1, \dots, A_n kolejne kolumny macierzy A . Układ równoważny jest równaniu $x_1 A_1 + \dots + x_n A_n = B$. Układ posiada zatem rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy kolumna B jest kombinacją liniową kolumn A_1, \dots, A_n . \square

$p \Rightarrow q \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$

Wniosek 4.2.2. i) Gdy $r(A) \neq r(U)$, układ jest sprzeczny. \leftarrow *kontrapozycja*

ii) Gdy $r(A) = r(U) = n$, układ jest oznaczony.

iii) Gdy $r(A) = r(U) = r < n$, układ ma nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od $n - r$ parametrów.

Przykład 4.2.3.

$$\begin{cases} x - y + 3z = 5 \\ 4x + y + 7z = 8 \\ 5x + 2y + 8z = 4 \end{cases}$$

$$U = [A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 8 & 4 \end{array} \right], r(A) \leq 3, r(U) \leq 3$$

$\det A = 0 \Rightarrow r(A) \neq 3$
 $r(A) \leq 2$

$\det A = 0$ oraz $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, zatem $r(A) = 2$

$$U \xrightarrow[w_3 - 5w_1]{w_2 - 4w_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -5 & -12 \\ 0 & 7 & -7 & -21 \end{array} \right] \xrightarrow[\frac{1}{7}w_3]{\frac{1}{5}w_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{12}{5} \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{w_3 - w_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{12}{5} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{5} \end{array} \right]$$

$r(U) = 3 \neq r(A) \Rightarrow$ układ sprzeczny, brak rozwiązań

A 2 schodki 3 schodki U

$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = -\frac{3}{5}$
 sprzeczność

Algorytm rozwiązywania układów równań liniowych

1. Jeśli $r(A) < r(U)$, układ jest sprzeczny.

2. Niech $r(A) = r(U) = r$. Istnieje niezerowy minor M stopnia r macierzy A (będący również minorem macierzy U). Wówczas układ ma przynajmniej jedno rozwiązanie.

2a. Skreślamy $m - r$ wierszy macierzy U (równań układu), które nie tworzą M . Jeśli $r = n$, to otrzymujemy układ Cramera.

2b. Jeśli $r < n$, to $n - r$ niewiadomych, których współczynniki nie tworzą M , przenosimy na stronę wyrazów wolnych i traktujemy je dalej jako parametry (zmienną niezależną). Układ ma nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od $n - r$ parametrów. Mówiąc dokładniej r spośród niewiadomych oznaczanych x'_1, \dots, x'_r zależy od pozostałych $n - r$ niewiadomych x'_{r+1}, \dots, x'_n .

Przykład 4.2.4.

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ 3x + 2y - 5z = 4 \\ 4x + 5y - 13z = 1 \end{cases}$$

$n = 3$

$$U = [A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & -5 & 4 \\ 4 & 5 & -13 & 1 \end{array} \right], r(A) \leq 3, r(U) \leq 3$$

minor A
 minor U

$$U \xrightarrow[\text{zmiennne } y \ x \ z]{k_1 \leftrightarrow k_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \\ 5 & 4 & -13 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[w_3 + 5w_1]{w_2 + 2w_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 7 & 1 & 18 \\ 0 & 14 & 2 & 36 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 7 & 1 & 18 \end{array} \right]$$

$r(A) = 2 = r(U)$
 $r < n = 3$

$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} \neq 0$ minor niezerowy

$w \neq 0$

$w_3 = 2 \cdot w_2$

$\begin{cases} -y + 2x = 7 - 3z \\ 7x = 18 - z \end{cases}$ lub $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 - 3z \\ 18 - z \end{bmatrix}$

$w_y \ w_x \ x \ y = ?$

układ nieoznaczony, rozwiązania $\begin{cases} x = \frac{18}{7} - \frac{1}{7}z \\ y = -\frac{13}{7} + \frac{20}{7}z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$

∞ wiele rozv. zależnych od 1 parametru

Metoda eliminacji Gaussa

Dwa układy równań liniowych nazywamy równoważnymi, gdy posiadają ten sam zbiór rozwiązań. Operacje elementarne na wierszach macierzy U , skreślenie wiersza złożonego z samych zer lub skreślenie jednego z dwu wierszy proporcjonalnych (równych) nie zmieniają rzędu macierzy U , zatem prowadzą one do równoważnego układu równań. Ewentualne przestawienie kolumn macierzy A prowadzi do zmiany kolejności występowania niewiadomych.

$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0$
to równość

Dokonując równoważnych przekształceń układu równań $AX = B$, sprowadzamy macierz $U = [A|B]$ do postaci

$$[A'|B'] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} & & & s_{1,r+1} & \dots & s_{1,n} & z_1 \\ & I_r & & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & s_{r,r+1} & \dots & s_{r,n} & z_r \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & z_{r+1} \end{array} \right]$$

Układ równań przekształcić

Jeśli $z_{r+1} \neq 0$, to układ jest sprzeczny.

Jeśli ostatni wiersz się nie pojawi oraz $r = n$, układ jest oznaczony i jego rozwiązaniem jest $x_i = z_i$, dla $i \in \{1, 2, \dots, r\}$.

Jeśli ostatni wiersz się nie pojawi oraz $r < n$, układ jest nieoznaczony. Rozwiązania mają postać

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_r \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s_{1,r+1} & \dots & s_{1,n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ s_{r,r+1} & \dots & s_{r,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_{r+1} \\ x'_{r+2} \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$$

$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 5$ sprzeczne!
jedno równanie sprzeczne to układ sprzeczny

jak wyżej na przykład

Przykład 4.2.5.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 2 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 + x_4 = 3 \end{cases}$$

$n = 4$
 $r(u) \leq 3$
 $r(A) \leq 3$
na pewno nie jest oznaczony!

$$U = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & -1 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow[w_3 - 3w_1]{w_2 - w_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{w_3 - w_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Równanie $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -1$ jest sprzeczne, zatem układ jest sprzeczny.

! $-x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 1$
 $-11 = 0$

Przykład 4.2.6.

$$A \in M_5(\mathbb{R})$$

$$u \in \mathbb{R}^{5 \times 6}$$

$$r(A) \leq 5$$

$$r(u) \leq 5$$

$$\begin{cases} 2x + 4y + 9z - 5t + 6u = 13 \\ x + 2y + 4z - 4t + 2u = 5 \\ 3x + 6y + 7z - 11t + 2u = 18 \\ 4x + 8y + 19z - 15t + 11u = 20 \\ -\frac{1}{2}x - y + z + 3t + 2u = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$U = \left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & 4 & 9 & -5 & 6 & 13 \\ 1 & 2 & 4 & -4 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & 7 & -11 & 2 & 18 \\ 4 & 8 & 19 & -15 & 11 & 20 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 1 & 3 & 2 & -\frac{5}{2} \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} w_2 \leftrightarrow w_1 \\ -2 \cdot w_5 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} w_2 - 2w_1 \\ w_3 - 3w_1 \\ w_4 - 4w_1 \\ w_5 - w_1 \end{smallmatrix}}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 4 & -4 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & -6 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} k_2 \text{ za } k_5 \\ \text{zmiennie } x \ z \ t \ u \ y \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} w_3 + 5w_2 \\ w_4 - 3w_2 \end{smallmatrix}}$$

$w_5 = 2 \cdot w_4$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 4 & -4 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 16 & 6 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & -8 & -3 & 0 & -9 \end{array} \right] \xrightarrow[(-1) \cdot w_4]{\begin{smallmatrix} x & z & t & u & y \\ k_3 \leftrightarrow k_4 \\ \text{zmiennie } x \ z \ u \ t \ y \end{smallmatrix}}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 4 & 2 & -4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 8 & 0 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow[\frac{1}{3}w_3]{\begin{smallmatrix} w_1 - 2w_3 \\ w_2 - 2w_3 \end{smallmatrix}}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{3} & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{8}{3} & 0 & 3 \end{array} \right]$$

do I_3
param.
rozw.

równoważny układ $\begin{cases} x + 2y = 11 \\ z - \frac{7}{3}t = -3 \\ u + \frac{8}{3}t = 3 \end{cases}$ rozwiązania $\begin{cases} x = 11 - 2y \\ z = -3 + \frac{7}{3}t \\ u = 3 - \frac{8}{3}t \\ y, t \in \mathbb{R} \end{cases}$

$r(A) = r(U) = 3 < n = 5$ układ nieoznaczony, nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od $5 - 3 = 2$ parametrów

Uwaga 4.2.7. Podział niewiadomych na zmienne zależne i parametry nie jest jednoznaczny, lecz nie jest dowolny!

Przykład 4.2.8. Wskaż zbiory niewiadomych, które mogą być parametrami w rozwiązaniu układu równań.

$$\begin{cases} x - 3y + z - 2s + t = -5 \\ 2x - 6y - 4s + t = -10 \\ 2z + t = 0 \end{cases} \quad 3 \times 5$$

$$U = [A|B] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 1 & -2 & 1 & -5 \\ 2 & -6 & 0 & -4 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{w_2 - 2w_1} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

→ $\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$ $r := r(A) = r(U) = 2, n = 5, n - r = 3$ parametry

Trzy zmienne spośród pięciu można wybrać na $\binom{5}{3} = 10$ sposobów.

Nie wszystkie wybory są dozwolone.

minory niezerowe	parametry
k_1, k_3	$\{y, s, t\}$
k_1, k_5	$\{y, z, s\}$
k_2, k_3	$\{x, s, t\}$
k_2, k_5	$\{x, z, s\}$
k_4, k_3	$\{x, y, t\}$
k_4, k_5	$\{x, y, z\}$
k_3, k_5	$\{x, y, s\}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

7 możliwości



Uwaga 4.2.9. W przypadku gdy układ równań $AX = B$ jest układem Cramera, wykonując operacje elementarne **na wierszach** macierzy uzupełnionej $U = [A|B]$, sprowadzamy tę macierz do postaci $[I|X]$, gdzie X jest poszukiwanym rozwiązaniem układu.

$$[A|B] \xrightarrow[\text{na wierszach!}]{\text{operacje elementarne}} [I|X]$$

$\sigma(A) \leq m$
 $A \in M_{m \times (n+1)}$
 $A \in M_m(\mathbb{R})$
 $\det A \neq 0$
 \Downarrow
 $r(A) = m$
 $r(B)$

Przykład 4.2.10.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y - z = 0 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow[w_3 - w_1]{w_2 - 2w_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow[\frac{1}{2}w_3]{-\frac{1}{3}w_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{w_3 - w_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

układ oznaczony, jedyne rozwiązanie $x = 1, y = 1, z = 1$

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ y + z = 2 \\ -z = -1 \end{cases} \Rightarrow z = 1$$

43

$$x = 3 - y - z = 3 - 1 - 1 = 1$$

$$y = 2 - z = 1$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

Przykład 4.2.11. Określ ilość rozwiązań układu w zależności od parametru $p \in \mathbb{R}$.

Nie rozwiązyj!

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + (p+1)x_3 + (p+3)x_4 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + (2p+4)x_3 + (4p+6)x_4 = p+15 \\ (p+1)x_1 + 2x_2 + (p+1)x_3 + (p+3)x_4 = p+4 \\ x_1 + 2x_2 + (p+3)x_3 + (2p+2)x_4 = 11 \end{cases}$$

$$U = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & p+1 & p+3 & 4 \\ 2 & 4 & 2p+4 & 4p+6 & p+15 \\ p+1 & 2 & p+1 & p+3 & p+4 \\ 1 & 2 & p+3 & 2p+2 & 11 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} w_3-w_2 \\ w_4-w_1 \end{smallmatrix}]{w_2-2w_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & p+1 & p+3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2p & p+7 \\ p & 0 & 0 & 0 & p \\ 0 & 0 & 2 & p+1 & 7 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[\begin{smallmatrix} k_1 \text{ za } k_3 \\ \text{zmiennne } x_2 \ x_3 \ x_1 \ x_4 \end{smallmatrix}]{w_4-w_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & p+1 & 1 & p+3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 2p & p+7 \\ 0 & 0 & p & 0 & p \\ 0 & 2 & 0 & p+1 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{w_4-w_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & p+1 & 1 & p+3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 2p & p+7 \\ 0 & 0 & p & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1-p & -p \end{array} \right]$$

Wnioski:

Dla $p \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ mamy $r(A) = r(U) = n = 4$, zatem układ jest oznaczony.

Dla $p = 0$ ostatnia macierz przyjmuje postać

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

skąd otrzymujemy, że $r(A) = r(U) = 3 < n = 4$.
Zatem układ jest nieoznaczony.

Posiada nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od jednego parametru.

Dla $p = 1$ ostatnia macierz przyjmuje postać


$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

skąd otrzymujemy, że układ jest sprzeczny.

$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = -1$
 $r(A) = 3 \quad r(A) = 4$

TEMAT: *Geometria analityczna w \mathbb{R}^3*

$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
 $\psi(x, y, z)$



5.1 Wektory w przestrzeni

$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$ możemy interpretować jako:

- zbiór punktów $P = (x, y, z)$, gdzie x, y, z to współrzędne punktu
- zbiór wektorów zaczepionych w początku układu współrzędnych $\vec{a} = \overrightarrow{OP} = [x, y, z]$, gdzie x, y, z to współrzędne wektora
- zbiór wektorów swobodnych \vec{a} . Wektor swobodny to zbiór wszystkich wektorów zaczepionych (w różnych punktach) mających ten sam zwrot, kierunek i długość.




$\vec{v} = [a, b, c]$

Oznaczamy przez $\vec{0} = [0, 0, 0]$ wektor zerowy.

Działania na wektorach

Niech $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$, $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

- $\vec{u} + \vec{v} = [u_x + v_x, u_y + v_y, u_z + v_z]$ suma wektorów
- $\lambda \cdot \vec{u} = [\lambda u_x, \lambda u_y, \lambda u_z]$ iloczyn wektora przez skalar
- $-\vec{u} = [-u_x, -u_y, -u_z]$ wektor przeciwny do \vec{u}
- $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) = \vec{u} + (-1) \cdot \vec{v}$ różnica wektorów




Długość wektora

Oznaczamy przez $|\vec{u}|$ długość wektora \vec{u} . Jeśli $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$, to wówczas

$\overrightarrow{P_1 P_2} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$, $|\overrightarrow{P_1 P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.

$\vec{u} \sim \hat{u}$
wektor



jednostkowy

Wektor długości 1 nazywamy wersorem. Oznaczamy przez $\hat{i} = [1, 0, 0]$, $\hat{j} = [0, 1, 0]$, $\hat{k} = [0, 0, 1]$ wersory osi układu współrzędnych. Wówczas zapis $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$ oznacza $\vec{u} = u_x \hat{i} + u_y \hat{j} + u_z \hat{k}$. Ponadto $|\vec{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$.

Własności długości: $|\vec{u}| = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$, $|\lambda \cdot \vec{u}| = |\lambda| \cdot |\vec{u}|$, $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$.

$u_x \cdot [1, 0, 0] + u_y \cdot [0, 1, 0] + u_z \cdot [0, 0, 1]$
 $= [u_x, 0, 0] + [0, u_y, 0] + [0, 0, u_z]$
nie równość trójkąta

Wersorem niezerowego wektora \vec{u} nazywamy wektor o tym samym kierunku i zwrocie co \vec{u} . Oznaczamy go \hat{u} . Oczywiście $\hat{u} = \frac{1}{|\vec{u}|} \cdot \vec{u}$.

$|\vec{u}| = 5$ $|\hat{u}| = 1$
 $\frac{1}{5} \hat{u}$



Jeśli $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$, to $\hat{u} = \left[\frac{u_x}{|\vec{u}|}, \frac{u_y}{|\vec{u}|}, \frac{u_z}{|\vec{u}|} \right]$ oraz

Normować wektor

$|\hat{u}| = \sqrt{\frac{u_x^2}{|\vec{u}|^2} + \frac{u_y^2}{|\vec{u}|^2} + \frac{u_z^2}{|\vec{u}|^2}} = \frac{1}{|\vec{u}|} \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = 1$.

Jeśli wektor $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$ tworzy z dodatnimi półosiami układu współrzędnych kąty α, β, γ , odpowiednio, to kąty te nazywamy kątami kierunkowymi, zaś współrzędne wersora \hat{u} , czyli liczby $\cos \alpha = \frac{u_x}{|\vec{u}|}$, $\cos \beta = \frac{u_y}{|\vec{u}|}$, $\cos \gamma = \frac{u_z}{|\vec{u}|}$ nazywamy cosinusami kierunkowymi wektora \vec{u} .

$|\vec{u}| = 1$
 $\cos \alpha = u_x$
 $\cos \beta = u_y$
 $\cos \gamma = u_z$



Iloczyn skalarny

kąt
 umowa
 zero miara

Oznaczamy przez $\angle(\vec{u}, \vec{v})$ kąt między wektorami \vec{u}, \vec{v} . Przyjmujemy, że należy on do przedziału $[0, \pi]$.

Definicja 5.1.1. Iloczynem skalarnym dwóch niezerowych wektorów \vec{u}, \vec{v} nazywamy liczbę $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \angle(\vec{u}, \vec{v})$. Oznaczamy ją symbolem $\vec{u} \circ \vec{v}$. Gdy jeden z wektorów jest zerowy, przyjmujemy, że iloczyn jest równy 0.

skalar
 wektora

Twierdzenie 5.1.2. Jeśli $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$, $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$, to wówczas $\vec{u} \circ \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$.

Przykład 5.1.3. $[1, 4, 0] \circ [2, -1, 1] = 1 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 = -2 < 0$
 Cosinus kąta między wektorami jest ujemny, zatem kąt jest rozwarty.



$\angle(\vec{u}, \vec{v}) \in [0, \pi]$ I lub II ćw II ćw


Twierdzenie 5.1.4 (Własności iloczynu skalarnego). Dla dowolnego $\lambda \in \mathbb{R}$ i dla dowolnych wektorów $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ prawdziwe są następujące równości.

- i) $\vec{u} \circ \vec{v} = \vec{v} \circ \vec{u}$ *z definicji*
- ii) $\vec{u} \circ \vec{u} = |\vec{u}|^2$ *kwadrat długości* $\vec{u} \circ \vec{u} \stackrel{II}{=} u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$
- iii) $(\lambda \vec{u}) \circ \vec{v} = \lambda(\vec{u} \circ \vec{v})$
- iv) $(\vec{u} + \vec{v}) \circ \vec{w} = (\vec{u} \circ \vec{w}) + (\vec{v} \circ \vec{w})$ *rozdzielność*
- v) $|\vec{u} \circ \vec{v}| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$ *bo $|\cos \alpha| \leq 1$*
- vi) $\vec{u} \neq \vec{0}, \vec{v} \neq \vec{0}, \vec{u} \circ \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$

Dowód. Wynika wprost z definicji. \square

Układ współrzędnych

Układ współrzędnych w \mathbb{R}^3 - trójka wzajemnie prostopadłych prostych, przecinających się w jednym punkcie, zwanym początkiem układu współrzędnych.



Reguła prawej dłoni

Definicja 5.1.5. Uporządkowana trójka wektorów $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ ma orientację zgodną z orientacją układu współrzędnych, jeśli

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} > 0.$$

Iloczyn wektorowy

Dwa wektory \vec{u}, \vec{v} nazywamy współliniowymi lub kolinearnymi, gdy istnieje prosta, w której zawarte są te wektory. Piszemy wówczas $\vec{u} \parallel \vec{v}$.



Definicja 5.1.6. Iloczynem wektorowym uporządkowanej pary niewspółliniowych wektorów \vec{u}, \vec{v} nazywamy wektor \vec{w} taki, że:

- i) $\vec{w} \perp \vec{u}, \vec{w} \perp \vec{v}$,
- ii) $|\vec{w}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$,

kierunek długości



(\vec{u}, \vec{v}) to inna para niż (\vec{v}, \vec{u})



zwrot

iii) orientacja trójki $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ jest zgodna z orientacją układu współrzędnych.

RPD

Wektor \vec{w} oznaczamy symbolem $\vec{u} \times \vec{v}$.


Jeśli $\vec{u} = \vec{0}$ lub $\vec{v} = \vec{0}$, to przyjmujemy $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$.

Przykład 5.1.7. $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$
 $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}, \quad \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}, \quad \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}, \quad \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$



bo kat = 0

zwrot



Twierdzenie 5.1.8. Jeśli $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z], \vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$, to wówczas

Reguła mnemotechniczna

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

$(-1)^2 \cdot i$

$+ (-1)^3 \cdot j$

$+ (-1)^4 \cdot k$

wektory

liniowy

$\hat{i} = [1, 0, 0]$
 $\hat{j} = [0, 1, 0]$
 $\hat{k} = [0, 0, 1]$

Dowód. Niech $\vec{w} = \left[\begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \right]$. Uzasadnimy, że \vec{w} ma ten sam kierunek, zwrot oraz długość co wektor $\vec{u} \times \vec{v}$.

Zauważmy, że $\vec{w} \perp \vec{u}$ oraz $\vec{w} \perp \vec{v}$. Istotnie $\vec{w} \circ \vec{u} = u_x \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} - u_y \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} +$

$$u_z \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = 0$$
 i podobnie $\vec{w} \circ \vec{v} = 0$.

$$\begin{aligned} \text{Ponadto } |\vec{w}| &= |\vec{u} \times \vec{v}|, \text{ bowiem } |\vec{w}|^2 = (u_y v_z - v_y u_z)^2 + (u_x v_z - v_x u_z)^2 + (u_x v_y - v_x u_y)^2 = \\ &= (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) - (u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z)^2 = |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \circ \vec{v})^2 = \\ &= |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 \cdot (1 - \cos^2 \angle(\vec{u}, \vec{v})) = (|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \angle(\vec{u}, \vec{v}))^2. \end{aligned}$$

Jeśli \vec{u}, \vec{v} są niewspółliniowe, to $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \angle(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$, skąd wynika, że $|\vec{w}| > 0$.

$$\begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = w_x \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} - w_y \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} + w_z \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = w_x^2 + w_y^2 + w_z^2 = |\vec{w}|^2.$$

Jak zaobserwowaliśmy $|\vec{w}|^2 > 0$, więc trójka $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ ma orientację zgodną z orientacją układu współrzędnych. \square

nie obowiązuje!

Przykład 5.1.9. Niech $\vec{u} = [1, 2, -3], \vec{v} = [3, 4, 5]$. Korzystamy z twierdzenia Laplace'a

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = [22, -14, -2]$$

lub metody Sarrusa

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 10\hat{i} + 4\hat{k} - 9\hat{j} - 6\hat{k} + 12\hat{i} - 5\hat{j} = 22\hat{i} - 14\hat{j} - 2\hat{k}.$$

Twierdzenie 5.1.10 (Własności iloczynu wektorowego). Dla dowolnego $\lambda \in \mathbb{R}$ i dla dowolnych wektorów $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ prawdziwe są następujące równości.

i) $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$

iv) $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$

ii) $\lambda(\vec{u} \times \vec{v}) = (\lambda\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (\lambda\vec{v})$

v) $|\vec{u} \times \vec{v}| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$

iii) $(\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w})$

vi) $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow (\vec{u} \parallel \vec{v} \vee \vec{u} = \vec{0} \vee \vec{v} = \vec{0})$

rozdzielność (bo \times nieprzem.)
 $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v}) \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$




możesz dzielić

Dowód. Własności i),ii),iii),iv) wynikają z odpowiednich własności wyznaczników.

v) $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \angle(\vec{u}, \vec{v}) \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$


vi) Jeśli $\vec{u} \neq \vec{0}, \vec{v} \neq \vec{0}$, to $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \sin \angle(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \Leftrightarrow \angle(\vec{u}, \vec{v}) \in \{0, \pi\}$. \square

Reguła prawej dłoni:



$\vec{v} \times \vec{u}$

$S_{\square} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha = |\vec{u} \times \vec{v}|$



Uwaga 5.1.11. Pole równoległoboku rozpiętego na wektorach \vec{u}, \vec{v} równe jest $|\vec{u} \times \vec{v}|$.

Iloczyn mieszany


Definicja 5.1.12. Niech $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z], \vec{v} = [v_x, v_y, v_z], \vec{w} = [w_x, w_y, w_z]$. Iloczynem mieszanym uporządkowanej trójki wektorów $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ nazywamy liczbę $(\vec{u} \times \vec{v}) \circ \vec{w}$. Oznaczamy ją symbolem $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

$\sin \alpha = \frac{h}{|\vec{v}|}$

Twierdzenie 5.1.13. Niech $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z], \vec{v} = [v_x, v_y, v_z], \vec{w} = [w_x, w_y, w_z]$. Wówczas

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$


Dowód. $\begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = w_x \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} - w_y \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} + w_z \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} =$
 $= [w_x, w_y, w_z] \circ \left[\begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \right] = \vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v}) \quad \square$



Uwaga 5.1.14. Objętość równoległościanu rozpiętego na wektorach $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ równa jest $|\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}|$.

Dowód. Niech $\alpha = \angle(\vec{u} \times \vec{v}, \vec{w})$. Ponieważ $V = P_p \cdot d = |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot h$ oraz $\cos \alpha = \frac{h}{|\vec{w}|}$, zatem $V = |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cos \alpha = \vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v})$. \square

Przykład 5.1.15. Czy punkty $A = (1, 0, 2), B = (5, 1, 5), C = (3, -1, 2), D = (1, 3, 5)$ leżą w jednej płaszczyźnie?



Punkty leżą w jednej płaszczyźnie wtedy i tylko wtedy, gdy objętość czworościanu rozpiętego na wektorach $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ jest równa zero.

$$\overrightarrow{AB} = [4, 1, 3], \overrightarrow{AC} = [2, -1, 0], \overrightarrow{AD} = [0, 3, 3]$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -12 + 18 - 6 = 0$$

Punkty są współpłaszczyznowe (komplanarne).

Twierdzenie 5.1.16 (Własności iloczynu mieszanego). Dla dowolnego $\lambda \in \mathbb{R}$ i dla dowolnych wektorów $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{a}$ prawdziwe są następujące równości.

To też może być def.

i) $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u})$

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \stackrel{\text{DEF}}{=} (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$
 $(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) = (\vec{v} \times \vec{u}) \cdot \vec{w} = -(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = -(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$
 $(\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}) = (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

ii) $\lambda(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\lambda\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \lambda\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \lambda\vec{w})$

iii) $(\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}, \vec{a}) = (\vec{u}, \vec{w}, \vec{a}) + (\vec{v}, \vec{w}, \vec{a})$

rozdzielność

$u \ v \ w$	-
$v \ u \ w$	+
$v \ w \ u$	-



iv) $|(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot |\vec{w}|$

Dowód. i), ii), iii) Teza wynika z odpowiednich własności wyznacznika.

iv) Niech α to kąt między wektorami $\vec{u} \times \vec{v}$ oraz \vec{w} . Wówczas

$$|(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})| = |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot |\cos \alpha| \leq |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot |\vec{w}| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot |\vec{w}|. \quad \square$$

5.2 Płaszczyzna w przestrzeni \mathbb{R}^3



Równanie ogólne i normalne płaszczyzny

Niech $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ będzie ustalonym punktem, zaś $\vec{n} = [A, B, C] \neq \vec{0}$ ustalonym wektorem. Wówczas zbiór

$$\pi = \{P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \overrightarrow{P_0P} \perp \vec{n}\}$$

$P_0 \in \pi$
 $\vec{0} = P_0 \vec{P}_0$

$P \in \pi \Leftrightarrow P_0P \perp \vec{n}$

jest płaszczyzną przechodzącą przez punkt P_0 i prostopadłą do wektora \vec{n} . Wektor \vec{n} nazywamy *wektorem normalnym* płaszczyzny π .

$P \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

$P = (x, y, z) \quad P_0 = (x_0, y_0, z_0)$

$\overrightarrow{P_0P} = [x - x_0, y - y_0, z - z_0]$

Równanie normalne: $\pi : A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

Równanie ogólne: $\pi : Ax + By + Cz + D = 0, \quad D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$

$\pi \perp \vec{n} = [A, B, C]$

Przykład 5.2.1. $P_0 = (1, 2, 5), \vec{n} = [1, -1, 3], P_0 \in \pi, \vec{n} \perp \pi, \pi = ?$

$\pi : 1 \cdot (x - 1) + (-1) \cdot (y - 2) + 3 \cdot (z - 5) = 0$ równanie normalne

$\pi : x - y + 3z - 14 = 0$ równanie ogólne $P_0P = [x-1, y-2, z-5]$

Równanie parametryczne płaszczyzny

Niech $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ będzie ustalonym punktem, zaś $\vec{a} = [a_x, a_y, a_z] \neq \vec{0}, \vec{b} = [b_x, b_y, b_z] \neq \vec{0}$ ustalonymi wektorami niewspółliniowymi, tj. $\vec{a} \nparallel \vec{b}$. Wówczas zbiór

$\pi = \{P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \exists t, s \in \mathbb{R} \overrightarrow{P_0P} = t\vec{a} + s\vec{b}\}$

jest płaszczyzną przechodzącą przez punkt P_0 i równoległą do wektorów \vec{a}, \vec{b} . Mówimy, że wektory \vec{a}, \vec{b} są wektorami rozpinającymi płaszczyznę π .

$\overrightarrow{P_0P} = t\vec{a} + s\vec{b} \Leftrightarrow [x - x_0, y - y_0, z - z_0] = t[a_x, a_y, a_z] + s[b_x, b_y, b_z]$

Równanie parametryczne: $\pi : \begin{cases} x = x_0 + t \cdot a_x + s \cdot b_x \\ y = y_0 + t \cdot a_y + s \cdot b_y \\ z = z_0 + t \cdot a_z + s \cdot b_z \end{cases}, t, s \in \mathbb{R}$

Przykład 5.2.2. Napisz równanie parametryczne płaszczyzny π przechodzącej przez punkty $A = (1, 1, 4), B = (2, 5, 4)$ i równoległej do osi Oy .

$\overrightarrow{AB} = [1, 4, 0] \parallel \pi, \hat{j} = [0, 1, 0] \parallel Oy \Rightarrow \hat{j} \parallel \pi, A \in \pi$

$\pi : \begin{cases} x = 1 + 1 \cdot t + 0 \cdot s = 1 + t \\ y = 1 + 4 \cdot t + 1 \cdot s = 1 + 4t + s \\ z = 4 + 0 \cdot t + 0 \cdot s = 4 \end{cases}, t, s \in \mathbb{R}$

Inne równania płaszczyzny

1) Równanie postaci $\pi : \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, gdzie $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, opisuje płaszczyznę przechodzącą przez punkty $(a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$. Jest to tzw. równanie odcinkowe płaszczyzny.

$\overrightarrow{AB} = [-a, b, 0] \quad \overrightarrow{AC} = [-a, 0, c]$

2) Równanie płaszczyzny przechodzącej przez trzy niewspółliniowe punkty $P_1 = (x_1, y_1, z_1), P_2 = (x_2, y_2, z_2), P_3 = (x_3, y_3, z_3)$ ma postać

$\pi : \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$

Istotnie, ponieważ $\overrightarrow{P_1P_2} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1], \overrightarrow{P_1P_3} = [x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1] \parallel \pi$ oraz $\vec{n} = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} \perp \pi$, zatem

$\pi = \{P = (x, y, z) : \overrightarrow{P_1P} \perp \vec{n}\} = \{P = (x, y, z) : [x - x_1, y - y_1, z - z_1] \circ \vec{n} = 0\}$.

5.3 Prosta w przestrzeni \mathbb{R}^3

Równanie parametryczne i kierunkowe prostej

Niech $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ będzie ustalonym punktem, zaś $\vec{a} = [a_x, a_y, a_z] \neq \vec{0}$ ustalonym wektorem. Wówczas zbiór

$$l = \{P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{a}\}$$

jest prostą przechodzącą przez punkt P_0 i równoległą do wektora \vec{a} . Wektor \vec{a} nazywamy *wektorem kierunkowym* prostej l .

$$P_0 \in l \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} : \overrightarrow{P_0P} = t\vec{a}$$

Równanie postaci $l : \begin{cases} x = x_0 + t \cdot a_x \\ y = y_0 + t \cdot a_y \\ z = z_0 + t \cdot a_z \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ nazywamy *równaniem parametrycznym* prostej l .

Rugując z każdego z powyższych równań parametr t otrzymujemy równanie postaci $l :$

$$t = \frac{x-x_0}{a_x} = \frac{y-y_0}{a_y} = \frac{z-z_0}{a_z}, \text{ które nazywamy } \underline{\text{równaniem kierunkowym}} \text{ prostej } l.$$

Równanie krawędziowe prostej

Niech $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, gdzie $A_1^2 + B_1^2 + C_1^2 \neq 0, A_2^2 + B_2^2 + C_2^2 \neq 0$ będą dwiema nierównoległymi płaszczyznami. Ich częścią wspólną jest prosta $l = \pi_1 \cap \pi_2$.


$$P \in l \Leftrightarrow (P \in \pi_1 \wedge P \in \pi_2)$$

$$\text{Równanie krawędziowe: } l : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$



Przykład 5.3.1. Napisz równanie prostej l przechodzącej przez punkt $P_0 = (2, 3, 1)$ i równoległej do płaszczyzn $\pi_1 : 6x - y + z - 2 = 0, \pi_2 : x + 3y - 2z + 1 = 0$.

Oznaczmy $\vec{n}_1 = [6, -1, 1] \perp \pi_1, \vec{n}_2 = [1, 3, -2] \perp \pi_2$ oraz $\vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 \parallel l$.

$$\text{Wówczas } \vec{a} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 6 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = [-1, 13, 19] \text{ oraz } l : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 13t \\ z = 1 + 19t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$



$$[x-x_0, y-y_0, z-z_0] = [ta_x, ta_y, ta_z]$$



TEMAT: Geometria analityczna w \mathbb{R}^3 - ciąg dalszy

6.1 Wzajemne położenie płaszczyzn i prostych


Wzajemne położenie płaszczyzn

Niech $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \vec{n}_1 = [A_1, B_1, C_1] \neq \vec{0}$,
 $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \vec{n}_2 = [A_2, B_2, C_2] \neq \vec{0}$.

Szukanie punktów wspólnych π_1 oraz π_2 polega na rozwiązaniu układu równań $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -D_1 \\ -D_2 \end{bmatrix}.$$

Niech $A = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & -D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & -D_2 \end{bmatrix}$.



Płaszczyzny mogą być równoległe. $\pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow n_1 \parallel n_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0}$

Wówczas albo $\pi_1 = \pi_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$, gdy $r(U) = r(A) = 1$

2 parametry




albo $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$, gdy $r(U) = 2, r(A) = 1$.

Twierdzenie
 - Capelli

Gdy $r(U) = r(A) = 2$, płaszczyzny $\pi_1 \not\parallel \pi_2$ przecinają się wzdłuż prostej.
 W szczególności mogą być prostopadłe.

$m=3, r=2, m-r=1$ 2 parametry



$$\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \circ \vec{n}_2 = 0$$



Wzajemne położenie prostych

Niech \vec{a} będzie wektorem kierunkowym prostej l , przechodzącej przez punkt P_1 , zaś \vec{b} wektorem kierunkowym prostej k , przechodzącej przez punkt P_2 .

Proste mogą być równoległe. $l \parallel k \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.
Wówczas albo $l = k$, albo $l \cap k = \emptyset$.





Gdy $l \nparallel k$, możliwe są dwie sytuacje.

1) Proste l i k leżą w jednej płaszczyźnie, co jest równoważne stwierdzeniu, że wektory $\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{a}, \vec{b}$ leżą w jednej płaszczyźnie. Wówczas l i k mają jeden punkt wspólny tj. $l \cap k = \{P\}$,

2) Proste l i k nie leżą w jednej płaszczyźnie (tzw. proste skośne), co jest równoważne stwierdzeniu, że wektory $\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{a}, \vec{b}$ nie leżą w jednej płaszczyźnie. Wówczas $l \cap k = \emptyset$.

Zatem proste l i k są skośne wtedy i tylko wtedy gdy $(\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{a}, \vec{b}) \neq 0$.





$l \nparallel k$
 $l \cap k = \emptyset$
skośne


Kąty

Definicja 6.1.1. i) Kątem między dwiema prostymi nazywamy kąt ostry (lub prosty, gdy proste są prostopadłe) między odpowiednio zwróconymi wektorami kierunkowymi tychże prostych.



ii) Kątem między dwiema płaszczyznami nazywamy kąt ostry (lub prosty, gdy płaszczyzny są prostopadłe) między odpowiednio zwróconymi wektorami normalnymi tychże płaszczyzn.



kąt (geom.)
miara kąta (liczb.)





- Definicja 6.1.2.** i) Rzutem prostokątnym punktu P na płaszczyznę π nazywamy punkt $P' \in \pi$ taki, że $PP' \perp \pi$.
- ii) Rzutem prostokątnym punktu P na prostą l nazywamy punkt $P' \in l$ taki, że $PP' \perp l$.





Można zdefiniować *rzut ukośny* w kierunku danego wektora.

Rzut punktu P na płaszczyznę π w kierunku wektora $\vec{v} \parallel \pi$:



Rzut punktu P na prostą l w kierunku wektora \vec{v} , o którym zakładamy, że należy do płaszczyzny zawierającej P oraz l :




l i k muszą się przecinać by rzut P istniał

Przykład 6.1.3. Wyznacz rzut prostokątny punktu $P = (4, 5, -3)$ na płaszczyznę

$$\pi : \begin{cases} x = 2 + 2t + s \\ y = 1 + 3s \\ z = 3 + t + s \end{cases}, t, s \in \mathbb{R}.$$

$P \in \pi$
 $P = P'$
 ruz



Niech k będzie prostą taką, że $k \perp \pi$, $P \in k$.

$\vec{u} = [2, 0, 1] \parallel \pi$, $\vec{v} = [1, 3, 1] \parallel \pi$, $A = (2, 1, 3) \in \pi$


$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} \perp \pi$, $\vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = [-3, -1, 6]$, $k \perp \pi \Rightarrow k \parallel \vec{n}$

$k : \begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = 5 - t \\ z = -3 + 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$, $\pi : -3(x - 2) - (y - 1) + 6(z - 3) = 0$

$\pi : 3x + y - 6z + 11 = 0$ $\{P'\} = k \cap \pi = ?$
 $3(4 - 3t) + 5 - t - 6(-3 + 6t) = 0 \Rightarrow t = 1, P' = (1, 4, 3)$

Podobnie, $t = 1$

Definicja 6.1.4. Kątem między płaszczyzną a prostą nazywamy kąt o mierze $\frac{\pi}{2} - \alpha$, gdzie α to miara kąta ostrego (lub prostego, gdy prosta i płaszczyzna są równoległe) między odpowiednio zwróconym wektorem kierunkowym prostej a wektorem normalnym płaszczyzny.



β - rzut prostokątny l na π
 $\beta := \angle(\pi, l)$
 $\alpha := \angle(\vec{n}, \vec{a})$
 $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$


Przykład 6.1.5. Wyznacz kąt między prostą $l : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

a płaszczyzną $\pi : 3x + y + z - 1 = 0$.

Mamy $\vec{a} = [-1, 0, 2] \parallel l$, $\vec{n} = [3, 1, 1] \perp \pi$. Oznaczmy $\beta = \angle(\vec{n}, \vec{a})$, $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$.

Obliczamy $\cos \beta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|} = \frac{|-3+0+2|}{\sqrt{9+1+1} \cdot \sqrt{1+0+4}} = \frac{1}{\sqrt{55}}$, $\alpha = \frac{\pi}{2} - \arccos \frac{1}{\sqrt{55}}$,

albo $\sin \alpha = \cos \beta \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{55}}$



$\vec{n} \cdot \vec{a} = |\vec{n}| \cdot |\vec{a}| \cos \beta$




$\cos \varphi > 0$
 $\cos(\pi - \varphi) = -\cos \varphi$

$\frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|}$

kąt osty (105) -> jego cosinus dodatni

Odległości

- Definicja 6.1.6.** i) *Odległością punktu P od płaszczyzny π , nazywamy długość odcinka PP' , gdzie P' jest rzutem prostokątnym P na π . Oznaczamy ją $d(P, \pi)$.*
- ii) *Odległością punktu P od prostej l , nazywamy długość odcinka PP' , gdzie P' jest rzutem prostokątnym P na l . Oznaczamy ją $d(P, l)$.*



Wzór na odległość punktu od płaszczyzny

Niech $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ oraz $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, $\vec{n} = [A, B, C] \neq \vec{0}$. Wówczas

$$d(P_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{|\vec{n}|}$$

Istotnie, niech k będzie prostą taką, że $P_0 \in k$, $k \perp \pi$. Wówczas $k : \begin{cases} x = x_0 + At \\ y = y_0 + Bt \\ z = z_0 + Ct \end{cases}$

$$\{P'_0\} = k \cap \pi = ?$$

$$A(x_0 + At) + B(y_0 + Bt) + C(z_0 + Ct) + D = 0, \quad t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$d(P, \pi) = |P_0 P'_0| = \sqrt{(At)^2 + (Bt)^2 + (Ct)^2} = |t| \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Wzór na odległość punktu od prostej

Niech $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ oraz niech l będzie prostą przechodzącą przez punkt P_1 o wektorze kierunkowym \vec{a} . Wówczas


$$d(P_0, l) = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$$

$$P_{\square} = |\vec{a}| \cdot h$$

$$h = \frac{P_{\square}}{|\vec{a}|}$$


$$P_n \in l \quad \text{jakiś}$$

$$\overrightarrow{P_n P_0}$$




Odległość prostej od płaszczyzny

Jeśli prosta l nie przecina płaszczyzny π , to wówczas odległością prostej l od płaszczyzny π nazywamy odległość dowolnego punktu prostej od płaszczyzny.




Definicja 6.1.7. Odległością dwóch płaszczyzn (prostych) równoległych nazywamy odległość dowolnego punktu jednej z nich od drugiej.

Można wykazać, że dla płaszczyzn równoległych $\pi_1 : Ax + By + Cz + D_1 = 0$, $\pi_2 : Ax + By + Cz + D_2 = 0$, $\vec{n}_2 = [A, B, C] \neq \vec{0}$ zachodzi wzór $d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_2 - D_1|}{|\vec{n}|}$.



$$d(\pi_1, \pi_2) = d(P_1, \pi_2) = d(P_1, P_1') = |P_1 P_1'|$$

$P_1 \in \pi_1$
dowolny





Definicja 6.1.8. Odległością dwóch prostych skośnych nazywamy odległość dwóch płaszczyzn równoległych zawierających te proste.

Niech \vec{a} będzie wektorem kierunkowym prostej l , przechodzącej przez punkt P_1 , zaś \vec{b} wektorem kierunkowym prostej k , przechodzącej przez punkt P_2 . Załóżmy że proste te są skośne. Wówczas

$$d(k, l) = \frac{|(\overrightarrow{P_1 P_2}, \vec{a}, \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$


Obj
Ppodst



Symetrie

Definicja 6.1.9. Niech S będzie ustalonym punktem, l ustaloną prostą oraz π ustaloną płaszczyzną.

- i) Punkt P_s jest punktem symetrycznym do punktu P względem punktu S , jeżeli $\overrightarrow{PS} = \overrightarrow{SP_s}$.
- ii) Punkt P_s jest punktem symetrycznym do punktu P względem prostej l , jeżeli istnieje $A \in l$ taki, że $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{AP_s}$ oraz $\overrightarrow{PA} \perp l$.
- iii) Punkt P_s jest punktem symetrycznym do punktu P względem płaszczyzny π , jeżeli istnieje $A \in \pi$ taki, że $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{AP_s}$ oraz $\overrightarrow{PA} \perp \pi$.



TEMAT: *Przestrzenie liniowe*

7.1 Przestrzenie liniowe i ich podprzestrzenie

Niech $K = (K, +, \cdot)$ będzie ciałem, zaś $V \neq \emptyset$ zbiorem. Niech dane będzie działanie wewnętrzne $\oplus : V \times V \ni (u, v) \mapsto u \oplus v \in V$ oraz działanie zewnętrzne $\odot : K \times V \ni (\alpha, v) \mapsto \alpha \odot v \in V$.

Definicja 7.1.1. Zespół $V = (V, \oplus, K, \odot)$ taki, że

- i) (V, \oplus) jest grupą abelową, *dodawanie wektorów*
- ii) $\forall u, v \in V \quad \forall \alpha \in K \quad \alpha \odot (u \oplus v) = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$
dodawanie skalarów
- iii) $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha + \beta) \odot v = (\alpha \odot v) \oplus (\beta \odot v)$
- iv) $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha \cdot \beta) \odot v = \alpha \odot (\beta \odot v)$
- v) $\forall v \in V \quad 1 \odot v = v$ *unitarność*

Geom. analit.
 $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R}, \cdot)$
 V K
Yozdzielność
mieszana tożsamość
 $\mathbb{1}$ -d. neutr. mnożenia w ciele K

nazywamy *przestrzenią wektorową* bądź *przestrzenią liniową* nad ciałem K (albo przestrzenią K -liniową). Elementy zbioru V nazywamy *wektorami*, zaś elementy ciała K *skalarami*.

Przykład 7.1.2. Poniższe struktury są przestrzeniami wektorowymi.

- i) $\mathbb{R}^n = (\mathbb{R}^n, \oplus, \mathbb{R}, \odot)$
 Dla $u = [u_1, \dots, u_n], v = [v_1, \dots, v_n] \in \mathbb{R}^n$ oraz $\alpha \in \mathbb{R}$ definiujemy
 $u \oplus v = [u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n], \alpha \odot u = [\alpha u_1, \dots, \alpha u_n]$.
- ii) (K^n, \oplus, K, \odot) , gdzie $K = (K, +, \cdot)$ to dowolne ciało
 Dla $u = [u_1, \dots, u_n], v = [v_1, \dots, v_n] \in K^n$ oraz $\alpha \in K$ definiujemy
 $u \oplus v = [u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n], \alpha \odot u = [\alpha \cdot u_1, \dots, \alpha \cdot u_n]$.
- iii) $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \mathbb{R}, \cdot)$, gdzie $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f \mid f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$
 Dla $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ oraz $\alpha \in \mathbb{R}$ definiujemy
 $f_3 = f_1 \oplus f_2$ takie, że $\forall x \in \mathbb{R} \quad f_3(x) = (f_1 \oplus f_2)(x) := f_1(x) + f_2(x)$
 oraz $f_4 = \alpha \odot f_1$ takie, że $\forall x \in \mathbb{R} \quad f_4(x) = (\alpha \odot f_1)(x) := \alpha \cdot f_1(x)$
 Elementem neutralnym działania \oplus jest funkcja stale równa zero.

podprzypadki
 $K^m = K \times \dots \times K$
 \mathbb{R}^m
 $A^B = \{f : B \rightarrow A\}$

- iv) $M_{m \times n}(\mathbb{R}) = (M_{m \times n}(\mathbb{R}), +, \mathbb{R}, \cdot)$, gdzie działania $+, \cdot$ to działania dodawania macierzy i mnożenia macierzy przez liczbę.

w ustalonym wymiarach



v) $\mathbb{R}[x] = (\mathbb{R}[x], +, \mathbb{R}, \cdot)$, gdzie $\mathbb{R}[x]$ to zbiór wszystkich wielomianów jednej zmiennej x o współczynnikach rzeczywistych z działaniami dodawania wielomianów i mnożenia wielomianu przez liczbę.

Uwaga 7.1.3. Często tym samym symbolem oznaczamy działania w ciele $K = (K, +, \cdot)$ i działania w przestrzeni wektorowej $V = (V, +, K, \cdot)$.

Wówczas dla $u, v \in V, \alpha, \beta \in K$

$u + v$	suma wektorów
$\alpha + \beta$	suma skalarów
$\alpha \cdot u$	iloczyn wektora przez skalar
$\alpha \cdot \beta$	iloczyn skalarów

Twierdzenie 7.1.4. Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ będzie przestrzenią wektorową. Niech $\mathbf{0}$ oznacza element neutralny dodawania w V , zaś $0, 1$ elementy neutralne działań w ciele K . Wówczas:

- i) $\forall v \in V \quad \forall \alpha \in K \quad 0 \cdot v = \alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- ii) $\forall v \in V \quad \forall \alpha \in K \quad \alpha \cdot v = \mathbf{0} \Leftrightarrow (\alpha = 0 \vee v = \mathbf{0})$
- iii) $\forall v \in V \quad \forall \alpha \in K \quad (-\alpha) \cdot v = \alpha \cdot (-v) = -(\alpha \cdot v)$
- iv) $\forall v \in V \quad \underline{-1 \cdot v = -v}$
- v) $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha - \beta) \cdot v = (\alpha \cdot v) - (\beta \cdot v)$
- vi) $\forall u, v \in V \quad \forall \alpha \in K \quad \alpha \cdot (u - v) = (\alpha \cdot u) - (\alpha \cdot v)$

wektor zerowy $\mathbf{0}$
 \wedge skalar (\mathbb{R}, \mathbb{C})
 $\mathbf{0}_K \quad \mathbf{0}_V$
 $-2 \cdot \vec{v}$
 $-2 [v_x, v_y, v_z]$
 $- [2v_x, 2v_y, 2v_z]$
 $2 [-v_x, -v_y, -v_z]$

Dowód. Niech $u, v \in V, \alpha, \beta \in K$ będą dowolne.

- i) Ponieważ $\mathbf{0} + 0 \cdot v = 0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = (0 \cdot v) + (0 \cdot v)$, zatem $\mathbf{0} = 0 \cdot v$. Ponadto $\mathbf{0} + \alpha \cdot \mathbf{0} = \alpha \cdot \mathbf{0} = \alpha \cdot (\mathbf{0} + \mathbf{0}) = (\alpha \cdot \mathbf{0}) + (\alpha \cdot \mathbf{0})$, zatem $\mathbf{0} = \alpha \cdot \mathbf{0}$.
- ii) Implikacja z prawa na lewo jest oczywista. Załóżmy, że $\alpha \cdot v = \mathbf{0}$ oraz $\alpha \neq 0$. Ponieważ $\alpha \neq 0$, zatem istnieje $\alpha^{-1} \neq 0$. Mamy $v = 1 \cdot v = (\alpha^{-1} \cdot \alpha) \cdot v = \alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot v) = \alpha^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$. Zatem $v = \mathbf{0}$.
- iii) Na mocy i) mamy $(-\alpha) \cdot v + \alpha \cdot v = (-\alpha + \alpha) \cdot v = 0 \cdot v = \mathbf{0}$. Stąd $(-\alpha) \cdot v = -(\alpha \cdot v)$.
- iv) Na mocy iii) mamy $\underline{-1 \cdot v = 1 \cdot (-v) = -(1 \cdot v) = -v}$.
- v) Na mocy iii) mamy $(\alpha - \beta) \cdot v = (\alpha + (-\beta)) \cdot v = (\alpha \cdot v) - (\beta \cdot v)$.
- vi) Na mocy iii) mamy $\alpha \cdot (u - v) = \alpha \cdot (u + (-v)) = (\alpha \cdot u) - (\alpha \cdot v)$. \square

Niech $V = (V, \oplus, K, \odot)$ będzie przestrzenią wektorową nad ciałem $K = (K, +, \cdot)$ i niech $U \subset V$ będzie niepustym podzbiorem zbioru V .

Definicja 7.1.5. Jeśli zbiór U wraz z działaniami

$\oplus|_{U \times U} : U \times U \ni (u, v) \mapsto u \oplus v \in U, \odot|_{K \times U} : K \times U \ni (\alpha, v) \mapsto \alpha \odot v \in U$ jest przestrzenią liniową nad ciałem K , to $U = (U, \oplus|_{U \times U}, K, \odot|_{K \times U})$ nazywamy *podprzestrzenią wektorową* lub *podprzestrzenią liniową* przestrzeni V .

restrykcja (zawężenie dziediny)

$\mathbb{R} + (-\mathbb{R}) = \mathbb{Q}$
 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
 niewym.
 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$
 U
 $\mathbb{R}[x]$ wielomiany

$f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$
 $g := f|_{[0, 1]}$

Twierdzenie 7.1.6. Jeśli $V = (V, \oplus, K, \odot)$ jest przestrzenią wektorową oraz $\emptyset \neq U \subset V$, to wówczas U jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni V wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall u_1, u_2 \in U \quad \forall \alpha \in K \quad u_1 \oplus u_2 \in U \wedge \alpha \odot u_1 \in U$$

lub równoważnie

$$\forall u_1, u_2 \in U \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha \odot u_1) \oplus (\beta \odot u_2) \in U.$$

wewnętrzności działań
kombinacja liniowa

Dowód. Implikacja z prawa na lewo jest oczywista. Implikacja w drugą stronę wynika z faktu, że U jest podgrupą grupy V . \square

Uwaga 7.1.7. Niech $V = (V, \oplus, K, \odot)$ będzie przestrzenią liniową. Wówczas $U = \{0\}$ jest podprzestrzenią liniową. Nazywamy ją *podprzestrzenią trywialną*. Podobnie $U = V$ jest podprzestrzenią liniową V . Podprzestrzenie te nazywamy *podprzestrzeniami niewłaściwymi*.

$V \subseteq V$
 $\{0\} \subseteq V$

Uwaga 7.1.8. Każda podprzestrzeń liniowa zawiera wektor zerowy.

Dowód. Jeśli U jest podprzestrzenią liniową, to $\forall u_1, u_2 \in U \quad \forall \alpha \in K \quad u_1 \oplus u_2 \in U \wedge \alpha \odot u_1 \in U$. W szczególności $-1 \odot u_1 = -u_1 \in U$ oraz $u_1 \oplus (-u_1) = 0 \in U$. \square

$0 \in U$

Wniosek 7.1.9. Niech $V = (V, \oplus, K, \odot)$ będzie przestrzenią liniową, zaś $U \subset V$ podzbiorem V . Jeśli $0 \notin U$, to U nie jest podprzestrzenią liniową przestrzeni V .

Przykład 7.1.10.

ciągła na $[0, 1]$

i) $V = (\mathbb{R}^{[0,1]}, +, \mathbb{R}, \cdot)$, $U = (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), +, \mathbb{R}, \cdot)$

$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

U jest podprzestrzenią liniową V , bowiem suma funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą oraz iloczyn funkcji ciągłej przez liczbę jest funkcją ciągłą.

ii) $V = (\mathbb{R}[x], +, \mathbb{R}, \cdot)$, $U = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f - \text{parzysty}\}$

degree (stopień)

U nie jest podprzestrzenią liniową V . Niech $f(x) = x^4 + x^3$ oraz $g(x) = -x^4$. Wówczas $(f + g)(x) = x^3$. Zatem $f, g \in U$, ale $f + g \notin U$.

iii) $V = (\mathbb{R}^4, +, \mathbb{R}, \cdot)$, $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 2x + z - 3t = 0 \wedge y = 0\}$

$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

U jest podprzestrzenią liniową V . Skoro $z = 3t - 2x$ oraz $y = 0$, zatem dowolny element $u \in U$ jest postaci $u = (x, 0, 3t - 2x, t)$. Weźmy $u_1 = (x_1, 0, 3t_1 - 2x_1, t_1) \in U$, $u_2 = (x_2, 0, 3t_2 - 2x_2, t_2) \in U$ oraz $\alpha \in \mathbb{R}$, wówczas

$$u_1 + u_2 = (x_1 + x_2, 0, 3(t_1 + t_2) - 2(x_1 + x_2), t_1 + t_2) \in U \quad \text{OK}$$

$$\text{oraz } \alpha u_1 = (\alpha x_1, 0, \alpha(3t_1 - 2x_1), \alpha t_1) = (\alpha x_1, 0, 3\alpha t_1 - 2\alpha x_1, \alpha t_1) \in U$$

dwa dowolne z U



Ozn. iv) $V = (\mathbb{R}[x], +, \mathbb{R}, \cdot)$, $U = \mathbb{R}_n[x] := \{p \in \mathbb{R}[x] : \deg p \leq n\}$.

Przyjmujemy, że $\deg 0 = -\infty$. Wówczas U jest podprzestrzenią liniową V .

Podprzestrzenie wektorowe \mathbb{R}^2 i \mathbb{R}^3

Jedynymi nietrywialnymi podprzestrzeniami liniowymi \mathbb{R}^2 są proste przechodzące przez $(0, 0)$.

Jedynymi nietrywialnymi podprzestrzeniami liniowymi \mathbb{R}^3 są płaszczyzny i proste przechodzące przez $(0, 0, 0)$.



UWAGA

7.1.8

7.2 Liniowa niezależność wektorów, baza i wymiar przestrzeni liniowej


Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową nad ciałem K . Niech $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$, $v_1, \dots, v_m \in V$. Niech $W \neq \emptyset$ będzie podzbiorem zbioru V .

Definicja 7.2.1. i) Wektor $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m \in V$ nazywamy kombinacją liniową wektorów $v_1, \dots, v_m \in V$ o współczynnikach $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$.

ii) Jeśli $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = \mathbf{0}$, mówimy, że jest to kombinacja zerowa.

iii) Kombinację liniową $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$ nazywamy kombinacją trywialną wtedy i tylko wtedy gdy $\alpha_1 = 0, \dots, \alpha_m = 0$.

iv) Zbiór $\{v = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_k w_k : \alpha_1, \dots, \alpha_k \in K; w_1, \dots, w_k \in W; k \in \mathbb{N}\}$, będący zbiorem wszystkich kombinacji liniowych wszystkich skończonych układów wektorów w zbiorze W , nazywamy powłoką liniową zbioru W i oznaczamy symbolem $\text{lin}_K W$ lub krótko $\text{lin} W$.



$\emptyset \neq W \subset V$

Gdy W jest zbiorem skończonym $W = \{w_1, \dots, w_m\}$ piszemy też $\text{lin}\{w_1, \dots, w_m\}$. Czyli $\text{lin}\{w_1, \dots, w_m\} = \{\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_m w_m : \alpha_1, \dots, \alpha_m \in K\}$.

Twierdzenie 7.2.2. Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ oraz $\emptyset \neq W \subset V$. Wówczas zbiór $\text{lin} W$ jest podprzestrzenią liniową przestrzeni V . Jest to najmniejsza (w sensie relacji inkluzji) podprzestrzeń V zawierająca zbiór W .

Dowód. Suma kombinacji liniowych elementów W jest kombinacją liniową elementów W . Podobnie iloczyn kombinacji liniowej elementów W przez skalar jest kombinacją liniową elementów W . \square

Wniosek 7.2.3. Jeśli $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m$, dla pewnych $v_1, \dots, v_m \in V$, $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in K$ oraz $\lambda_1 \neq 0$, to wówczas $\text{lin}\{v_1, v_2, \dots, v_m\} = \text{lin}\{u, v_2, \dots, v_m\}$

Dowód. Inkluzja $\text{lin}\{v_1, v_2, \dots, v_m\} \supseteq \text{lin}\{u, v_2, \dots, v_m\}$ wynika z faktu, że u jest kombinacją liniową v_1, \dots, v_m . Jeśli $\lambda_1 \neq 0$, to wówczas $v_1 = -\frac{1}{\lambda_1}u - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}v_2 - \dots - \frac{\lambda_m}{\lambda_1}v_m$, zatem $\text{lin}\{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq \text{lin}\{u, v_2, \dots, v_m\}$. \square

Definicja 7.2.4. Elementy zbioru W nazywamy *generatorami* przestrzeni $\text{lin} W$, zaś podprzestrzeń $\text{lin} W$ nazywamy podprzestrzenią *generowaną* przez zbiór W .

Przykład 7.2.5. Wersory $\hat{i} = (1, 0)$ oraz $\hat{j} = (0, 1)$ generują przestrzeń \mathbb{R}^2 , bowiem dla dowolnego $\vec{u} = (u_x, u_y) \in \mathbb{R}^2$ mamy $\vec{u} = u_x(1, 0) + u_y(0, 1) = u_x \hat{i} + u_y \hat{j}$.

Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową nad ciałem K .

STOP
Np. \mathbb{R}^2
 \hat{i} \hat{j}

$(4, 5) = 4 \cdot \hat{i} + 5 \hat{j}$

$(4, 5)$
 $4(1, 0) + 5(0, 1) = (4, 5)$
 $u = \hat{i} + \hat{j} = (1, 1)$

Nazwie!
 v_1, v_2
 $\alpha v_1 + \beta v_2$
 $v_1, \alpha v_1 + \beta v_2$
 $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_1 + \delta v_2$

Definicja 7.2.6. Wektory $v_1, \dots, v_m \in V$ nazywamy *liniowo niezależnymi* lub mówimy, że tworzą *układ liniowo niezależny*, gdy każda kombinacja zerowa jest trywialna, to znaczy jeśli dla dowolnych skalarów $\beta_1, \dots, \beta_m \in K$ zachodzi

$$\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m = \mathbf{0} \Rightarrow \beta_1 = \dots = \beta_m = 0.$$

Wektory, które nie są liniowo niezależne, nazywamy *liniowo zależnymi*.

możesz jeden $\beta_i \neq 0$

Twierdzenie 7.2.7. Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową oraz niech $m \in \mathbb{N}, m \geq 2$. Wektory $v_1, \dots, v_m \in V$ są liniowo zależne wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z nich jest kombinacją liniową pozostałych.

WKKW

Dowód. Załóżmy, że wektory v_1, \dots, v_m są liniowo zależne, czyli istnieją $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$ nie wszystkie równe zeru, takie że $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = \mathbf{0}$. Bez straty dla ogólności możemy założyć, że $\alpha_1 \neq 0$. Wówczas $v_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2 - \dots - \frac{\alpha_m}{\alpha_1} v_m$. Załóżmy teraz, że v_1 jest kombinacją liniową v_2, \dots, v_m , czyli istnieją $\beta_2, \dots, \beta_m \in K$ takie, że $v_1 = \beta_2 v_2 + \dots + \beta_m v_m$. Wówczas $\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_m v_m = \mathbf{0}$, gdzie $\beta_1 = -1 \neq 0$.

□

$\alpha_n \in K$
 $\alpha_n \neq 0$
 $\exists \alpha_n^{-1}$

Twierdzenie 7.2.8. Wektory $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ generują \mathbb{R}^n wtedy i tylko wtedy, gdy rząd macierzy A , której kolejne wiersze to współrzędne wektorów v_1, \dots, v_k , jest równy n .

linia w. i. k. y
||
 \mathbb{R}^3

Dowód. Wektory $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ generują \mathbb{R}^n , gdy dla dowolnego $x \in \mathbb{R}^n$ układ $x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$, w którym niewiadomymi są $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$, ma jedyne rozwiązanie. □

Wniosek 7.2.9. Jeśli wektory $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ generują \mathbb{R}^n , to $k \geq n$.

linia w. i. k. y
||
 \mathbb{R}^3

Przykład 7.2.10. Czy wektory $u = (1, 1, -1)$, $v = (2, 1, 0)$, $w = (5, 2, 2)$ generują przestrzeń \mathbb{R}^3 ?

$\mathbb{R}^3 = \text{lin}\{u, v, w\}$

Sprawdzamy, czy dla dowolnego $b = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ istnieją $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ takie, że $b = \alpha u + \beta v + \gamma w$.

czyż -11-?

$$(x, y, z) = \alpha(1, 1, -1) + \beta(2, 1, 0) + \gamma(5, 2, 2) = (\alpha + 2\beta + 5\gamma, \alpha + \beta + 2\gamma, -\alpha + 2\gamma)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

macierz w postaci

nierozwiązalny
 $\alpha = ?$
 $\beta = ?$
 $\gamma = ?$

Wektory generują \mathbb{R}^3 , jeśli powyższy układ jest oznaczony.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & | & x \\ 1 & 1 & 2 & | & y \\ -1 & 0 & 2 & | & z \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{w_3 - w_1 \\ w_3 + w_1}]{w_2 - w_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & | & x \\ 0 & -1 & -3 & | & y - x \\ 0 & 2 & 7 & | & z + x \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{(-1) \cdot w_2}]{w_3 + 2w_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & | & x \\ 0 & 1 & 3 & | & x - y \\ 0 & 0 & 1 & | & -x + 2y + z \end{bmatrix}$$

Układ oznaczony, posiada rozwiązanie $\gamma = -x + 2y + z$, $\beta = x - y - 3\gamma = 4x - 7y - 3z$, $\alpha = x - 2\beta - 5\gamma = -2x + 4y + z$. Zatem układ wektorów u, v, w generuje \mathbb{R}^3 .

Przykład 7.2.11. Czy układ $\{A, B, C\}$ jest układem liniowo niezależnym?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

Sprawdzamy, czy dowolna kombinacja zerowa jest trywialna.

Niech $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ będą dowolne takie, że $\alpha A + \beta B + \gamma C = \mathbf{0}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Stąd $\begin{bmatrix} \alpha - \beta & -\alpha \\ 0 & \alpha + \beta + \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = \alpha = 0 \\ \gamma = -\alpha - \beta = 0 \end{cases}$

Zatem macierze A, B, C tworzą układ liniowo niezależny. **TAK**

Przykład 7.2.12. Czy wektory $u = (1, 2, 3, 4), v = (1, 2, 0, -1), w = (0, 1, 3, 1) \in \mathbb{R}^4$ są liniowo niezależne?

Niech $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ będą dowolne takie, że $\alpha u + \beta v + \gamma w = \mathbf{0} = (0, 0, 0, 0)$.

Stąd $(\alpha + \beta, 2\alpha + 2\beta + \gamma, 3\alpha + 3\gamma, 4\alpha - \beta + \gamma) = (0, 0, 0, 0)$.

Wektory u, v, w będą liniowo niezależne, gdy powyższy układ jednorodny ma jedyne rozwiązanie $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

układ jednorodny

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} w_3 - 3w_1 \\ w_4 - 4w_1 \end{smallmatrix}]{w_2 - 2w_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} -\frac{1}{3}w_3 \\ -\frac{1}{5}w_4 \end{smallmatrix}]{} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$0 + 0 + 0 - 0 - 1 = 0$
 $= -1 \neq 0$
 Złoty (beta, gamma) juw.

$\Rightarrow r(U) = r(A) = n = 3$

Na mocy twierdzenia Kroneckera-Capellego układ jest oznaczony. Zatem wektory u, v, w są liniowo niezależne.

Obserwacja: Badanie liniowej niezależności wektorów w \mathbb{R}^n polega na wyliczeniu rzędu macierzy, której kolumnami są podane wektory. Wektory są liniowo niezależne, gdy rząd macierzy równy jest liczbie wektorów.


Wniosek 7.2.13. Niech $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$. Jeśli $k > n$, to wektory v_1, \dots, v_k są liniowo zależne. Równoważnie, jeśli wektory v_1, \dots, v_k są liniowo niezależne, to $k \leq n$.

$n = 3$
 \mathbb{R}^3

układ lin. niezależ.

$v \neq 0 \rightarrow \lambda \cdot v = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \mid \mathbb{R}^3$

dzi

d'oby lin. zależny bo $\lambda \cdot v = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \neq \lambda = 0$
 $\lambda \cdot v = 0 \Rightarrow \lambda = 0$


Twierdzenie 7.2.14. Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową.

- i) Układ $\{v\}$, $v \in V$ jest liniowo zależny wtedy i tylko wtedy, gdy $v = \mathbf{0}$.
- ii) Układ wektorów zawierający podukład liniowo zależny jest liniowo zależny.
- iii) Jeśli układ wektorów jest liniowo niezależny, to każdy jego podukład jest liniowo niezależny.
- iv) Układ wektorów zawierający wektor zerowy jest liniowo zależny.

Dowód. i) Jeśli $v = \mathbf{0}$, to $1 \cdot v = \mathbf{0}$, a zatem układ $\{v\}$ jest liniowo zależny. Jeśli $\lambda v = \mathbf{0}$, $\lambda \in K \setminus \{0\}$, to wówczas $v = \mathbf{0}$ na mocy twierdzenia 7.1.4, ii).

ii) Załóżmy, że układ wektorów $\{u_1, \dots, u_m\}$ jest liniowo zależny. Zatem istnieją $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in K$, nie wszystkie równe zeru takie, że $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_m u_m = \mathbf{0}$. Bez straty dla ogólności możemy założyć, że $\lambda_1 \neq 0$. Dołączamy do układu dowolny inny wektor $v \in V$. Rozpatrzmy kombinację zerową $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_m u_m + \alpha v = \mathbf{0}$, gdzie $\alpha \in K$ jest dowolne. Jeśli $v = \mathbf{0}$, to $\alpha v = \mathbf{0}$ dla dowolnego α , zaś jeśli $v \neq \mathbf{0}$, to $\alpha = 0$. W każdym przypadku kombinacja jest nietrywialna, bowiem $\lambda_1 \neq 0$.


iii) Teza wynika z podpunktu ii) na mocy prawa kontrapozycji.

iv) Niech $u_1, \dots, u_m \in V$. Załóżmy, że $u_k = \mathbf{0}$ dla pewnego $k \in \{1, \dots, m\}$. Układ wektorów jest liniowo zależny, bowiem istnieje nietrywialna kombinacja zerowa postaci $0 \cdot u_1 + \dots + 0 \cdot u_{k-1} + 1 \cdot u_k + 0 \cdot u_{k+1} + \dots + 0 \cdot u_m = \mathbf{0}$. \square

Definicja 7.2.15. Niech $f_1, \dots, f_n \in C^{n-1}(\mathbb{R})$, $n \geq 2$. Macierz $W(x)$ postaci

$$W_{f_1, \dots, f_n}(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix}$$

Analiza II semestr
 układy równań różn.



nazywamy *macierzą Wrońskiego* układu funkcji f_1, \dots, f_n , a jej wyznacznik *wrońskianem*.

Twierdzenie 7.2.16. Niech $f_1, \dots, f_n \in C^{n-1}(\mathbb{R})$, $n \geq 2$. Jeśli wrońskian układu funkcji f_1, \dots, f_n nie zeruje się tożsamościowo na \mathbb{R} , tzn. $\exists x_0 \in \mathbb{R} : \det W_{f_1, \dots, f_n}(x_0) \neq 0$, to funkcje f_1, \dots, f_n są liniowo niezależne w przestrzeni $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Dowód. Przeprowadzimy dowód nie wprost. Załóżmy, że f_1, \dots, f_n są liniowo zależne. Wówczas istnieją $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ takie, że dla dowolnego $x \in \mathbb{R}$ mamy $\lambda_1 f_1(x) + \dots + \lambda_n f_n(x) = 0$. Różniczkując równanie stronami $n - 1$ razy otrzymujemy układ równań

$$\begin{bmatrix} f_1(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ f_1^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ponieważ f_1, \dots, f_n są liniowo zależne, zatem wyznacznik główny układu jest równy zero. \square

Przykład 7.2.17. Zbadaj, czy funkcje $f_1(x) = 1, f_2(x) = \sin x, f_3(x) = \cos x$ tworzą układ liniowo niezależny w $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

$\alpha \cdot 1 + \beta \cdot \sin x + \gamma \cdot \cos x = 0 \Rightarrow \alpha = 0, \beta = 0, \gamma = 0$

$$\det W(x) = \begin{vmatrix} 1 & \sin x & \cos x \\ 0 & \cos x & -\sin x \\ 0 & -\sin x & -\cos x \end{vmatrix} = -\cos^2 x - \sin^2 x = -1 \neq 0$$

Tak, tworzą układ liniowo niezależny.

Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową nad ciałem K . Niech $b_1, \dots, b_n \in V$.

Definicja 7.2.18. Układ wektorów $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ nazywamy bazą przestrzeni V jeśli jest on liniowo niezależny oraz $V = \text{lin}\{b_1, \dots, b_n\}$.

Uwaga 7.2.19. Baza przestrzeni wektorowej jest maksymalnym (w sensie relacji inkluzji) układem liniowo niezależnym w tej przestrzeni.

Dowód. Jeśli $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ jest bazą przestrzeni V , to wówczas dla dowolnego $v \in V$ istnieją $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ takie, że $v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$. Zatem układ $\{v, b_1, \dots, b_n\}$ jest liniowo zależny.

Jeśli $\{b_1, \dots, b_n\}$ to maksymalny układ liniowo niezależny, to dla dowolnego $u \in V$ układ $\{u, b_1, \dots, b_n\}$ jest liniowo zależny. Zatem istnieje nietrywialna kombinacja zerowa $\lambda_0 u + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n = 0$, gdzie $\lambda_0 \neq 0$ (bo inaczej byłoby $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n = 0$). Stąd $u = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} b_1 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_0} b_n = 0$, czyli dowolny wektor $u \in V$ jest kombinacją liniową wektorów b_1, \dots, b_n . Zatem $V = \text{lin}\{b_1, \dots, b_n\}$. \square

→ \mathbb{R}^3
4 wektory w \mathbb{R}^3
↓
muszą być liniowo zależne

$(a, b, c, d) = a \cdot e_1 + b \cdot e_2 + c \cdot e_3 + d \cdot e_4$
generowanie $\det I_4 = 1 \neq 0$ \mathbb{R}^4

Przykład 7.2.20. Baza przestrzeni \mathbb{R}^n

Układ wektorów $\{e_1, \dots, e_n\}$ stanowi bazę przestrzeni \mathbb{R}^n .

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_n$ \downarrow (\hat{i}, \hat{j}) \mathbb{R}^3
lin. niezależne $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$

$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$

Wniosek 7.2.21. Jeśli wektory $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ tworzą bazę przestrzeni \mathbb{R}^n , to wówczas $k = n$.

Dowód. Tezę otrzymujemy na mocy wniosków 7.2.9 oraz 7.2.13. \square

Przykład 7.2.22. Wskaż bazę podprzestrzeni U przestrzeni \mathbb{R}^4 , jeśli $U = \text{lin}\{(1, 3, 2, 1), (1, 2, 1, 1), (1, 1, 0, 1), (1, 2, 2, 1), (3, 4, 1, 3)\}$.

generatory

$U \subset \mathbb{R}^4$
5 wektorów generują \mathbb{R}^4

Podane generatory na pewno nie tworzą bazy U , gdyż układ 5 wektorów w przestrzeni \mathbb{R}^4 jest liniowo zależny.


574 na pewno lin. zależne

$$r \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \leq 4 \neq 5$$

4x5

$\dim U = 2$

$U = \mathbb{R} \cdot (1, 1, 1, 1) + \mathbb{R} \cdot (1, 2, 2, 1)$



$U \subset \mathbb{R}^3$
 $U = \text{lin}\{(x, y, 0), (x, y, 0)\}$
 $U = \text{lin}\{i, j\}$

n-wymiarowa

sp. elem. nie zmieniają wad

$$r \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 3 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & 0 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$3 \Rightarrow U = \text{lin}\{(1, 3, 2, 1), (0, -1, -1, 0), (0, -1, 0, 0)\}$
 Układ wektorów $(1, 3, 2, 1), (0, -1, -1, 0), (0, -1, 0, 0)$ jest bazą przestrzeni U (porównaj wniosek 7.2.3).

te trzy są liniowo niezależne
 $N_3 - \text{lin}\{u, v\}$
 $\text{lin}\{u+tv, v\}$
itp.
 $= 3$

Twierdzenie 7.2.23.

- i) Każda przestrzeń wektorowa różna od $\{0\}$ posiada bazę.
- ii) Wszystkie bazy danej przestrzeni wektorowej skończonej wymiarowej są równoliczne. Jeśli baza danej przestrzeni liniowej jest nieskończona, to każda inna jej baza także jest nieskończona.
- iii) Każdy układ wektorów liniowo niezależnych przestrzeni wektorowej może być uzupełniony do jej bazy.

ważne!

Bez dowodu. Dowód można znaleźć w [4].

\mathbb{R}^3
 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $n=2$
 $n=3$

Definicja 7.2.24. Liczbę elementów bazy przestrzeni wektorowej $V = (V, +, K, \cdot)$ nazywamy *wymiarem przestrzeni wektorowej V* i oznaczamy $\dim_K V$ lub krótko $\dim V$. Mówimy wówczas, że przestrzeń V jest *n -wymiarowa*. Jeśli żaden skończony układ wektorów nie tworzy bazy przestrzeni V , to przyjmujemy $\dim V = \infty$. Ponadto przyjmujemy $\dim\{0\} = 0$.

Wniosek 7.2.25.

- i) W przestrzeni liniowej n -wymiarowej każdy układ m wektorów, gdzie $m > n$ jest liniowo zależny.
- ii) W przestrzeni liniowej n -wymiarowej każdy układ n wektorów liniowo niezależnych stanowi bazę tej przestrzeni.
- iii) W przestrzeni liniowej n -wymiarowej każde n wektorów generujących tę przestrzeń stanowi jej bazę.

Chrońcie!

Dowód. i) Teza wynika z uwagi 7.2.19.

ii) Wykażemy, że taki układ wektorów generuje przestrzeń. Niech V będzie rozważaną przestrzenią, zaś $v_1, \dots, v_n \in V$ układem liniowo niezależnym. Na mocy i) dla dowolnego wektora $u \in V$ układ $\{u, v_1, \dots, v_n\}$ jest liniowo zależny. Na mocy twierdzenia 7.2.25 otrzymujemy, że u jest kombinacją liniową wektorów v_1, \dots, v_n .

iii) Wykażemy, że taki układ wektorów jest liniowo niezależny. Spośród generatorów można wybrać bazę. Ponieważ wszystkie bazy są n -elementowe, zatem cały układ generatorów stanowi bazę V . \square

Jeśli znamy wymiar
 \downarrow
wystarczy sprawdzić jeden z warunków w definicji bazy

Przykład 7.2.10 - raz jeszcze

Wiemy, że wektory $u = (1, 1, -1), v = (2, 1, 0), w = (5, 2, 2)$ generują przestrzeń \mathbb{R}^3 . Ponadto $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, zatem układ $\{u, v, w\}$ jest bazą \mathbb{R}^3 .

$r[L] = m \iff \det[L] \neq 0$

Wniosek 7.2.26. Wektory $v_1 = (v_{11}, v_{12}, \dots, v_{1n}), v_2 = (v_{21}, v_{22}, \dots, v_{2n}), \dots, v_n = (v_{n1}, v_{n2}, \dots, v_{nn})$ tworzą bazę przestrzeni \mathbb{R}^n , wtedy i tylko wtedy gdy $\det[v_{ij}] \neq 0$.

Dowód. Tezę otrzymujemy na mocy twierdzeń 7.2.8 oraz 7.2.25 iii). \square

Wniosek 7.2.27. i) Na płaszczyźnie \mathbb{R}^2 dwa dowolne wektory niewspółliniowe tworzą jej bazę.

ii) W przestrzeni \mathbb{R}^3 trzy dowolne wektory niewspółpłaszczyznowe tworzą jej bazę.

Niech V będzie przestrzenią liniową, zaś $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ jej bazą.

Definicja 7.2.28. Uporządkowany ciąg wektorów bazowych (b_1, \dots, b_n) nazywamy *reperem bazowym* lub *bazą uporządkowaną*.

Często mówimy po prostu o *bazie*, zaznaczając w zapisie uporządkowanie wektorów bazowych, np. poprzez ich ponumerowanie.

Bazy standardowe (kanoniczne) wybranych przestrzeni liniowych

1) $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R}, \cdot)$

$\mathbb{R}^3 \quad (e_1, e_2, e_3)$

$\mathcal{B}_k^n = (e_1, \dots, e_n)$, gdzie $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$

2) $(\mathbb{R}[x], +, \mathbb{R}, \cdot)$

$\mathbb{R}_2[x] \quad ax^2 + bx + c \quad c + bx + ax^2$

$\mathcal{B}_k^n = (1, x, x^2, x^3, \dots)$, $\dim \mathbb{R}[x] = \infty$, $p(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_s \cdot x^s$

3) $(\mathbb{R}_n[x], +, \mathbb{R}, \cdot)$, $\mathbb{R}_n[x] = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq n\}$

$\mathcal{B}_k^n = (1, x, x^2, \dots, x^n)$, $\dim \mathbb{R}[x] = n + 1$
dla dowolnego $p \in \mathbb{R}_n[x]$ mamy $p(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n$.

4) $(M_{m \times n}(\mathbb{R}), +, \mathbb{R}, \cdot)$

$\mathcal{B}_k^n = (E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{mn})$, gdzie $E_{kl} = [e_{ij}^{kl}]$, zaś $e_{ij}^{kl} = \begin{cases} 1 & (i, j) = (k, l) \\ 0 & (i, j) \neq (k, l) \end{cases}$

$\dim M_{m \times n}(K) = m \cdot n$


Przykład 7.2.29. Bazą $M_2(\mathbb{R})$ jest układ $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, gdzie

Baza $E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\det I_4 = 1 \neq 0$
 I_n
 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_4$

Dla dowolnej macierzy $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ mamy $A = aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22}$.

$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$



Twierdzenie 7.2.30. Niech V będzie przestrzenią liniową, zaś W jej podprzestrzenią. Wówczas

- i) $W \neq V \Rightarrow \dim W < \dim V$,
- ii) $\dim W = \dim V < \infty \Rightarrow W = V$.

$$W \subset V$$

Dowód. i) Niech $\{b_1, \dots, b_m\}$ będzie bazą W oraz niech $v \in V \setminus W$. Ponieważ v nie jest kombinacją liniową b_1, \dots, b_m , zatem układ $\{v, b_1, \dots, b_m\}$ jest liniowo niezależny. Układ ten można uzupełnić do bazy przestrzeni V , która będzie miała co najmniej $m + 1$ elementów.

ii) Teza wynika z i) na mocy prawa kontrapozycji. \square

Niech V będzie przestrzenią liniową, zaś $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ jej bazą uporządkowaną!. Wówczas dla każdego $v \in V$ istnieją skalary $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ takie, że $v = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$. Można uzasadnić, że przy ustalonym reperze bazowym skalary $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ są wyznaczone jednoznacznie.

komb. liniowa elementów bazy

Definicja 7.2.31. Skalary $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ takie, że $v = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$ nazywamy współrzednymi wektora v w bazie \mathcal{B} . Piszemy wówczas $v = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]_{\mathcal{B}}$.

wiąg skalarów

Przykład 7.2.32. $\mathbb{R}^3 = (\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R}, \cdot)$, $\mathcal{B} = (\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ baza kanoniczna, $\mathcal{B}' = (b'_1, b'_2, b'_3)$ inna baza, gdzie $b'_1 = (4, 2, 1)$, $b'_2 = (-5, 2, 3)$, $b'_3 = (1, 3, 0)$

$\mathcal{B}_k^3 = (\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$
 $b'_1 = 4\hat{i} + 2\hat{j} + 1\hat{k}$

Skalary 4, 2, 1 to współrzedne b'_1 w bazie kanonicznej.

UMOWA: Piszemy $b'_1 = (4, 2, 1)$ zamiast $b'_1 = [4, 2, 1]_{\mathcal{B}_k^3}$.

Ponadto $b'_1 = [1, 0, 0]_{\mathcal{B}'}$.

$\mathbb{R}^2 \quad \mathcal{B} = (\hat{i}, \hat{j})$
 $\vec{v} = (4, 5) = 4\hat{i} + 5\hat{j}$
 $\mathcal{C} = (\hat{j}, \hat{i})$
 $\vec{v} = [6, 4]_{\mathcal{C}}$

Niech $v = (-3, 15, 7) \in \mathbb{R}^3$. Wyznamy współrzedne wektora v w bazie \mathcal{B}' .

Niech $v = [\alpha, \beta, \gamma]_{\mathcal{B}'}$, tzn. $v = \alpha b'_1 + \beta b'_2 + \gamma b'_3$. Otrzymujemy

$\alpha = ?$, $\beta = ?$, $\gamma = ?$

$$(-3, 15, 7) = \alpha(4, 2, 1) + \beta(-5, 2, 3) + \gamma(1, 3, 0) = (4\alpha - 5\beta + \gamma, 2\alpha + 2\beta + 3\gamma, \alpha + 3\beta).$$

Aby wyznaczyć współrzedne α, β, γ , należy rozwiązać układ równań

$$\begin{bmatrix} 4 & -5 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 4 & -5 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & 3 & 15 \\ 1 & 3 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_3 \leftrightarrow w_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 2 & 2 & 3 & 15 \\ 4 & -5 & 1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{w_2 - 2w_1 \\ w_3 - 4w_1}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & -17 & 1 & -31 \end{bmatrix} \xrightarrow{-4 \cdot w_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 16 & -12 & -4 \\ 0 & -17 & 1 & -31 \end{bmatrix} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 16 & -12 & -4 \\ 0 & -1 & -11 & -35 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-1 \cdot w_2 \\ w_3 \leftrightarrow w_2}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 11 & 35 \\ 0 & 16 & -12 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_3 - 16w_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 11 & 35 \\ 0 & 0 & -188 & -564 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{188} \cdot w_3} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 11 & 35 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2 - 11w_3} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_1 - 3w_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow v = [1, 2, 3]_{\mathcal{B}'}. \end{aligned}$$

$= 1 \cdot b'_1 + 2 \cdot b'_2 + 3 \cdot b'_3$

Niech V będzie przestrzenią liniową, zaś $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ oraz $\mathcal{B}' = (b'_1, \dots, b'_n)$ jej dwiema "stara" baza "nowa" baza

$\beta'_i \in V$

bazami. Wówczas istnieją skalary $\alpha_{ij} \in K, i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ takie, że

$$\begin{aligned} b'_1 &= \alpha_{11}b_1 + \alpha_{21}b_2 + \dots + \alpha_{n1}b_n \\ b'_2 &= \alpha_{12}b_1 + \alpha_{22}b_2 + \dots + \alpha_{n2}b_n \\ &\dots \\ b'_n &= \alpha_{1n}b_1 + \alpha_{2n}b_2 + \dots + \alpha_{nn}b_n \end{aligned}$$

Definicja 7.2.33. Macierz $P \in M_n(K)$ postaci

$$P = [\alpha_{ij}] = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}$$

W kolumnach współrzędne wektorów z nowej bazy \mathcal{B}' w starej bazie \mathcal{B}

nazywamy macierzą przejścia od bazy \mathcal{B} do bazy \mathcal{B}' . Oznaczamy ją symbolem $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$.

Macierz przejścia $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ zawsze jest nieosobliwa. Wynika to z faktu, że wektory bazy \mathcal{B}' są liniowo niezależne.

$\det P \neq 0$

Zmiana współrzędnych wektora przy zmianie bazy

Niech V będzie przestrzenią liniową, zaś $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ oraz $\mathcal{B}' = (b'_1, \dots, b'_n)$ jej dwiema bazami. Niech $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$.

Twierdzenie 7.2.34. Niech $v \in V, v = [x_1, \dots, x_n]_{\mathcal{B}} = [x'_1, \dots, x'_n]_{\mathcal{B}'}$. Wówczas $X =$

PX' , gdzie $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, X' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$.

$\det P \neq 0 \Rightarrow \exists P^{-1}$
 $X = PX' \Rightarrow P^{-1} \cdot X = X'$

Dowód. Przyjmijmy, że zapis $[w_1 w_2 \dots w_n]$ oznacza macierz, która w kolumnach ma współrzędne wektorów w_1, w_2, \dots, w_n . Wektory b_i, b'_i oznaczają tutaj i -te kolumny macierzy. Wówczas $[b'_1 b'_2 \dots b'_n] = [b_1 b_2 \dots b_n]P$. Macierz P jest nieosobliwa, zatem istnieje P^{-1} . Ponieważ $I = P \cdot P^{-1}$ i mnożenie macierzy jest łączne, zatem

~~$$\begin{aligned} v = x_1b_1 + \dots + x_nb_n &= [b_1 b_2 \dots b_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [b_1 b_2 \dots b_n](P \cdot P^{-1}) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \\ &= ([b_1 b_2 \dots b_n]P) \cdot \left(P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right) = [b'_1 b'_2 \dots b'_n] \cdot \left(P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right). \end{aligned}$$~~

Ponadto $x'_1 b'_1 + \dots + x'_n b'_n = [b'_1 \ b'_2 \ \dots \ b'_n] \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$. Ponieważ współrzędne wektora w bazie są wyznaczone jednoznacznie, zatem $\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$. \square

Przykład 7.2.32 - ciąg dalszy

$\mathbb{R}^3 = (\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R}, \cdot)$, $\mathcal{B} = \mathcal{B}_k^3$ - baza kanoniczna,

$\mathcal{B}' = (b'_1, b'_2, b'_3)$ inna baza, gdzie $b'_1 = (4, 2, 1)$, $b'_2 = (-5, 2, 3)$, $b'_3 = (1, 3, 0)$

Wyznamy współrzędne wektora $v = (-3, 15, 7)$ w bazie \mathcal{B}' .

$P = P_{\mathcal{B}_k^3 \rightarrow \mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, $X' = P^{-1}X = ?$.

Tutaj wypisać

$b'_1 \ b'_2 \ b'_3$

Wyznamy macierz $P^{-1} = \frac{1}{47} \begin{bmatrix} 9 & -3 & 17 \\ -3 & 1 & 10 \\ -4 & 17 & -18 \end{bmatrix}$ i obliczamy

$X' = \frac{1}{47} \begin{bmatrix} 9 & -3 & 17 \\ -3 & 1 & 10 \\ -4 & 17 & -18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

Widomiany stopnie ≤ 2

Przykład 7.2.35. Rozważmy przestrzeń $\mathbb{R}_2[x]$ oraz jej dwie bazy

$\mathcal{B} = (1+x, x+x^2, 1+x^2)$, $\mathcal{B}' = (1, 1+x, 1+x+x^2)$. Wyznamy macierz $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$.

\mathcal{B} -czyto baza?

*$\mathcal{B}_k = (1, x, x^2)$
 $b'_1 = 1$*

$1 = [\alpha_1, \beta_1, \gamma_1]_{\mathcal{B}} = \alpha_1(1+x) + \beta_1(x+x^2) + \gamma_1(1+x^2) = (\alpha_1 + \gamma_1) + (\alpha_1 + \beta_1)x + (\beta_1 + \gamma_1)x^2$
 Stąd $\begin{cases} \alpha_1 + \gamma_1 = 1 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \beta_1 + \gamma_1 = 0 \end{cases}$ i ostatecznie $\alpha_1 = \frac{1}{2}$, $\beta_1 = -\frac{1}{2}$, $\gamma_1 = \frac{1}{2}$.

$= 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$

$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{lin. niezal.}$

Łatwo zauważyć, że $1+x = [\alpha_2, \beta_2, \gamma_2]_{\mathcal{B}} = [1, 0, 0]_{\mathcal{B}}$.

$= 1 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 + 0 \cdot b_3$

Analogicznie obliczenia przeprowadzamy dla $1+x+x^2 = [\alpha_3, \beta_3, \gamma_3]_{\mathcal{B}}$



i otrzymujemy $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

*\oplus tw. 7.2.25
 $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$*

Twierdzenie 7.2.36. Niech V będzie przestrzenią liniową skończenie wymiarową, zaś $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ jej bazami. Wówczas

i) $P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} = (P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'})^{-1}$,

ii) $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \cdot P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}''}$.



Dowód. Wykorzystując zapis przyjęty w dowodzie twierdzenia 7.2.34, mamy

$$[b'_1 \ b'_2 \ \dots \ b'_n] = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n] P_{B \rightarrow B'} \text{ oraz } [b''_1 \ b''_2 \ \dots \ b''_n] = [b'_1 \ b'_2 \ \dots \ b'_n] P_{B' \rightarrow B''} .$$


i) Macierz przejścia jest odwracalna, zatem $[b'_1 \ b'_2 \ \dots \ b'_n] P_{B \rightarrow B'}^{-1} = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n]$.

ii) Mnożenie macierzy jest łączne, zatem


$$[b''_1 \ b''_2 \ \dots \ b''_n] = [b'_1 \ b'_2 \ \dots \ b'_n] P_{B' \rightarrow B''} = ([b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n] P_{B \rightarrow B'}) P_{B' \rightarrow B''} = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n] (P_{B \rightarrow B'} P_{B' \rightarrow B''}) .$$

□

UWAGA:



TEMAT: *Przekształcenia liniowe*



8.1 Definicja i podstawowe własności

Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ oraz $W = (W, \oplus, K, \odot)$ będą przestrzeniami wektorowymi nad tym samym ciałem K .

Definicja 8.1.1. Odwzorowanie $\varphi : V \rightarrow W$ spełniające warunki

zgodność z działaniem i wzajemność wektorów

- i) własność addytywności $\forall u, v \in V \quad \varphi(u + v) = \varphi(u) \oplus \varphi(v)$
- ii) własność jednorodności $\forall v \in V \quad \forall \alpha \in K \quad \varphi(\alpha \cdot v) = \alpha \odot \varphi(v)$,

homogeneous "jednorodny"

nazywamy *odwzorowaniem liniowym* lub *przekształceniem liniowym* lub *homomorfizmem przestrzeni liniowych*.

Twierdzenie 8.1.2. Niech $\varphi : V \rightarrow W$. Wówczas następujące warunki są równoważne.

- i) φ jest liniowe
- ii) $\forall u, v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad \varphi(\alpha \cdot u + \beta \cdot v) = \alpha \odot \varphi(u) \oplus \beta \odot \varphi(v)$
- iii) $\forall v_1, \dots, v_n \in V \quad \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K \quad \varphi(\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_n \cdot v_n) = \alpha_1 \odot \varphi(v_1) \oplus \dots \oplus \alpha_n \odot \varphi(v_n)$

kombinacja liniowa

Dowód. i) \Rightarrow ii) Jeśli φ jest liniowe, to wówczas $\varphi(\alpha \cdot u + \beta \cdot v) = \varphi(\alpha \cdot u) \oplus \varphi(\beta \cdot v) = \alpha \odot \varphi(u) \oplus \beta \odot \varphi(v)$ dla dowolnych $u, v \in V, \alpha, \beta \in K$.

ii) \Rightarrow i) Przyjmując $\alpha = \beta = 1$ otrzymujemy własność addytywności, zaś przyjmując $\alpha = 0, \beta \neq 0$ otrzymujemy własność jednorodności.

ii) \Leftrightarrow iii) Wystarczy przeprowadzić dowód indukcyjny. \square

Zbiór wszystkich odwzorowań liniowych odwzorowujących V w W oznaczamy $\mathcal{L}_K(V, W)$ lub $Hom_K(V, W)$ (lub krótko $\mathcal{L}(V, W)$ lub $Hom(V, W)$), gdy wiemy, z jakim ciałem mamy do czynienia).

Uwaga 8.1.3. Często notujemy $V = (V, +, K, \cdot)$ oraz $W = (W, +, K, \cdot)$, to znaczy używamy tych samych symboli dla działań w przestrzeniach V i W , mimo że są to różne działania.

$$\mathbb{R} = (\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_;)$$

Przykład 8.1.4. Czy φ jest liniowe?


1) $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x) = ax$, gdzie $a \in \mathbb{R}$ ustalone

Odwzorowanie jest liniowe, bowiem dla dowolnych $\alpha \in \mathbb{R}, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ mamy
 $\varphi(\alpha x) = a(\alpha x) = \alpha(ax) = \alpha\varphi(x)$ oraz
 $\varphi(x_1 + x_2) = a(x_1 + x_2) = ax_1 + ax_2 = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$.



2) $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x) = ax + b$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$ ustalone


Jeśli $b \neq 0$, to odwzorowanie nie jest liniowe, bowiem
 $\varphi(1 + 1) = \varphi(2) = 2a + b \neq \varphi(1) + \varphi(1) = (a + b) + (a + b) = 2a + 2b$.



3) $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, symetria względem osi Ox

Ponieważ $\varphi(x, y) = (x, -y)$, zatem dla dowolnych $\alpha \in \mathbb{R}, (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$
 $\varphi(\alpha(x, y)) = \varphi(\alpha x, \alpha y) = (\alpha x, -\alpha y) = \alpha(x, -y) = \alpha\varphi(x, y)$ oraz
 $\varphi((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = \varphi(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + x_2, -(y_1 + y_2)) = (x_1 + x_2, -y_1 - y_2) = (x_1 + x_2, -y_1) + (x_2, -y_2) = \varphi(x_1, y_1) + \varphi(x_2, y_2)$.

Odwzorowanie jest liniowe.



4) $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \varphi(x, y, z) = (x - y + z, 2y + z + 1)$

Odwzorowanie nie jest liniowe.

$$L = \varphi(\alpha(x, y, z)) = \varphi(\alpha x, \alpha y, \alpha z) = (\alpha x - \alpha y + \alpha z, 2\alpha y + \alpha z + 1)$$

$$P = \alpha\varphi(x, y, z) = \alpha(x - y + z, 2y + z + 1) = (\alpha x - \alpha y + \alpha z, 2\alpha y + \alpha z + \alpha)$$

Na ogół $L \neq P$. Możemy podać kontrprzykład

$$\varphi(5 \cdot (1, 0, 0)) = \varphi(5, 0, 0) = (5, 1) \neq 5 \cdot \varphi(1, 0, 0) = 5 \cdot (1, 1) = (5, 5)$$

Uwaga 8.1.5. i) Odwzorowanie $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ jest liniowe wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ takie, że $\varphi(x, y) = (ax + by, cx + dy)$.

ii) Odwzorowanie $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ jest liniowe wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją $a, b, c, d, e, f, g, h, j \in \mathbb{R}$ takie, że $\varphi(x, y, z) = (ax + by + cz, dx + ey + fz, gx + hy + jz)$.

Przykład 8.1.6. Czy odwzorowanie $\varphi : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$, dane wzorem
 $\varphi(p)(x) = (3 - x)p''(x) + 4p'(x)$, dla dowolnego $p \in \mathbb{R}_2[x]$, jest liniowe?

Sprawdzimy, że φ jest liniowe. Wynika to z liniowości różniczkowania.

Dla dowolnych $p, q \in \mathbb{R}_2[x]$ mamy

$$\varphi(p+q)(x) = (3-x)(p+q)''(x) + 4(p+q)'(x) = (3-x)(p''(x) + q''(x)) + 4(p'(x) + q'(x)) =$$

$$((3-x)p''(x) + 4p'(x)) + ((3-x)q''(x) + 4q'(x)) = \varphi(p)(x) + \varphi(q)(x),$$

dla dowolnego $x \in \mathbb{R}$. Zatem $\varphi(p+q) = \varphi(p) + \varphi(q)$.

Dla dowolnych $p \in \mathbb{R}_2[x], \alpha \in \mathbb{R}$ mamy

$$\mathbb{R}_2[x] \quad ax^2 + bx + c$$

$$\mathbb{R}_1[x] \quad \alpha x + \beta$$

ANALIZA - pochodna od sumy to suma pochodnych

$$\varphi(\alpha p)(x) = (3-x)(\alpha p)''(x) + 4(\alpha p)'(x) = (3-x)\alpha \cdot p''(x) + 4\alpha \cdot p'(x) = \alpha \cdot ((3-x)p''(x) + 4p'(x)) = \alpha \cdot \varphi(p)(x).$$

dla dowolnego $x \in \mathbb{R}$. Zatem $\varphi(\alpha p) = \alpha \varphi(p)$.

Niech $V = (V, +, K, \cdot)$ oraz $W = (W, \oplus, K, \odot)$.

Twierdzenie 8.1.7. Jeśli odwzorowanie $\varphi : V \rightarrow W$ jest liniowe, to wówczas

- i) $\varphi(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$,
- ii) $\forall v \in V \varphi(-v) = -\varphi(v)$.

Dowód. i) Ponieważ $\mathbf{0}_W + \varphi(x) = \varphi(x) = \varphi(x + \mathbf{0}_V) = \varphi(x) + \varphi(\mathbf{0}_V)$, zatem $\varphi(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$.
 ii) Na mocy i) dla dowolnego $v \in V$ mamy $\mathbf{0}_W = \varphi(\mathbf{0}_V) = \varphi(v - v) = \varphi(v) + \varphi(-v)$. Stąd $\varphi(-v) = -\varphi(v)$. \square

Wniosek 8.1.8. Niech $\varphi : V \rightarrow W$. Jeśli $\varphi(\mathbf{0}_V) \neq \mathbf{0}_W$, to φ nie jest liniowe.

Dowód. Teza wynika z twierdzenia 8.1.7 i) na mocy prawa kontrapozycji. \square

LOGIKA
($a \rightarrow b$) \Leftrightarrow

Przykład 8.1.9. Odwzorowanie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 5$ nie jest liniowe, bowiem $f(0) = 5 \neq 0$. $\Leftrightarrow (\sim b \Rightarrow \sim a)$


Definicja 8.1.10. Odwzorowanie liniowe $\varphi : V \rightarrow W$ nazywamy:

- i) *monomorfizmem*, jeśli φ jest iniekcją, (Różnowartościowe)
- ii) *epimorfizmem*, jeśli φ jest surjekcją, Zbiór wartości = przedział dziedziny
- * iii) *izomorfizmem*, jeśli φ jest bijekcją, = iniekcja + surjekcja $1:1$
- iv) *endomorfizmem*, jeśli $V = W$,
- v) *automorfizmem*, jeśli $V = W$ i φ jest bijekcją, $\varphi: V \rightarrow V$
 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
- vi) *formą liniową*, jeśli $W = K$.

Twierdzenie 8.1.11. Niech V oraz W będą przestrzeniami wektorowymi nad tym samym ciałem K . Niech (b_1, \dots, b_n) będzie bazą przestrzeni V oraz niech $w_1, \dots, w_n \in W$ będzie dowolnym układem wektorów. Wówczas istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$ takie, że $\varphi(b_i) = w_i$, dla $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Dowód. Dla dowolnego $v \in V$ istnieją $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ takie, że $v = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$. Ponieważ φ jest liniowe, zatem $\varphi(v) = \varphi(\alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n) = \alpha_1 \varphi(b_1) + \dots + \alpha_n \varphi(b_n) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$. Zatem φ jest określone na całej przestrzeni V w sposób jednoznaczny. \square

Uwaga 8.1.12. Z powyższego twierdzenia wynika, że aby w pełni określić odwzorowanie liniowe na przestrzeni liniowej V wystarczy określić obrazy wektorów bazowych przestrzeni V .



\mathbb{R}^3

$$v = [a, b, c]_{B_K} = a \cdot \hat{i} + b \cdot \hat{j} + c \cdot \hat{k}$$

$$\varphi(v) = \varphi(a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}) \stackrel{\text{lin.}}{=} a \cdot \varphi(\hat{i}) + b \cdot \varphi(\hat{j}) + c \cdot \varphi(\hat{k})$$

$\varphi \in \mathbb{R}_2[x]$
 $\varphi(\varphi) = ?$

$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}$
 $= -2 \neq 0$
 lin. niezal.
 $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$
 baza

Przykład 8.1.13. Podaj wzór odwzorowania liniowego φ , jeśli

$\varphi : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x], \quad \varphi(x^2 + x) = 6x + 10, \quad \varphi(x - 1) = 4, \quad \varphi(2x) = 8.$

W przestrzeni wektorowej $\mathbb{R}_2[x]$ bazą standardową jest $\mathcal{B} = (1, x, x^2)$. Mamy

$\begin{cases} \varphi(x^2 + x) = \varphi(x^2) + \varphi(x) = 6x + 10 \\ \varphi(x - 1) = \varphi(x) - \varphi(1) = 4 \Rightarrow \varphi(1) = \varphi(x) - 4 \\ \varphi(2x) = 2\varphi(x) = 8 \end{cases}$

Stąd $\varphi(x) = 4, \varphi(1) = \varphi(x) - 4 = 0, \varphi(x^2) = 6x + 10 - \varphi(x) = 6x + 6.$

Dowolny $p \in \mathbb{R}_2[x]$ jest postaci $p(x) = ax^2 + bx + c$, dla pewnych $a, b, c \in \mathbb{R}$. Zatem $\varphi(ax^2 + bx + c) = a\varphi(x^2) + b\varphi(x) + c\varphi(1) = a \cdot (6x + 6) + b \cdot 4 + c \cdot 0 = 6ax + 6a + 4b.$

$\varphi(2x^2 + 3x)$
 $= 12x + 12 + 12$
 $= 12x + 24$

8.2 Jądro, obraz i rząd odwzorowania liniowego

Niech V oraz W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Niech $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$.

- Definicja 8.2.1.** i) Zbiór $\{v \in V : \varphi(v) = \mathbf{0}_W\} \subseteq V$ nazywamy *jądrem* odwzorowania liniowego φ i oznaczamy $\text{Ker}\varphi$.
przeciwwobraz zera
zbiór wartości
- ii) Zbiór $\{w \in W : \exists v \in V \varphi(v) = w\} = \{\varphi(v) : v \in V\} \subseteq W$ nazywamy *obrazem* odwzorowania liniowego φ i oznaczamy $\text{Im}\varphi$ lub $\varphi(V)$.

Uwaga 8.2.2. Dla dowolnego odwzorowania liniowego $\varphi : V \rightarrow W$ zbiory $\text{Ker}\varphi$ oraz $\text{Im}\varphi$ są niepuste.

Dowód. Ponieważ $\varphi(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$, zatem $\mathbf{0}_V \in \text{Ker}\varphi$ oraz $\mathbf{0}_W \in \text{Im}\varphi$. \square

Twierdzenie 8.2.3. Dla dowolnego $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$ zbiór $\text{Ker}\varphi$ jest podprzestrzenią liniową przestrzeni V , zaś zbiór $\text{Im}\varphi$ jest podprzestrzenią liniową przestrzeni W .

Dowód. Niech $x, y \in \text{Ker}\varphi$ oraz $\alpha, \beta \in K$. Wówczas $\varphi(\alpha x + \beta y) = \alpha\varphi(x) + \beta\varphi(y) = \alpha \cdot \mathbf{0}_W + \beta \cdot \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W$. Zatem $\alpha x + \beta y \in \text{Ker}\varphi$.

Niech teraz $w_1, w_2 \in \text{Im}\varphi$ oraz $\alpha, \beta \in K$. Wówczas istnieją $v_1, v_2 \in V$ takie, że $w_1 = \varphi(v_1), w_2 = \varphi(v_2)$. Stąd $\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha\varphi(v_1) + \beta\varphi(v_2) = \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2)$, gdzie $\alpha v_1 + \beta v_2 \in V$. Zatem $\alpha w_1 + \beta w_2 \in \text{Im}\varphi$. \square

Niech V oraz W będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem K .

Twierdzenie 8.2.4. Dla dowolnego $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$

- i) φ jest iniekcją $\Leftrightarrow \text{Ker}\varphi = \{\mathbf{0}_V\}, \quad v \neq \mathbf{0}_V \Rightarrow \varphi(v) \neq \mathbf{0}_W$
- ii) φ jest surcją $\Leftrightarrow \text{Im}\varphi = W$.

Dowód. i) Jeśli φ nie jest iniekcją, to istnieją $u, v \in V$ takie, że $u \neq v$ oraz $\varphi(u) = \varphi(v)$. Stąd $u - v \neq \mathbf{0}_V$ oraz $\varphi(u - v) = \varphi(u) - \varphi(v) = \mathbf{0}_W$. A zatem $u - v \in \text{Ker}\varphi$ i $\text{Ker}\varphi \neq \{\mathbf{0}_V\}$. Jeśli $\text{Ker}\varphi \neq \{\mathbf{0}_V\}$, to istnieje $v \in V$ takie, że $v \neq \mathbf{0}_V$ oraz $v \in \text{Ker}\varphi$. Stąd $\varphi(v) = \mathbf{0}_W = \varphi(\mathbf{0}_V)$, a zatem φ nie jest iniekcją.

ii) Teza jest oczywista. \square

Tw. 7.2.30 \otimes

$\text{Im}\varphi \subseteq W$

Definicja 8.2.5. Jeśli $\dim \text{Im} \varphi < \infty$, to liczbę tę nazywamy *rzędem* odwzorowania liniowego $\varphi : V \rightarrow W$ i oznaczamy $r(\varphi)$ lub $\text{rank}(\varphi)$.

$\varphi : V \rightarrow W$

Twierdzenie 8.2.6. (Twierdzenie o rzędzie, Rank-nullity theorem) Niech V oraz W będą przestrzeniami wektorowymi skończenie wymiarowymi nad ciałem K . Niech $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$. Wówczas

$r(\varphi) + \dim \text{Ker} \varphi = \dim V$

Bez dowodu. Dowód można znaleźć w [4].

Wniosek 8.2.7. Dla dowolnego $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$ mamy $\dim \text{Im} \varphi \leq \dim V$.

Przykład 8.2.8.

$\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, \varphi(x, y, z, t) = (x + y + z + 2t, x - y + z + 6t, x + y - z - 4t)$

linia nie "podnoszą" wymiaru bo podprzestrzeń

Np. $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^7$ liniowe NIGDY NIE surjekcja $\rightarrow \dim \text{Im} \varphi \leq 3$

Wyznacz jądro oraz obraz φ , ich bazy i wymiary. Podaj własności φ .

1) $\text{Ker} \varphi = ?$

$\varphi(x, y, z, t) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z + 2t = 0 \\ x - y + z + 6t = 0 \\ x + y - z - 4t = 0 \end{cases}$ *układ jednorodny*

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -4 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{w_2-w_1 \\ w_3-w_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -6 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-\frac{1}{2}w_2 \\ -\frac{1}{2}w_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1-w_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1-w_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = 2t \\ z = -3t \\ t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$\text{Ker} \varphi = \{(-t, 2t, -3t, t), t \in \mathbb{R}\} = \text{lin}\{(-1, 2, -3, 1)\}$
 Układ $\{(-1, 2, -3, 1)\}$ jest bazą $\text{Ker} \varphi$ oraz $\dim \text{Ker} \varphi = 1$.

$t \cdot (-1, 2, -3, 1)$

$\text{Ker} \varphi \neq \{0\}$ nie iniekcja

Zatem φ nie jest monomorfizmem. Ponadto $r(\varphi) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \text{Ker} \varphi = 4 - 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, zatem φ jest epimorfizmem. Stąd $\text{Im} \varphi = \mathbb{R}^3$. Można to również sprawdzić bezpośrednim rachunkiem.

$\varphi(x, y, z, t) = x(1, 1, 1) + y(1, -1, 1) + z(1, 1, -1) + t(2, 6, -4)$ *generatory*
 $\text{Im} \varphi = \text{lin}\{(1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, 1, -1), (2, 6, -4)\}$

$r \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 6 & -4 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} = 3 \Rightarrow \text{Im} \varphi = \text{lin}\{(1, 1, 1), (0, -2, 0), (0, 0, -2)\}$

↑ baza!

*$\text{lin}\{u, v\}$
"
 $\text{lin}\{u, v, w\}$*

Układ $\{(1, 1, 1), (0, -2, 0), (0, 0, -2)\}$ jest bazą przestrzeni $\text{Im} \varphi$.
 $\text{Im} \varphi \subseteq \mathbb{R}^3 \wedge \dim \text{Im} \varphi = 3 = \dim \mathbb{R}^3 \Rightarrow \text{Im} \varphi = \mathbb{R}^3$.

*I metoda
II metoda*

8.3 Działania na odwzorowaniach liniowych

Niech U, V, W będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem K .

$\mathcal{L}f: V \rightarrow W$; f -liniowej

Twierdzenie 8.3.1. Zbiór $\mathcal{L}(V, W)$ wraz z działaniami

$$+ : \mathcal{L}(V, W) \times \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \mathcal{L}(V, W), \quad \cdot : K \times \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \mathcal{L}(V, W)$$

$f(x) = \sin^2 x$

$g(x) = x^3$

określonymi wzorami $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$,
jest przestrzenią liniową nad ciałem K .

$(f+g)(x) = \sin^2 x + x^3$


Dowód. Sprawdzimy, że jest to podprzestrzeń liniowa przestrzeni funkcji $W^V = \{f : V \rightarrow W\}$. Niech $f, g \in \mathcal{L}(V, W)$ oraz $\alpha, \beta \in K$. Wówczas $\alpha f + \beta g \in \mathcal{L}(V, W)$, bowiem dla dowolnych $v_1, v_2 \in V$, $a, b \in K$ mamy

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)(av_1 + bv_2) &= \alpha \cdot f(av_1 + bv_2) + \beta \cdot g(av_1 + bv_2) = \alpha \cdot (af(v_1) + bf(v_2)) + \beta \cdot \\ & (ag(v_1) + bg(v_2)) = a \cdot (\alpha f(v_1) + \beta g(v_1)) + b \cdot (\alpha f(v_2) + \beta g(v_2)) = \\ & a \cdot (\alpha f + \beta g)(v_1) + b \cdot (\alpha f + \beta g)(v_2). \quad \square \end{aligned}$$

Twierdzenie 8.3.2. i) Jeśli $f \in \mathcal{L}(U, V)$ oraz $g \in \mathcal{L}(V, W)$, to wówczas $g \circ f \in \mathcal{L}(U, W)$.

złożenie odwz. liniowych jest odwz. liniowym

ii) Jeśli $f \in \mathcal{L}(V, W)$ jest bijekcją, to $f^{-1} \in \mathcal{L}(W, V)$.



Dowód. i) Dla dowolnych $u_1, u_2 \in U$, $a, b \in K$ mamy

$$(g \circ f)(au_1 + bu_2) = g(f(au_1 + bu_2)) = g(af(u_1) + bf(u_2)) = ag(f(u_1)) + bg(f(u_2)) = a \cdot (g \circ f)(u_1) + b \cdot (g \circ f)(u_2).$$

ii) Jeśli f jest bijekcją, to f^{-1} również jest bijekcją. Ponadto $\text{Im} f = W$, zatem dla dowolnych $w_1, w_2 \in W$ istnieją $v_1, v_2 \in V$ takie, że $f(v_1) = w_1$, $f(v_2) = w_2$. Dla dowolnych $a, b \in K$ mamy

$$f^{-1}(aw_1 + bw_2) = f^{-1}(af(v_1) + bf(v_2)) = f^{-1}(f(av_1 + bv_2)) = (f^{-1} \circ f)(av_1 + bv_2) = av_1 + bv_2 = a(f^{-1} \circ f)(v_1) + b(f^{-1} \circ f)(v_2). \quad \square$$

Oznaczmy przez $\text{Aut}_K(V) = \{f \in \mathcal{L}_K(V, V) : f\text{-bijekcja}\}$ zbiór wszystkich automorfizmów przestrzeni liniowej V .

Wniosek 8.3.3. Zbiór $\text{Aut}_K(V)$ wraz z działaniem składania odwzorowań jest grupą nieprzemienneą. *(bo składanie nie jest przemienne!)*

Dowód. Wewnętrzność działania składania wynika na mocy twierdzenia 8.3.2 i). Składania odwzorowań jest łączne. Elementem neutralnym jest odwzorowanie identycznościowe id_V . Elementem symetrycznym do $f \in \text{Aut}_K(V)$ jest f^{-1} , bowiem na mocy twierdzenia 8.3.2 ii) $f^{-1} \in \text{Aut}_K(V)$. \square

Grupa $\text{Aut}_K(V)$ bywa też oznaczana symbolem $\text{GL}(V)$ i nazywana pełną lub ogólną grupą liniową przestrzeni liniowej V .

Przykład 8.3.4. Odwzorowanie $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dane wzorem

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3, x_1 + x_2) \text{ jest automorfizmem przestrzeni } \mathbb{R}^3.$$

∇
 \cdot
 $\text{GL}_n(\mathbb{R})$
 \parallel
 $\{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$

TEMAT: *Przekształcenia liniowe - ciąg dalszy*

9.1 Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego

Niech V oraz W będą przestrzeniami liniowymi skończenie wymiarowymi nad ciałem K . Niech $\mathcal{B}_V = (b_1, \dots, b_n)$ oraz $\mathcal{B}_W = (c_1, \dots, c_m)$ będą ustalonymi bazami przestrzeni V i W odpowiednio. Rozważmy odwzorowanie liniowe $\varphi : V \rightarrow W$.

Definicja 9.1.1. Macierzą (lub reprezentacją macierzową) odwzorowania liniowego φ w bazach $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ nazywamy macierz $A \in M_{m \times n}(K)$, której kolejne kolumny to współrzędne wektorów $\varphi(b_1), \dots, \varphi(b_n)$ w bazie \mathcal{B}_W . Oznaczamy ją symbolem $M_\varphi(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$.

Przykład 9.1.2. Wyznacz macierz odwzorowania liniowego $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(x, y, z) = (3x, 2y + z)$, gdy rozważamy

a) w \mathbb{R}^3 i \mathbb{R}^2 bazy kanoniczne

$M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$

$$\varphi(1, 0, 0) = (3, 0), \varphi(0, 1, 0) = (0, 2), \varphi(0, 0, 1) = (0, 1), \quad M_\varphi(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x \\ 2y + z \end{bmatrix}$$

$$A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$b_i \in V$
 $\varphi(b_i) \in W$
 \uparrow
 są kombinacją
 c_1, \dots, c_m

b) bazy $\mathcal{B} = (b_1 = (1, 2, 0), b_2 = (1, 1, 1), b_3 = (0, 0, 1))$, $\mathcal{C} = (c_1 = (1, 2), c_2 = (0, 1))$

$$\varphi(b_1) = \varphi(1, 2, 0) = (3, 4) = [\alpha_1, \beta_1]_{\mathcal{C}}, \quad (3, 4) = \alpha_1 c_1 + \beta_1 c_2 = (\alpha_1, 2\alpha_1 + \beta_1),$$

$$\varphi(b_2) = \varphi(1, 1, 1) = (3, 3) = [\alpha_2, \beta_2]_{\mathcal{C}}, \quad (3, 3) = \alpha_2 c_1 + \beta_2 c_2 = (\alpha_2, 2\alpha_2 + \beta_2),$$

$$\varphi(b_3) = \varphi(0, 0, 1) = (0, 1) = [\alpha_3, \beta_3]_{\mathcal{C}}, \quad (0, 1) = \alpha_3 c_1 + \beta_3 c_2 = (\alpha_3, 2\alpha_3 + \beta_3),$$

$$M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{C}) = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Obserwacja: Postać macierzy reprezentującej dane odwzorowanie liniowe zależy od wyboru baz.

Uwaga 9.1.3. Odwzorowanie $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ jest liniowe wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje macierz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ taka, że

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \quad \varphi(x_1, \dots, x_n) = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Wówczas $A = M_\varphi(\mathcal{B}_k^n, \mathcal{B}_k^m)$.

↓ wielomiany zmiennej z
o współcz. z \mathbb{C} , $\deg \leq 1$

Przykład 9.1.4. Wyznacz macierz odwzorowania liniowego $f : \mathbb{C}_1[z] \rightarrow M_2(\mathbb{C})$, $f(\alpha z + \beta) = \alpha A + \beta I_2$, gdzie $A = \begin{bmatrix} 2+i & 1 \\ 3 & 4-i \end{bmatrix}$, względem baz standardowych danych przestrzeni $(\mathbb{C}_1[z], +, \mathbb{C}, \cdot)$ oraz $(M_2(\mathbb{C}), +, \mathbb{C}, \cdot)$.

Weźmy dowolny $p \in \mathbb{C}_1[z]$. Jest on postaci $p(z) = \alpha z + \beta$. Rozważamy bazę $\mathcal{B} = (1, z)$ przestrzeni $\mathbb{C}_1[z]$ oraz bazę $\mathcal{C} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ przestrzeni $M_2(\mathbb{C})$.

$$f(1) = 0 \cdot A + 1 \cdot I_2 = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [1, 0, 0, 1]_{\mathcal{C}}$$

$$f(z) = 1 \cdot A + 0 \cdot I_2 = A = [2+i, 1, 3, 4-i]_{\mathcal{C}}$$

$b \cdot 1 + a \cdot z$

$$\begin{bmatrix} \wedge & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \wedge & 0 \end{bmatrix}$$

$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}_1[z] = 2$, $\dim_{\mathbb{C}} M_2(\mathbb{C}) = 4$, $\Rightarrow M_f(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \in M_{4 \times 2}(\mathbb{C})$, $M_f(\mathcal{B}, \mathcal{C}) = \begin{bmatrix} 1 & 2+i \\ 0 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 4-i \end{bmatrix}$

$f(\alpha \cdot z + \beta) = ?$ $A \cdot \begin{bmatrix} \beta \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$

Twierdzenie 9.1.5. Niech V oraz W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Niech $\mathcal{B}_V = (b_1, \dots, b_n)$ oraz $\mathcal{B}_W = (c_1, \dots, c_m)$ będą ustalonymi bazami przestrzeni V i W . Niech $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$ oraz $A = M_\varphi(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$. Oznaczmy

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix},$$

gdzie $v = [x_1, \dots, x_n]_{\mathcal{B}_V}$, $w = [y_1, \dots, y_m]_{\mathcal{B}_W}$. Wówczas

$$\varphi(v) = w \Leftrightarrow AX = Y.$$

Dowód. Obliczamy $\varphi(v) = \varphi(x_1 b_1 + \dots + x_n b_n) = x_1 \varphi(b_1) + \dots + x_n \varphi(b_n) = x_1(a_{11}c_1 + \dots + a_{m1}c_m) + \dots + x_n(a_{1n}c_1 + \dots + a_{mn}c_m) = (x_1 a_{11} + \dots + x_n a_{1n})c_1 + \dots + (x_1 a_{m1} + \dots + x_n a_{mn})c_m$. Ponieważ współrzędne $w = \varphi(v)$ w bazie \mathcal{B}_W są określone

jednoznacznie, zatem $\begin{cases} y_1 = x_1 a_{11} + \dots + x_n a_{1n} \\ \dots \\ y_m = x_1 a_{m1} + \dots + x_n a_{mn} \end{cases}$, czyli $AX = Y$. \square

Uwaga 9.1.6. Istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość między odwzorowaniami liniowymi a macierzami (przy ustalonych bazach). Macierz odwzorowania liniowego φ w pełni opisuje to odwzorowanie, można zatem badać macierz, zamiast odwzorowania.

Wniosek 9.1.7. Rząd macierzy A przekształcenia liniowego φ nie zależy od wyboru baz $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$. Ponadto $\text{rank}(\varphi) = \text{rank} A$.

Dowód. Przyjmijmy oznaczenia jak w twierdzeniu 9.1.5. Ponieważ $w = \varphi(v) = x_1\varphi(b_1) + \dots + x_n\varphi(b_n)$, zatem $\text{Im}\varphi = \text{lin}\{\varphi(b_1), \dots, \varphi(b_n)\}$. Ponadto

$$\begin{cases} \varphi(b_1) = a_{11}c_1 + \dots + a_{m1}c_m \\ \dots \\ \varphi(b_n) = a_{1n}c_1 + \dots + a_{mn}c_m \end{cases}$$

Stąd $r(\varphi) = \dim \text{Im}\varphi = r(A)$. \square

Wniosek 9.1.8. Przyjmijmy oznaczenia jak w twierdzeniu 9.1.5. Wówczas

i) φ jest epimorfizmem $\Leftrightarrow r(A) = m$.
(surjektacja)

ii) φ jest monomorfizmem $\Leftrightarrow r(A) = n$.
(injektacja)

Dowód. i) φ jest epimorfizmem $\Leftrightarrow \text{Im}\varphi = W \Leftrightarrow \dim \text{Im}\varphi = \dim W = m$.

ii) φ jest monomorfizmem $\Leftrightarrow \text{Ker}\varphi = \{0_V\} \Leftrightarrow \dim \text{Ker}\varphi = 0$. Na mocy twierdzenia o rzędzie $\dim \text{Ker}\varphi = n - \dim \text{Im}\varphi$, zatem $\text{Ker}\varphi = \{0_V\} \Leftrightarrow r(A) = n$. \square

Przykład 9.1.2 - ciąg dalszy

Oblicz $\varphi(1, 2, 3)$ dwoma sposobami, za pomocą macierzy $M_\varphi(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2)$ oraz za pomocą $M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{C})$. Czy φ jest monomorfizmem / epimorfizmem?

Oznaczmy $A = M_\varphi(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $A' = M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{C}) = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$.

$A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ *wynik*

Sprawdzenie $\varphi(1, 2, 3) = (3 \cdot 1, 2 \cdot 2 + 2) = (3, 7)$
 $(1, 2, 3) = 1(1, 2, 0) + 3(0, 0, 1) = 1 \cdot b_1 + 2 \cdot b_3 = [1, 0, 3]_{\mathcal{B}}$ *GW*

$A' \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ *BC*

Stąd $\varphi(1, 2, 3) = [3, 1]_{\mathcal{C}} = 3c_1 + c_2 = 3(1, 2) + (0, 1) = (3, 7)$.

Dodatkowo zauważmy, że $r(A) = r(A') = 2 = \dim \mathbb{R}^2$, zatem φ jest epimorfizmem.

Ponadto $\dim \text{Ker}\varphi = 3 - 2 = 1$, więc φ nie jest monomorfizmem.

Niech V oraz W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K . Niech \mathcal{B}_V oraz \mathcal{B}_W będą ustalonymi bazami. Ponadto niech $\alpha \in K$, $f, g \in \mathcal{L}(V, W)$ oraz $A = M_f(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$, $B = M_g(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$.

Twierdzenie 9.1.9. Przy powyższych założeniach

$A + B = M_{f+g}(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$ oraz $\alpha A = M_{\alpha f}(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$.

~~Dowód.~~ Na mocy twierdzenia 8.3.1 wiemy, że odwzorowania $f+g$ oraz αf są liniowe. Niech $v \in V$, $w = (f+g)(v)$, $w_1 = f(v)$, $w_2 = g(v)$, $z = (\alpha f)(v)$. Ponadto niech X, Y, Y_1, Y_2, Z oznaczają wektory kolumnowe współrzędnych wektorów v, w, w_1, w_2, z w bazach $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ odpowiednio. Wówczas

$$M_{f+g}X = Y \Leftrightarrow (f+g)(v) = w \Leftrightarrow f(v) + g(v) = w \Leftrightarrow w_1 + w_2 = w \Leftrightarrow Y_1 + Y_2 = Y \Leftrightarrow AX + BX = Y \Leftrightarrow (A+B)X = Y.$$

$$\text{Analogicznie } M_{\alpha f}X = Z \Leftrightarrow (\alpha f)(v) = z \Leftrightarrow \alpha \cdot f(v) = z.$$

$$\text{Dla } \alpha \neq 0 \text{ mamy } f(v) = \frac{z}{\alpha} \Leftrightarrow Y = \frac{1}{\alpha}Z \Leftrightarrow \alpha \cdot AX = Z \Leftrightarrow (\alpha \cdot A)X = Z.$$

Dla $\alpha = 0$, mamy $z = \mathbf{0}_W$, więc równość $(0 \cdot A)X = \mathbf{0}$ jest spełniona. \square

* **Twierdzenie 9.1.10.** Jeśli $\dim V = \dim W$, to wówczas następujące warunki są równoważne.


i) f jest izomorfizmem

ii) $\text{Ker} f = \{\mathbf{0}_V\}$

iii) $\text{Im} f = W$

iv) $r(A) = \dim V$

v) $\det A \neq 0$



~~Dowód.~~ i) \Rightarrow ii) Jeśli f jest izomorfizmem, to jest odwracalne, a zatem różnowartościowe.

ii) \Rightarrow iii) Załóżmy, że $\text{Ker} f = \{\mathbf{0}_V\}$, wówczas $\dim \text{Im} f = \dim V - \dim \text{Ker} f = \dim V - 0 = \dim W$, skąd $\text{Im} f = W$.

iii) \Rightarrow iv) Jeśli $\text{Im} f = W$, to $r(A) = r(f) = \dim W = \dim V$.

iv) \Rightarrow v) Załóżmy, że $r(A) = \dim V = n$. Wówczas A jest macierzą kwadratową stopnia n taką, że $\det A \neq 0$.


v) \Rightarrow i) Jeśli $\det A \neq 0$, to $r(A) = \dim V$. Ponadto $r(A) = \dim \text{Im} f$, zatem $\text{Im} f = W$. Pozostało wykazać injektywność. Weźmy $v_1, v_2 \in V$ takie, że $f(v_1) = f(v_2)$. Wówczas $f(v_1 - v_2) = f(v_1) - f(v_2) = \mathbf{0}_W$. Niech X oznacza kolumnę współrzędnych wektora $v_1 - v_2$ w bazie \mathcal{B}_V . Mamy $AX = \mathbf{0}$ oraz $\det A \neq 0$, skąd $X = \mathbf{0}$. Zatem $v_1 - v_2 = \mathbf{0}_V$, czyli $v_1 = v_2$. \square

Wniosek 9.1.11. Niech $f \in \mathcal{L}(V, W)$ będzie izomorfizmem oraz niech $A = M_f(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$. Wówczas $A^{-1} = M_{f^{-1}}(\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V)$.

~~Dowód.~~ Jeśli f jest izomorfizmem, to $\text{Ker} f = \{\mathbf{0}_V\}$, skąd $\dim V = \dim W$. Na mocy twierdzenia 9.1.10 mamy $\det A \neq 0$. Zatem istnieje A^{-1} , skąd $AX = Y \Leftrightarrow X = A^{-1}Y$. \square

Twierdzenie 9.1.12. Niech U, V, W będą przestrzeniami liniowymi skończone wymiarowymi nad ciałem K . Niech $\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ będą ustalonymi bazami. Ponadto niech $f \in \mathcal{L}(U, V)$, $g \in \mathcal{L}(V, W)$ oraz $A = M_f(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)$, $B = M_g(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$. Wówczas

$$B \cdot A = M_{g \circ f}(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_W).$$



Dowód. Niech $u \in U, f(u) = v, g(v) = w$ oraz niech X, Y, Z oznaczają wektory kolumnowe współrzędnych wektorów u, v, w w bazach $\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ odpowiednio. Wówczas $M_{g \circ f} X = Z \Leftrightarrow (g \circ f)(u) = w \Leftrightarrow g(f(u)) = w \Leftrightarrow AX = Y \wedge BY = Z \Leftrightarrow B(AX = Z) \Leftrightarrow (BA)X = Z. \quad \square$

Przykład 9.1.13. Dane są odwzorowania liniowe

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x - y + z, 2y + z),$$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g(x, y, z) = (x - 3z, x + y),$$

$$h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, h(x, y) = (2x + y, x - y).$$

Za pomocą rachunku macierzowego wyznacz wzór odwzorowania

$\varphi = 2h^{-1} \circ h^{-1} \circ (f + g)$ i oblicz $\varphi(1, 2, 3)$.

dw. z analizy

$(x, y) \xrightarrow{h} (u, v)$
 $u = 2x + y$
 $v = x - y$

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \Rightarrow M_f := M_f(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2) \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), M_f = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \Rightarrow M_g := M_g(\mathcal{B}_k^2, \mathcal{B}_k^2) \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), M_g = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{analogicznie}$$

$$M_{f+g} := M_{f+g}(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2) \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), M_{f+g} = M_f + M_g = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Czy h jest odwracalne?

$$h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \Rightarrow M_h := M_h(\mathcal{B}_k^2, \mathcal{B}_k^2) \in M_2(\mathbb{R}), M_h = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\det M_h = -3 \neq 0 \Rightarrow h$ jest odwracalne

$$M_{h^{-1}} := M_{h^{-1}}(\mathcal{B}_k^2, \mathcal{B}_k^2) \in M_2(\mathbb{R}), M_{h^{-1}} = (M_h)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \Rightarrow M_\varphi := M_\varphi(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2) \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}),$$

$$M_\varphi = 2M_{h^{-1}}M_{f+g} = \frac{2}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{2}{9} \begin{bmatrix} 3 & -5 & -5 \\ 3 & 16 & 7 \end{bmatrix}$$

$\varphi(x, y, z) = ?$

$$M_\varphi \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{2}{9} \begin{bmatrix} 3x - 5y - 5z \\ 3x + 16y - 7z \end{bmatrix} \Rightarrow \varphi(x, y, z) = \left(\frac{2}{3}x - \frac{10}{9}y - \frac{10}{9}z, \frac{2}{3}x + \frac{32}{9}y - \frac{14}{9}z \right)$$

wzór φ !

$\varphi(1, 2, 3) = ?$

$$M_\varphi \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{2}{9} \begin{bmatrix} 3 & -5 & -5 \\ 3 & 16 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{2}{9} \begin{bmatrix} -22 \\ 56 \end{bmatrix} \Rightarrow \varphi(1, 2, 3) = \left(-\frac{44}{9}, \frac{112}{9} \right)$$

9.2 Zmiana baz

Twierdzenie 9.2.1. Niech V oraz W będą przestrzeniami liniowymi skończenie wymiarowymi nad ciałem K . Niech \mathcal{B}_V oraz \mathcal{B}_W będą bazami przestrzeni V i W . Rozważmy nowe bazy $\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_W$ oraz odwzorowanie liniowe $\varphi : V \rightarrow W$. Niech $P = P_{\mathcal{B}_V \rightarrow \mathcal{B}'_V}$, $Q = P_{\mathcal{B}_W \rightarrow \mathcal{B}'_W}$ oraz $A = M_\varphi(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)$, $A' = M_\varphi(\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_W)$. Wówczas

↑ dwie reprezentacje macierzy φ
 $A' = Q^{-1}AP$
OK → Dowód. Ponieważ $X = PX'$, $Y = QY'$, $AX = Y$, $A'X' = Y'$, zatem $QY' = Y = AX = APX' \Rightarrow Y' = (Q^{-1}AP)X'$. \square
↑ która zmiana współrzędnych przy zmianie baz
 $QY' = APX' \Rightarrow Q^{-1}QY' = APX'$

Przykład 9.1.2 raz jeszcze

Korzystając ze wzoru ma zmianę macierzy odwzorowania liniowego przy zmianie baz, wyznaczmy macierz $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(x, y, z) = (3x, 2y + z)$ w bazach $\mathcal{B} = (b_1 = (1, 2, 0), b_2 = (1, 1, 1), b_3 = (0, 0, 1))$, $\mathcal{C} = (c_1 = (1, 2), c_2 = (0, 1))$.

$$A = M_\varphi(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad A' = M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{C}) = ?$$

$$P = P_{\mathcal{B}_k^3 \rightarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = P_{\mathcal{B}_k^2 \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A' = Q^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{to samo co wcześniej}$$

Uwaga 9.2.2. Niech V będzie przestrzenią liniową skończenie wymiarową, zaś \mathcal{B} oraz \mathcal{B}' jej dwiema bazami. Wówczas macierz przejścia $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ jest reprezentacją macierzową odwzorowania identycznościowego $\text{id} : V \rightarrow V$ przestrzeni V z bazą \mathcal{B}' w przestrzeń V z bazą \mathcal{B} .

Dowód. Niech $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$, $\mathcal{B}' = (b'_1, \dots, b'_n)$. Wówczas

$$\begin{cases} \text{id}(b'_1) = b'_1 = a_{11}b_1 + \dots + a_{n1}b_n \\ \dots \\ \text{id}(b'_n) = b'_n = a_{n1}b_1 + \dots + a_{nn}b_n \end{cases}, \text{ skąd } P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = M_{\text{id}}(\mathcal{B}', \mathcal{B}). \quad \square$$

$P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$
 $M_{\text{id}}((V, \mathcal{B}'), (V, \mathcal{B}))$
 $\varphi(b'_1) = \text{id}(b'_1) = b'_1 = [\dots]_{\mathcal{B}}$

← EGZAMIN!

TEMAT: Zagadnienie własne operatora liniowego ⊗ nauczyliście

10.1 Wartości własne i wektory własne endomorfizmu

Niech $V = (V, +, \mathbb{R}, \cdot)$ będzie rzeczywistą przestrzenią liniową wymiaru n . Oznaczmy $End(V) = \mathcal{L}(V, V)$. Endomorfizmy przestrzeni V nazywamy również operatorami liniowymi.

Twierdzenie 10.1.1. i) Zbiór $End(V) = (End(V), +, \mathbb{R}, \cdot)$ wraz z działaniami dodawania odwzorowań i mnożenia odwzorowania przez liczbę jest przestrzenią wektorową wymiaru n^2 .

odpowiadają
 w nich
 macierze
 kwadratowe

ii) Zbiór $End(V) = (End(V), +, \circ)$ wraz z działaniami dodawania i składania odwzorowań ma strukturę pierścienia nieprzemiennej.

bo $f \circ g \neq g \circ f$

zgodność trybu
 Struktury

iii) $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall f, g \in End(V) \quad \alpha \cdot (f \circ g) = (\alpha \cdot f) \circ g = f \circ (\alpha \cdot g)$


Dowód. i), ii) Wynikają z twierdzeń 8.3.1 oraz 8.3.2. iii) Wynika z odpowiednich związków dla macierzy odwzorowań $f, g, f \circ g, \alpha f, \alpha g$. □

Definicja 10.1.2. Podprzestrzeń liniową U przestrzeni V nazywamy *niezmienniczą* względem endomorfizmu $\varphi \in End(V)$ lub krótko φ -niezmienniczą, jeżeli

$$\varphi(U) \subset U, \quad \text{tzn.} \quad \forall u \in U \quad \varphi(u) \in U.$$

$$a \in U \Rightarrow \varphi(a) \in U \quad \alpha \in U \subset V \quad \varphi(a) \in V$$

Przykład 10.1.3. 1) Niech $V = \mathbb{R}^3$, $U = \{(0, 0, t) \in \mathbb{R}^3 : t \in \mathbb{R}\}$, $\varphi(x, y, z) = (-y, x, z)$



Zauważmy, że φ jest obrotem o kąt $\frac{\pi}{2}$ wokół osi Oz .

Zatem dla $(0, 0, t) \in U$ mamy $\varphi(0, 0, t) = (0, 0, t) \in U$ i U jest φ -niezmienniczą.


2) Niech $V, \varphi \in End(V)$ dowolne, $U = Ker \varphi$

$$u \in Ker \varphi \Rightarrow \varphi(u) = 0_V \in Ker \varphi$$


Niech $u \in U$, wówczas $\varphi(u) = \mathbf{0}_V$. Oczywiście $\mathbf{0}_V \in U$, bowiem $\varphi(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_V$.

Zatem U jest φ -niezmienniczą.

dla dowolnej
 zawsze



na pewno
 bo
 endomorfizm



Znaczenie podprzestrzeni niezmienniczych

Dla dowolnego endomorfizmu $\varphi : V \rightarrow V$ i dla dowolnej podprzestrzeni $U \subset V$, mamy $\varphi(U) \subset V$.

Gdy U jest φ -niezmiennicza mamy $\varphi(U) \subset U$, zatem restrykcja $\varphi|_U : U \rightarrow U$, czyli $\varphi|_U \in \text{End}(U)$.

Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią liniową. Niech $\varphi \in \text{End}(V)$.

Definicja 10.1.4. i) Liczbę $\lambda \in \mathbb{R}$ nazywamy wartością własną endomorfizmu φ , jeżeli istnieje niezerowy wektor $v \in V$ taki, że $\varphi(v) = \lambda v$. Każdy taki wektor nazywamy wektorem własnym endomorfizmu φ , odpowiadającym wartości własnej λ .

\uparrow z założenia niezerowy

ii) Problem polegający na wyznaczeniu dla danego endomorfizmu φ wartości własnych i odpowiadających im wektorów własnych nazywamy zagadnieniem własnym dla endomorfizmu φ .

iii) Zbiór wszystkich wartości własnych operatora liniowego φ oznaczamy symbolem $\text{Spec}(\varphi)$ i nazywamy widmem bądź spektrum tego operatora.

$f \xrightarrow{\frac{d}{dx}} \frac{df}{dx} (f)$

Przykład 10.1.5. Niech $V = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ oraz $\varphi = \frac{d}{dx}$, tzn. dla dowolnego $f \in V$ mamy $\varphi(f) = \frac{df}{dx} = f'$. Przekonamy się, że dowolna liczba rzeczywista jest wartością własną operatora $\frac{d}{dx}$. Istotnie, niech $\lambda \in \mathbb{R}$ będzie dowolne. Zdefiniujmy

$g_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g_\lambda(x) = a \cdot e^{\lambda x}$, gdzie $a \in \mathbb{R} \neq \{0\}$. Oczywiście $g_\lambda \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Ponadto $\varphi(g_\lambda)(x) = a \cdot (e^{\lambda x})' = a\lambda e^{\lambda x} = \lambda(a \cdot e^{\lambda x}) = \lambda g_\lambda(x)$. Zatem g_λ jest wektorem własnym odpowiadającym wartości własnej λ . Stąd $\text{Spec}(\varphi) = \mathbb{R}$.

EIGENVECTOR

Uwaga 10.1.6. Każdy wektor własny odpowiada dokładnie jednej wartości własnej.

Dowód. Przypuśćmy, że dla danego endomorfizmu $\varphi \in \text{End}(V)$ istnieją $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ oraz $v \in V$, $v \neq \mathbf{0}_V$ takie, że $\varphi(v) = \lambda_1 v = \lambda_2 v$. Wówczas $\mathbf{0}_V = \varphi(v) - \varphi(v) = \lambda_1 v - \lambda_2 v =$




$(\lambda_1 - \lambda_2)v$. Ponieważ $v \neq \mathbf{0}_V$, zatem $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$, czyli $\lambda_1 = \lambda_2$. \square

z def.

Przykład 10.1.7. Niech $\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$, będzie rzutem prostokątnym na oś Ox . Rozważ zagadnienie własne dla operatora φ .

Zauważmy, że $\varphi(v) = \lambda v$, gdy $\varphi(v)$ ma ten sam kierunek co v . Zatem możliwe są dwie sytuacje:

- 1) $\lambda_1 = 1$, $\varphi(v) = v$, gdy $v \parallel Ox$, czyli $v = (v_x, 0)$
- 2) $\lambda_2 = 0$, $\varphi(v) = \mathbf{0}$, gdy $v \perp Ox$, czyli $v = (0, v_y)$



$\text{Spec}(\varphi) = \{0, 1\}$
 $\lambda_1 = 1 \sim [1, 0]$
 $\lambda_2 = 0 \sim [0, 1]$

link na stronie!
EIGENFACE

Zastosowanie

Cel: diagonalizacja macierzy endomorfizmu

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, wyznaczmy taką bazę przestrzeni liniowej V , że macierz endomorfizmu $\varphi \in \text{End}(V)$ w tejże bazie będzie diagonalna.

Taka baza nie zawsze istnieje. Będzie to baza złożona z wektorów własnych φ .

Na macierzach diagonalnych łatwo wykonywać działania mnożenia i potęgowania, co odpowiada składaniu i iterowaniu endomorfizmów.

Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią liniową. Niech $\varphi \in \text{End}(V)$ oraz $\lambda \in \text{Spec}(\varphi)$. Oznaczmy przez E_λ zbiór wszystkich wektorów własnych odpowiadających wartości własnej λ , uzupełniony o wektor zerowy. Zatem

EIGENSPACE $E_\lambda = \{v \in V : \varphi(v) = \lambda v\}$

$v \in E_\lambda \wedge v \neq \vec{0}$

$\Rightarrow v$ wektor własny

Twierdzenie 10.1.8. i) Zbiór E_λ jest podprzestrzenią liniową przestrzeni V .

ii) Zbiór E_λ jest podprzestrzenią φ -niezmienniczą.

$v \in E_\lambda \Rightarrow \varphi(v) \in E_\lambda$

iii) $E_\lambda = \text{Ker} \psi$, gdzie $\psi = \varphi - \lambda \cdot \text{id}_V$.

Dowód. i) Dla dowolnych $v, w \in E_\lambda$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mamy $\varphi(\alpha v + \beta w) = \alpha \varphi(v) + \beta \varphi(w) = \alpha \lambda v + \beta \lambda w = \lambda(\alpha v + \beta w)$, czyli $\alpha v + \beta w \in E_\lambda$.

ii) Na mocy i) jeśli $v \in E_\lambda$, to $\varphi(v) = \lambda v \in E_\lambda$.

iii) $\varphi(v) = \lambda v \Leftrightarrow \varphi(v) - \lambda v = \mathbf{0}_V \Leftrightarrow \varphi(v) - \lambda \cdot \text{id}_V(v) = \mathbf{0}_V \Leftrightarrow (\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V)(v) = \mathbf{0}_V$

\mathbb{R}^2
 $f(x,y) = (x,y)$
 id

Definicja 10.1.9. Przestrzeń wektorową E_λ nazywamy podprzestrzenią własną endomorfizmu φ , odpowiadającą wartości własnej λ .

Uwaga 10.1.10. Na mocy uwagi 10.1.6 otrzymujemy $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{\mathbf{0}_V\}$. Zatem zamiast badać endomorfizm $\varphi \in \text{End}(V)$, możemy badać jego restrykcje $\varphi|_{E_{\lambda_i}} \in \text{End}(E_{\lambda_i})$ na podprzestrzenie niezmiennicze E_{λ_i} , gdzie $\lambda_i \in \text{Spec}(\varphi)$.

uwaga w osobny

Twierdzenie 10.1.11. Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią liniową oraz niech $\varphi \in \text{End}(V)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Niech A będzie macierzą odwzorowania φ w dowolnej ustalonej bazie przestrzeni V . Wówczas następujące warunki są równoważne.

i) $\lambda \in \text{Spec}(\varphi)$

fzn - λ -wartość własna
 \downarrow istnieje

ii) $\text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V) \neq \{\mathbf{0}_V\}$

$v : \varphi(v) = \lambda v$
 $v \neq \vec{0}$

iii) $\det(A - \lambda I) = 0$

Wtedy i tylko wtedy gdy $\det(A - \lambda I) = 0$

Dowód. i) \Leftrightarrow ii) Jeśli $\lambda \in \text{Spec}(\varphi)$, to istnieje $v \in V$, $v \neq \mathbf{0}_V$ taki, że $\varphi(v) = \lambda v$, czyli $\mathbf{0}_V = \varphi(v) - \lambda v = (\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V)(v)$. Stąd $v \in \text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V)$. I odwrotnie, jeśli $\text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V) \neq \{\mathbf{0}_V\}$, to istnieje $v \in V$, $v \neq \mathbf{0}_V$ taki, że $(\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V)(v) = \mathbf{0}_V$, czyli $\varphi(v) = \lambda v$.

ii) \Leftrightarrow iii) Niech $v \in V$ oraz niech X oznacza kolumnę współrzędnych wektora v w ustalonej bazie przestrzeni V . Niech A będzie macierzą φ w tejże bazie. Wówczas $\varphi(v) = \lambda v \Leftrightarrow AX = \lambda X \Leftrightarrow AX - \lambda X = \mathbf{0}$. Układ jednorodny $(A - \lambda I)X = \mathbf{0}$ ma niezerowe rozwiązanie wtedy i tylko wtedy gdy $\det(A - \lambda I) = 0$. \square

$(\varphi - \lambda \cdot \text{id})(v) = \mathbf{0}_V$

$\text{Ker} \psi = ?$

$\varphi \sim A$

$\varphi - \lambda \cdot \text{id} = \mathbf{0} \sim A - \lambda \cdot I$
 $(A - \lambda I)X = \mathbf{0}$

Wniosek 10.1.12. Niech $\varphi \in \text{End}(V)$, $\lambda \in \text{Spec}(\varphi)$. Niech \mathcal{B} będzie bazą przestrzeni V oraz $A = M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{B})$. Wówczas wektor $\mathbf{0}_V \neq v \in V$, $v = [x_1, x_2, \dots, x_n]_{\mathcal{B}}$ jest wektorem własnym endomorfizmu φ , odpowiadającym wartości własnej λ wtedy i tylko wtedy, gdy

$\det(A - \lambda I) = 0 \iff \text{Spec}(\varphi) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$
 $\iff \det(A - \lambda I) = 0$
 $\iff (A - \lambda I)X = \mathbf{0}$, gdzie $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$.

Handwritten notes: X - rozwiązanie $\ker(\varphi)$, $\varphi(X) = \lambda X$, $(A - \lambda I)X = \mathbf{0}$.

Twierdzenie 10.1.13. Wartości własne endomorfizmu $\varphi \in \text{End}(V)$ nie zależą od wyboru bazy przestrzeni V .

Dowód. Niech $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ będą dwiema różnymi bazami przestrzeni V . Niech $A = M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{B})$, $A' = M_\varphi(\mathcal{B}', \mathcal{B}')$ oraz $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$. Na mocy twierdzenia 9.2.1 mamy $A' = P^{-1}AP$. Ponadto $\det(A' - \lambda I) = \det(P^{-1}AP - \lambda I) = \det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}IP) = \det(P^{-1}(A - \lambda I)P) = \det(P^{-1})\det(A - \lambda I)\det(P) = \det(A - \lambda I)$, bowiem $\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det P}$. \square

Definicja 10.1.14. Wielomianem charakterystycznym endomorfizmu $\varphi \in \text{End}(V)$ nazywamy wielomian $\chi_\varphi \in \mathbb{R}[t]$ postaci $\chi_\varphi(t) = \det(A - tI)$, gdzie A jest reprezentacją macierzową odwzorowania φ w pewnej bazie przestrzeni V . Równanie $\chi_\varphi(t) = 0$ nazywamy równaniem charakterystycznym tego endomorfizmu. Pierwiastki wielomianu χ_φ nazywamy pierwiastkami charakterystycznymi odwzorowania φ .

Uwaga 10.1.15. i) Rzeczywiste pierwiastki charakterystyczne wielomianu χ_φ to dokładnie wartości własne endomorfizmu φ .

ii) Na mocy twierdzenia 10.1.13 wielomian χ_φ nie zależy od wyboru bazy przestrzeni V .

iii) Jeśli $\dim V = n$, to wówczas $\deg \chi_\varphi = n$.

Niech $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Definicja 10.1.16. i) Wielomianem charakterystycznym macierzy A nazywamy wielomian $\chi_A \in \mathbb{R}[t]$ postaci $\chi_A(t) = \det(A - tI)$. Równanie $\chi_A(t) = 0$ nazywamy równaniem charakterystycznym macierzy A .

ii) Każdy rzeczywisty pierwiastek wielomianu χ_A nazywamy wartością własną macierzy A . Zbiór wszystkich wartości własnych macierzy A oznaczamy symbolem $\text{Spec}(A)$ i nazywamy widmem bądź spektrum tej macierzy.

iii) Każdy niezerowy wektor $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ spełniający równanie

$$AX = \lambda X, \quad \text{gdzie } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

nazywamy wektorem własnym macierzy A , odpowiadającym wartości własnej λ .

Uwaga 10.1.17. Wartości i wektory własne endomorfizmu $\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$ są identyczne z wartościami i wektorami własnymi macierzy $A \in M_n(\mathbb{R})$, będącej reprezentacją macierzową odwzorowania φ w bazie kanonicznej przestrzeni \mathbb{R}^n .

Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią liniową n -wymiarową. Niech $\varphi \in \text{End}(V)$ oraz $\lambda \in \text{Spec}(\varphi)$.

Definicja 10.1.18. i) Krotność k_λ liczby λ jako pierwiastka wielomianu charakterystycznego χ_φ nazywamy krotnością algebraiczną wartości własnej λ .

ii) Wymiar $\dim E_\lambda$ podprzestrzeni własnej E_λ nazywamy krotnością geometryczną wartości własnej λ .

iii) Wartości własne o krotności geometrycznej 1 nazywamy prostymi. Widmo składające się z n różnych (a zatem prostych) wartości własnych nazywamy widmem prostym.

Twierdzenie 10.1.19. Niech $\varphi \in \text{End}(V)$, $\lambda \in \text{Spec}(\varphi)$ oraz niech A będzie reprezentacją macierzową φ w pewnej bazie przestrzeni V . Wówczas

i) $1 \leq \dim E_\lambda \leq k_\lambda$, krotność geom. nie przekracza krotności alg. $E_\lambda = \text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot I)$

ii) $\dim E_\lambda = \dim V - \text{rank}(A - \lambda I)$.

Szkic dowodu. i) Jeśli $\lambda \in \text{Spec}(\varphi)$, to istnieje $v \in V$, $v \neq \mathbf{0}_V$ taki, że $v \in E_\lambda$, zatem $1 \leq \dim E_\lambda$. Rozumowanie uzasadniające, że $\dim E_\lambda \leq k_\lambda$ można znaleźć w [4].

ii) Ponieważ $E_\lambda = \text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V)$, zatem

$$\dim E_\lambda = \dim V - \dim \text{Im}(\varphi - \lambda \cdot \text{id}_V) = \dim V - \text{rank}(A - \lambda I). \quad \square$$

Przykład 10.1.20. Wyznacz wszystkie wartości własne endomorfizmu

$$\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}^3), \quad \varphi(x, y, z) = (x + 2y, 2y, -2x - 2y - z).$$

Określ ich krotności algebraiczne. Wyznacz odpowiadające im wektory własne, podprzestrzenie własne i wymiary tychże podprzestrzeni.

$$A = M_\varphi(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Ker } \varphi = \text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot \text{id})$$

$$\chi_A(t) = \chi_\varphi(t) = \det(A - tI) = \begin{vmatrix} 1-t & 2 & 0 \\ 0 & 2-t & 0 \\ -2 & -2 & -1-t \end{vmatrix} = (1-t)(2-t)(-1-t) = 0$$

$$\text{Spec}(\varphi) = \{\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1\}, \quad k_1 = k_2 = k_3 = 1 \text{ widmo proste}$$

$$E_{\lambda_3} = E_{-1} = ?$$

$$E_{\lambda_3} = \text{Ker}(\varphi - \lambda_3 I)$$

$$(A - \lambda_3 I)X = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow (A + I) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ 3y = 0 \\ -2x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = 0, z \in \mathbb{R}$$

$$(0, 0, z), \quad z \in \mathbb{R}$$

Handwritten notes:
 - krotność geom. nie przekracza krotności alg.
 - $E_\lambda = \text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot I)$ podprzestrzeń bo ją ma baza i wymiar $\dim E_\lambda = \dim V - \dim \text{Im} \varphi$
 - $\varphi = \varphi - \lambda \cdot \text{id}$
 - $\text{Ker } \varphi = E_\lambda$
 - $\dim \text{Im} \varphi = n - \dim E_\lambda = n - \dim \text{Ker}(\varphi - \lambda I)$
 - $\mathbb{B}_k^3 = \{\hat{e}_1 = (1, 0, 0), \hat{e}_2 = (0, 1, 0), \hat{e}_3 = (0, 0, 1)\}$
 - $\varphi(\hat{e}_1) = \varphi(1, 0, 0) = (1, 0, -2)$
 - $t \cdot I = \begin{bmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \end{bmatrix}$
 - $t = -1$ (uwaga: nieoznaczoność w tym to)

$$(0, 0, z) = z \cdot (0, 0, 1)$$

I jawnie wyliniowej bazę E_{λ_3}

Wektory własne odpowiadające $\lambda_3 = -1$ są postaci $v = (0, 0, z)$, gdzie $z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$E_{-1} = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\} = \text{lin}\{(0, 0, 1)\} \quad \text{oraz} \quad \dim E_{-1} = 1$$

Alternatywnie, korzystając z twierdzenia 10.1.19 ii), możemy obliczyć

$$\dim E_{-1} = \dim \mathbb{R}^3 - r(A + I) = 3 - r \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} = 3 - 2 = 1.$$

Tak naprawdę, wiemy to z góry, bowiem na mocy twierdzenia 10.1.19 i) mamy $1 \leq \dim E_{\lambda_3} \leq k_3 = 1$, zatem $\dim E_{\lambda_3} = 1$.

Analogicznie wyznaczamy E_{λ_1} oraz E_{λ_2} . Z góry wiemy, że $\dim E_{\lambda_1} = \dim E_{\lambda_2} = 1$

! bo wektor własny z definicji macierzy

tw. 10.1.19 b)

tw. a)

10.2 Diagonalizacja

Twierdzenie 10.2.1. Wektory własne operatora liniowego $\varphi \in \text{End}(V)$ odpowiadające różnym wartościom własnym są liniowo niezależne.

Bez dowodu. Dowód można znaleźć w [4].

Twierdzenie 10.2.2. Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią liniową n -wymiarową oraz niech $\varphi \in \text{End}(V)$.

i) Jeśli φ ma widmo proste $\text{Spec}(\varphi) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, to wektory własne v_1, \dots, v_n , gdzie v_i odpowiada λ_i , dla $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, tworzą bazę przestrzeni V .

ii) Jeśli wektory własne $v_1, \dots, v_n \in V$ endomorfizmu φ (nie koniecznie odpowiadające różnym wartościom własnym) tworzą bazę przestrzeni V oraz $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$, dla $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, to macierz przekształcenia φ w tejże bazie ma postać diagonalną

$$\varphi(v_1) = \lambda_1 \cdot v_1 = \lambda_1 v_1 + 0 v_2 + \dots + 0 v_n$$

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots\}$
 $\varphi: V \rightarrow V$ baza z wekt. v_i
 $\varphi(v_i) \in V$
 $[\dots]_{\mathcal{B}}$

iii) Jeśli wielomian charakterystyczny χ_φ rozkłada się na czynniki liniowe

$$\chi_\varphi = (t - \lambda_1)^{k_1} (t - \lambda_2)^{k_2} \dots (t - \lambda_p)^{k_p},$$

(tzn. $\lambda_i \neq \lambda_j$, gdy $i \neq j$ oraz $k_1 + k_2 + \dots + k_p = n$) i ponadto $k_i = \dim E_{\lambda_i}$, dla $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, to wówczas istnieje baza przestrzeni V złożona z wektorów własnych endomorfizmu φ .

ker alg. = ker geom

Dowód. i) Wynika z twierdzenia 10.2.1.

ii) Jeśli $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ jest bazą oraz $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$, to wówczas $\varphi(v_1) = \lambda_1 v_1 = [\lambda_1, 0, 0, \dots, 0]_{\mathcal{B}}$, $\varphi(v_2) = \lambda_2 v_2 = [0, \lambda_2, 0, \dots, 0]_{\mathcal{B}}$, \dots , $\varphi(v_n) = \lambda_n v_n = [0, 0, \dots, 0, \lambda_n]_{\mathcal{B}}$

! tw. spektralne

skąd $D = M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{B})$.

iii) Równość $k_i = \dim E_{\lambda_i}$ oznacza, że jeśli λ_i jest k_i -krotnym pierwiastkiem wielomianu χ_φ , to istnieje k_i liniowo niezależnych wektorów własnych odpowiadających λ_i . Z kolei fakt, że χ_φ rozkłada się na iloczyn czynników liniowych, implikuje równość $\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_p} = n = \dim V$. \square

Definicja 10.2.3. Operator liniowy $\varphi \in \text{End}(V)$ nazywamy *diagonalizowalnym*, gdy istnieje taka baza przestrzeni V , że macierz operatora φ w tejże bazie jest macierzą diagonalną.

Wniosek 10.2.4. Operator liniowy $\varphi \in \text{End}(V)$ jest diagonalizowalny wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje baza przestrzeni V złożona z wektorów własnych φ .

Macierz diagonalizująca

Definicja 10.2.5. Macierz $A \in M_n(\mathbb{R})$ nazywamy macierzą *diagonalizowalną*, gdy istnieje macierz nieosobliwa $P \in M_n(\mathbb{R})$ taka, że macierz $P^{-1}AP$ jest diagonalna. Mówimy wówczas, że macierz P diagonalizuje macierz A .

Wniosek 10.2.6. Macierz $A \in M_n(\mathbb{R})$ jest diagonalizowalna wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje baza przestrzeni \mathbb{R}^n złożona z wektorów własnych A .

Dowód. Niech \mathcal{B} będzie pewną bazą przestrzeni V oraz niech $A = M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{B})$, dla pewnego $\varphi \in \text{End}(V)$. Załóżmy, że istnieje baza \mathcal{B}' przestrzeni V , złożona z wektorów własnych φ . Oznaczmy $A' = M_\varphi(\mathcal{B}', \mathcal{B}')$. Wówczas $A' = D = P^{-1}AP$, gdzie $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$. \square

Z uwagi na związek między widmem endomorfizmu a widmem macierzy wszystkie twierdzenia udowodnione dla endomorfizmu są prawdziwe dla macierzy.

Przykład 10.2.7. Czy $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ jest diagonalizowalna?

$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} 2-t & -3 \\ 1 & 1-t \end{vmatrix} = (2-t)(1-t) + 3 = t^2 - 3t + 5 \neq 0.$

Wielomian charakterystyczny nie posiada pierwiastków rzeczywistych, zatem $\text{Spec}(A) = \emptyset$ i macierz rzeczywista A nie jest diagonalizowalna.

Przykład 10.2.8. Czy $\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ taki, że $\varphi(1, 1, 1) = (-1, -1, -1)$, $\varphi(0, 1, 1) = (0, 1, 1)$, $\varphi(0, 0, 1) = (0, 0, 2)$ jest diagonalizowalny?

Odczytujemy wartości własne i wektory własne
 $\lambda_1 = -1, v_1 = (1, 1, 1)$, $\lambda_2 = 1, v_2 = (0, 1, 1)$, $\lambda_3 = 2, v_3 = (0, 0, 1)$.

Widmo jest proste, a zatem na mocy twierdzenia 10.2.2 i), operator φ jest diagonalizowalny.

Przykład 10.2.9. Czy $\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ dany wzorem
 $\varphi(x, y, z) = (3x + 8z, 3x - y + 6z, -2x - 5z)$ jest diagonalizowalny?

$A' = P^{-1}AP$

$A' = D$
diagon.

$D = P^{-1}AP$

$\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$
 $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ liniowe
 $A = M_\varphi(\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_2)$
 $\mathcal{B}_2 = \{v_i, w_j\}$
 $\varphi(v) = \lambda \cdot v$
 $\text{Spec}(\varphi) = \{-1, 1, 2\}$
 (określenie dwójki i zmiennic)

$\text{Ker} \varphi = \text{Ker}(\varphi - t \cdot I)$
 $(t - I)x = 0$

$\Delta < 0$
 wartości własne to bezprowiadki char.

które są zwrócone $K = \mathbb{R}$
 $\mathcal{B}_2 = \{v_i, w_j\}$
 $= \{(1,0), (0,1)\}$
 \rightarrow rozr.

tylko od poprzedni
 taki / nie ?

baza kanonowa
 $B_k^3 = (i, j, k)$

$\varphi(i)$ $\varphi(j)$ $\varphi(k)$

$\varphi(i) = \varphi(1, 0, 0) = (3, 3, -2)$

$A = M_\varphi(B_k^3, B_k^3) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

$\det(A-tI) = \begin{vmatrix} 3-t & 0 & 8 \\ 3 & -1-t & 6 \\ -2 & 0 & -5-t \end{vmatrix} = (-1-t)(-1)^4 \begin{vmatrix} 3-t & 8 \\ -2 & -5-t \end{vmatrix} =$

$= -(1+t)(1+2t+t^2) = -(1+t)^3$
 $Spec(\varphi) = \{\lambda_1 = -1\}, k_1 = 3$

Wykonujemy w stosunku do wyznacznika

$\ker(\varphi - tI)$

$(A - tI)X = 0$

$\det(A - tI) = 0$
 ulży - nicorn.
 są niezerowe rowki

$E_{\lambda_1} = E_{-1} = \{v = (x, y, z) : (A + I) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\}$

$\dim E_{-1} = 3 - r(A + I) = 3 - r \begin{bmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 3 & 0 & 6 \\ -2 & 0 & -4 \end{bmatrix} = 3 - 2 = 1 \neq k_1 = 3$

Endomorfizm φ nie jest diagonalizowalny, bowiem nie istnieje baza \mathbb{R}^3 złożona z wektorów własnych φ .

Wniosek 10.2.10. Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią liniową n -wymiarową oraz niech $\varphi \in \text{End}(V)$. Niech B będzie ustaloną bazą przestrzeni V . Jeśli wektory własne v_1, \dots, v_n odpowiadające wartościom własnym $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (niekoniecznie różnym), tworzą bazę $C = (v_1, \dots, v_n)$ przestrzeni V , to wówczas dla dowolnego $r \in \mathbb{N}$

$M_{\varphi^r}(B, B) = PD^rP^{-1}$, gdzie $P = P_{B \rightarrow C}$, $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$

$\varphi^r = \varphi \circ \dots \circ \varphi$

$A^r = A \cdot \dots \cdot A$

$\dim E_{\lambda_i} = k_i$

$D = P^{-1}AP$

Dowód. Niech $A = M_\varphi(B, B)$, $D = M_\varphi(C, C)$ oraz $P = P_{B \rightarrow C}$. Wówczas $A^r = M_{\varphi^r}(B, B)$ oraz $D^r = M_{\varphi^r}(C, C)$. Ponadto $D = P^{-1}AP$, skąd $A = PDP^{-1}$ oraz $A^r = (PDP^{-1})^r = \underbrace{(PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1})}_{r\text{-razy}} = PD \underbrace{(P^{-1}P)}_I D \dots \underbrace{(PP^{-1})}_I DP^{-1} = PD^rP^{-1}$ \square

$D^r = \begin{bmatrix} \lambda_1^r & & \\ & \lambda_2^r & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^r \end{bmatrix}$

Przykład 10.2.11. Wyznacz wszystkie wartości własne endomorfizmu φ i określ ich krotności algebraiczne. Wyznacz odpowiadające im wektory własne, podprzestrzenie własne i wymiar tychże podprzestrzeni. Czy φ jest diagonalizowalny? Jeśli tak, podaj bazę wektorów własnych, macierz D endomorfizmu φ w tejże bazie oraz macierz diagonalizującą P . Oblicz $\varphi^{101}(1, 2, 3)$.

$\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(x, y, z) = (4x - 2y + 2z, 2x + 2z, y + z - x)$

$A = M_\varphi(B_k^3, B_k^3) = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} 4-t & -2 & 2 \\ 2 & -t & 2 \\ -1 & 1 & 1-t \end{vmatrix} \stackrel{w_2+2w_3}{=} \begin{vmatrix} 4-t & -2 & 2 \\ 0 & 2-t & 4-2t \\ -1 & 1 & 1-t \end{vmatrix} \stackrel{k_3+k_2}{=} \begin{vmatrix} 4-t & -2 & 0 \\ 0 & 2-t & 6-3t \\ -1 & 1 & 2-t \end{vmatrix} \stackrel{k_2+k_1}{=}$

rozsaż D nie!

$$\begin{vmatrix} 4-t & 2-t & 0 \\ 0 & 2-t & 6-3t \\ -1 & 0 & 2-t \end{vmatrix} = (4-t)(2-t)^2 - 3(2-t)^2 = (2-t)^2(1-t)$$

$\text{Spec } \varphi = \{\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2\}$, $k_1 = 1, k_2 = 2$, $\dim E_1 = 1, 1 \leq \dim E_2 \leq 2$
 φ będzie diagonalizowalny, jeśli $\dim E_2 = 2 = k_2$.

$$\dim E_2 = 3 - r(A - 2I) = 3 - r \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 3 - 1 = 2,$$

zatem φ jest diagonalizowalny.

Wyznamy bazę złożoną z wektorów własnych. Rozważmy $\lambda_1 = 1$.

$$(A - I) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{w_2 - 3w_1 \\ w_3 - 2w_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = -2z, z \in \mathbb{R}$$

$$E_1 = \{(-2z, -2z, z) : z \in \mathbb{R}\} = \text{lin}\{(-2, -2, 1)\}$$

Rozważmy $\lambda_2 = 2$.

$$(A - 2I) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-x + y - z = 0 \Rightarrow z = y - x, x, y \in \mathbb{R}$$

$$E_2 = \{(x, y, y - x) : x, y \in \mathbb{R}\} = \text{lin}\{(1, 0, -1), (0, 1, 1)\}$$

Baza wektorów własnych $\mathcal{C} = (v_1 = (-2, -2, 1), v_2 = (1, 0, -1), v_3 = (0, 1, 1))$

$$D = M_\varphi(\mathcal{C}, \mathcal{C}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ macierz diagonalizująca } P := P_{\mathcal{B}_k^3 \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Obliczymy $\varphi^{101}(1, 2, 3)$ na dwa różne sposoby.

METODA I: Wykorzystamy macierz D . Niech $v := (1, 2, 3) = [a, b, c]_{\mathcal{C}}$.

$$\text{Wówczas } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, \text{ skąd } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Obliczamy } P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ oraz } v = [2, 5, 6]_{\mathcal{C}}.$$

$$D^{101} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{101} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{101} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \cdot 2^{101} \\ 6 \cdot 2^{101} \end{bmatrix}$$

$$\varphi^{101}(v) = [2, 5 \cdot 2^{101}, 6 \cdot 2^{101}]_{\mathcal{C}} = 2v_1 + 5 \cdot 2^{101}v_2 + 6 \cdot 2^{101}v_3 =$$

$$= (-4 + 5 \cdot 2^{101}, -4 - 6 \cdot 2^{101}, 2 + 2^{101})$$

dobary wekt. w. s. u.

$$A^{101} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$(1, 2, 3) = [e_1, p_1, \delta]_{\mathcal{C}}$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x' = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}_{\mathcal{C}}$$

$$P x' = x \quad \frac{dx}{x'} = P^{-1} x$$

METODA II: Obliczamy

$$A^{101} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = P D^{101} P^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{101} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{101} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 3 \cdot 2^{101} - 2 & 2 - 2^{102} & 2^{102} - 2 \\ 2^{102} - 2 & 2 - 2^{101} & 2^{102} - 2 \\ 1 - 2^{101} & -1 + 2^{101} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 + 5 \cdot 2^{101} \\ -4 - 6 \cdot 2^{101} \\ 2 + 2^{101} \end{bmatrix}$$

Przykład 10.2.12. Wyznacz wszystkie wartości własne endomorfizmu f i określ ich krotności algebraiczne. Wyznacz odpowiadające im podprzestrzenie własne i wymiar tychże podprzestrzeni. Czy f jest diagonalizowalny? Jeśli tak, podaj bazę wektorów własnych, macierz D endomorfizmu f w tejże bazie oraz macierz diagonalizującą P .

$$f \in \text{End}(M_2(\mathbb{R})), \quad f(A) = A + A^T$$

$$f: (M_2, \mathcal{B}) \rightarrow (M_2, \mathcal{B})$$

$$\mathcal{B} = \left(E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ baza } M_2(\mathbb{R})$$

$$f(E_{11}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow [2, 0, 0, 0]_{\mathcal{B}}$$

$$f(E_{12}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = [0, 1, 1, 0]_{\mathcal{B}}$$

$$f(E_{21}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f(E_{22}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = M_f(\mathcal{B}, \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2-t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-t & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1-t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-t \end{bmatrix}$$

$$\chi_f(t) = \det(A - tI) = (2-t) \begin{vmatrix} 1-t & 1 & 0 \\ 1 & 1-t & 0 \\ 0 & 0 & 2-t \end{vmatrix} = (2-t)^2 \begin{vmatrix} 1-t & 1 \\ 1 & 1-t \end{vmatrix} = (2-t)^2((1-t)^2 - 1) = (2-t)^2(t^2 - 2t) = -t(2-t)^3$$

$$\text{Spec}(f) = \{\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2\}, \quad k_1 = 1, k_2 = 3, \dim E_0 = 1, 1 \leq \dim E_2 \leq 3$$

$$E_{\lambda_1} = E_0 = \text{Ker}(f) = \{B \in M_2(\mathbb{R}) : B + B^T = O\}$$

$$\text{Niech } B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \text{ gdzie } a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

$$B + B^T = O \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2a = 0 \\ b + c = 0 \\ 2d = 0 \end{cases}$$

$$\text{Zatem } B = \begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{bmatrix} \text{ oraz } E_0 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\} = \text{lin} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$E_{\lambda_2} = E_2 = \text{Ker}(f - 2 \cdot \text{id}_{M_2(\mathbb{R})}) = \{B \in M_2(\mathbb{R}) : B + B^T = 2B\}$$

$1 \leq \dim E_2 \leq k_2$
 $\dim E_0 \leq k_1 = 1$
 kr. geom kr. alg
 wektor własny
 odpow. $\lambda_1 = 0$
 baza $E_0 = E_{\lambda_1}$

$(A - 0 \cdot I)X = 0$
 $AX = 0$

$(A - 2 \cdot I)X = 0$

$\lambda_1 = 0$
 $\text{Ker } \varphi = \text{Ker}(\varphi - 0 \cdot \text{id}) = \text{Ker } \varphi$
 $\exists F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \varphi(F) = 0 \cdot F$
 tw 10.2.2. (diagonalizacja)

$A - tI$

$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = [a, b, c, d]_B, O_{2 \times 2} = [0, 0, 0, 0]_B$ $t = 2$

$(A - 2I) \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = O \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow b = c, a, b, d \in \mathbb{R}$

$-b + c = 0$
 $b - c = 0$

$E_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ b \\ d \end{bmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R} \right\} = \text{lin} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

lin. niezależne $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
baza E_2

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ są liniowo niezależne $\Rightarrow \dim E_2 = 3$

Baza wektorów własnych $C = \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$

$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, P_{B \rightarrow C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\dim E_2 = k_2$
 A diagonalizowalne

$M_{\varphi}(e, c)$

$\varphi(v) = \lambda \cdot v$
 $\varphi \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 2 \cdot c_2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}_C$

macierz diagonalizująca

żeby zapisać D

$A' = Q^{-1} A P$ $P = Q$
 $A' = P^{-1} A P$
 $D = P^{-1} A P$ $A' = D$

wobec tego musimy znać P !

(c_2, c_3, c_4, c_1)
 $\varphi(c_2) = 2 \cdot c_2$
 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

*BEZ WICZEN!
dla kursu analizy!*

*forma liniowa $(v_i + k_{i,j}) \rightarrow k_{i,j}$
 $(k_i + k_i)$*

TEMAT: *Formy kwadratowe*

11.1 Definicja formy kwadratowej

Przypomnienie: Każdą macierz kwadratową D można przedstawić w postaci sumy macierzy symetrycznej i antysymetrycznej $D = B + C$, gdzie $B = \frac{1}{2}(D + D^T)$, $C = \frac{1}{2}(D - D^T)$, $B = B^T$, $C = -C^T$.

$B = B^T$ - symetria wzg. przekątnej

Obserwacja: $X^T D X = X^T B X$

Istotnie $X^T D X = X^T (B + C) X = X^T B X + X^T C X$ oraz

$X^T C X = X^T \frac{D - D^T}{2} X = \frac{1}{2} (X^T D X - X^T D^T X) = \frac{1}{2} (X^T D X - (X^T D^T X)^T) = \frac{1}{2} (X^T D X - X^T D X) = 0$

Niech $A \in M_n(\mathbb{R})$ będzie macierzą symetryczną, tzn. $A = A^T$.

Na mocy powyższej obserwacji możemy przyjąć to założenie bez straty dla ogólności.

Definicja 11.1.1. Funkcję $\gamma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ daną wzorem $\gamma(x) = X^T A X$, gdzie $X =$

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

dla dowolnego $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, nazywamy *formą kwadratową*. Macierz

symetryczną A nazywamy *macierzą formy kwadratowej* γ .

Uwaga 11.1.2. i) Jeśli $A = [a_{ij}]$, to wówczas $\gamma(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$.

ii) γ jest wielomianem n zmiennych jednorodnym stopnia 2.

iii) $\forall x \in \mathbb{R}^n \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \gamma(\lambda x) = \lambda^2 \gamma(x)$

Dowód. i) $[x_1 \dots x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1 \dots x_n] \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n \end{bmatrix} =$

$a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{nn}x_n^2$

ii) Na mocy i) każdy jednomian γ jest stopnia 2.

iii) Niech $x = (x_1, \dots, x_n)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Wówczas na mocy i) mamy $\gamma(\lambda x) = \gamma(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(\lambda x_i)(\lambda x_j) = \lambda^2 \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$. \square

*Np. $g(x,y) = x^2 + 6xy + y^2$
jednorodny st. 2*

*Np. $f(x,y,z) = z^3 + 4x^3y^5 + 7x - 10$
 $\deg f = 7$*

$g(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x)^2 + 6(\lambda x)(\lambda y) + (\lambda y)^2 = \lambda^2 x^2 + \lambda^2 \cdot 6xy + \lambda^2 y^2 = \lambda^2 \cdot g(x,y)$

Przykład 11.1.3. Poniższe odwzorowania to formy kwadratowe.

i) $\gamma : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \gamma(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 + x_3^2$ Spr.

$$\gamma(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & \frac{3}{2} & 2 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Spr. $\gamma(x_1, x_2, x_3) = [x_1 \ x_2 \ x_3] \begin{bmatrix} 2x_1 + \frac{3}{2}x_2 + 2x_3 \\ \frac{3}{2}x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_3 \end{bmatrix}$

ii) Niech $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ będzie obszarem, zaś $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dowolną funkcją taką, że $f \in C^2(\Omega)$.
Niech $P_0 \in \Omega$. Różniczka rzędu drugiego funkcji f w punkcie P_0

$$d_{P_0}^2 f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad d_{P_0}^2 f(h_1, \dots, h_n) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(P_0) h_i h_j$$

jest formą kwadratową. Jej macierz ma postać

$$H_f(P_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(P_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(P_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(P_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(P_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(P_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(P_0) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(P_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(P_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(P_0) \end{bmatrix}$$

Jest to tak zwana *macierz Hessego*. Jej wyznacznik nazywamy *hesjanem*.

11.2 Określoność formy kwadratowej

Dla dowolnej formy kwadratowej γ mamy $\gamma(\mathbf{0}) = 0$.

Definicja 11.2.1. Formę kwadratową $\gamma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \gamma(x) = X^T A X$ nazywamy

- i) *dodatnio określoną*, gdy $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad \gamma(x) > 0$,
- ii) *ujemnie określoną*, gdy $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad \gamma(x) < 0$,
- iii) *dodatnio półokreśloną*, gdy $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \gamma(x) \geq 0$, $\exists x \neq 0, \gamma(x) = 0$
- iv) *ujemnie półokreśloną*, gdy $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \gamma(x) \leq 0$,
- v) *nieokreśloną*, jeśli przyjmuje wartości zarówno dodatnie jak i ujemne.

Terminologia ta przenosi się na macierze. Macierz symetryczna A jest dodatnio określona, gdy forma kwadratowa $\gamma(x) = X^T A X$ jest dodatnio określona itd.

Przykład 11.2.2. i) $\gamma : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \gamma(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ jest dodatnio określona

ii) $\gamma : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \gamma(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 4x_2^2 - x_3^2$ jest ujemnie określona

ANALIZA!
Funkcje
wielu
zmiennych

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $f''_{xx} \quad f''_{xy}$
 $f''_{yx} \quad f''_{yy}$

macierz
symetryczna

$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$
 $f(x,y) = 6xy + \cos x$
 $\frac{\partial f}{\partial x} = 6y - \sin x$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = 6x$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $f'(x)$
 $dx f = f'(x_0) dx$
 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $\frac{\partial g}{\partial x} \quad \frac{\partial g}{\partial y}$

$g_0 = (x_0, y_0)$
 $d_{P_0} g(h) = \frac{\partial g}{\partial x}(g_0) h_1 + \frac{\partial g}{\partial y}(g_0) h_2$
 $dx \quad dy$
 $\frac{\partial g}{\partial x} \quad \frac{\partial g}{\partial y}$
 $h_1 \quad h_2$
 $d(dg) = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(P_0) h_1^2 + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(P_0) 2h_1 h_2 + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(P_0) h_2^2$

$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \quad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$
 $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$
98
 $m=2$

forma kwadratowa ← wielomian jednorodny stopnia 2 zmiennych h_1, h_2 $+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ $(z_0) h_1, h_2$ $+\frac{\partial^2 g(z_0)}{\partial y^2} h_2$

iii) $\gamma : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \gamma(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + x_3^2$ jest nieokreślona, bowiem $\gamma(1, 0, 1) = 2 > 0$, zaś $\gamma(0, 1, 0) = -1 < 0$.

iv) $\gamma : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \gamma(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_3^2$ jest dodatnio półokreślona. $\forall x_2 \in \mathbb{R} \gamma(0, x_2, 0) = 0$ ale $\gamma(x_1, x_2, x_3) = 0 \nRightarrow (x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$

Badanie określoności formy kwadratowej

Definicja 11.2.3. Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. ← macierz kwadratowa $n \times n$

i) Minorem głównym stopnia k macierzy A nazywamy wyznacznik dowolnej macierzy powstałej przez skreślenie $n - k$ wierszy i kolumn o tych samych indeksach.

ii) Minorem wiodącym (głównym) stopnia k macierzy A nazywamy wyznacznik macierzy powstałej przez skreślenie $n - k$ ostatnich wierszy i kolumn. Oznaczamy go symbolem Δ_k . ← tenozdaje samych indeksa

Symbolem $D_{i_1 \dots i_k}$ oznaczamy minor główny stopnia k , powstały przez skreślenie wierszy i kolumn poza tymi o indeksach $i_1 < \dots < i_k$.

Oznaczenie ma patrzeć w tym samym

Przykład 11.2.4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \\ -5 & -6 & -7 & -8 \end{bmatrix}$ $\Delta_1 = \det A$

minory wiodące główne: $\Delta_1 = D_{11} = 1, \Delta_2 = D_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -4,$

$\Delta_3 = D_{123} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ -1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 0, \Delta_4 = D_{1234} = \det A = 0$

minory główne: $D_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -5 & -8 \end{vmatrix} = 12, D_{24} = \begin{vmatrix} 6 & 8 \\ -6 & -8 \end{vmatrix} = 0$

Sie różni w_2, w_3, w_4

zostawiam w_1, w_4 k_1, k_4

Twierdzenie 11.2.5 (Kryterium Sylwestera). Niech $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ będzie macierzą symetryczną.

i) A jest dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy jej minory wiodące główne są dodatnie, tzn. $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\} \Delta_k > 0$.

ii) A jest ujemnie określona wtedy i tylko wtedy, gdy jej minory wiodące główne parzystego stopnia są dodatnie, a nieparzystego ujemne, tzn. $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\} (-1)^k \Delta_k > 0$.

Bez dowodu.

$\Delta_1 < 0 \Delta_2 > 0 \Delta_3 < 0 \Delta_4 > 0 \dots$
- + - + - +

ANALIZA "H" macierzy Hessego
minimum lokalne
maksimum lokalne

Przykład 11.2.6. i) $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ jest ujemnie określona.

$$\Delta_1 = -2 < 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 > 0, \quad \Delta_3 = \det A = -3 < 0.$$

ii) $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ jest półokreślona ujemnie, gdyż $\gamma(x_1, x_2) = -x_2^2 \leq 0$.

Uwaga 11.2.7. Z warunku $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\} \Delta_k \geq 0$ nie wynika dodatnia półokreśloność A .

Twierdzenie 11.2.8. Niech $\gamma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \gamma(x) = X^T A X$, gdzie $A = A^T$.

i) Forma kwadratowa γ jest dodatnio półokreślona wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie minory główne macierzy A są nieujemne,

$$\text{tzn. } \forall 1 \leq k \leq n \quad \forall 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n \quad D_{i_1 \dots i_k} \geq 0.$$

ii) Forma kwadratowa γ jest ujemnie półokreślona wtedy i tylko wtedy, gdy minory główne macierzy A przyjmują następujące znaki

$$\forall 1 \leq k \leq n \quad \forall 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n \quad (-1)^k D_{i_1 \dots i_k} \geq 0.$$

Bez dowodu.

Przykład 11.2.9. Forma kwadratowa $\gamma : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \gamma(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_3^2 + 2x_1x_3$ jest dodatnio półokreślona.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = \Delta_3 = 0,$$

$$D_2 = 0, \quad D_3 = 1, \quad D_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad D_{23} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Oczywiste bowiem $\gamma(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3)^2 \geq 0$.

Uwaga 11.2.10. i) Jeśli $\Delta_2 = D_{12} < 0$, to macierz jest nieokreślona.

ii) Rzeczywista macierz symetryczna $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ ma n rzeczywistych wartości własnych (licząc z krotnościami).

Dowód. i) $\Delta_2 = D_{12}$ to minor stopnia 2. Jeśli $D_{12} = (-1)^2 D_{12} < 0$, to na mocy kryterium Sylwestera, macierz nie jest dodatnio określona ani ujemnie określona. Na mocy twierdzenia 11.2.8 nie jest półokreślona dodatnio ani półokreślona ujemnie.

ii) Dowód można znaleźć w [4]. \square

POZNIJ

Twierdzenie 11.2.11 (Kryterium wartości własnych). Niech $\gamma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\gamma(x) = X^T A X$, gdzie $A = A^T$ oraz niech $Spec(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. Wówczas forma kwadratowa γ jest

- i) dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \lambda_i > 0$,
- ii) ujemnie określona wtedy i tylko wtedy, gdy $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \lambda_i < 0$,
- iii) dodatnio półokreślona wtedy i tylko wtedy, gdy $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \lambda_i \geq 0$,
- iv) ujemnie półokreślona wtedy i tylko wtedy, gdy $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \lambda_i \leq 0$,
- iv) nieokreślona wtedy i tylko wtedy, gdy $\exists i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \lambda_i > 0 \wedge \lambda_j < 0$.

znak λ
decyduje
o znaku
 $\gamma(v)$

Dowód. Niech $\lambda \in Spec(A)$ oraz niech v będzie wektorem własnym odpowiadającym λ . Oczywiście $v \neq \mathbf{0}_V$, więc $|v| \neq 0$. Obliczamy $v^T A v = \gamma(v) = v^T \lambda v = \lambda v^T v = \lambda |v|^2$. Zatem $\lambda(v) > 0 \Leftrightarrow \lambda > 0$, co dowodzi podpunktu i). Analogicznie w pozostałych przypadkach. \square

Przykład 11.2.12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ jest dodatnio półokreślona.

$\mu(x, y, z) \quad \mu(p_0) = A$

$\Delta_1 = 1 > 0 \quad \Delta_2 = 0 \quad \Delta_3 = 0$

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & 0 & 1 \\ 0 & -t & 0 \\ 1 & 0 & 1-t \end{vmatrix} = -t(1-t)^2 + t = t(1 - (1-t)^2) = t(2t - t^2) = t^2(2-t)$$

$$Spec(A) = \{\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 2\}$$


nieokreślona
lub
półokreślona

$\forall \eta : \lambda \geq 0$

półokreślona dodatnio

nie można wnioskować ze braku ekstremum

zbadac inaczej!



TEMAT: *Przestrzenie euklidesowe*

12.1 Iloczyn skalarny i norma

Niech $V = (V, +, \mathbb{R}, \cdot)$ będzie rzeczywistą przestrzenią liniową.

Definicja 12.1.1. Funkcję $s : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ nazywamy *iloczynem skalarnym*, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

i) $\forall u, v, w \in V \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad s(\alpha u + \beta v, w) = \alpha s(u, w) + \beta s(v, w)$,
liniowość na lewej zmiennej

ii) $\forall u, v \in V \quad s(u, v) = s(v, u)$, *symetryczność*

iii) $\forall v \in V \quad s(v, v) \geq 0 \quad \wedge \quad s(v, v) = 0 \Leftrightarrow v = \mathbf{0}_V$. *niezależność liniowa*

Parę (V, s) nazywamy wówczas *przestrzenią euklidesową*. Bywa ona oznaczana symbolem E . Zamiast $s(u, v)$ będziemy również pisać $u \circ v$ lub $\langle u, v \rangle$.

Przykład 12.1.2. Poniższe funkcje są iloczynami skalarnymi.


1) *Standardowym iloczynem skalarnym w \mathbb{R}^n* nazywamy $\circ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ taką, że $\forall u = (x_1, \dots, x_n), v = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n \quad u \circ v = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$. Przestrzeń euklidesową (\mathbb{R}^n, \circ) oznaczamy symbolem \mathbb{E}^n .

2) $V = C([a, b], \mathbb{R}), \quad \langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall f, g \in V \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$


Całka oznaczona ma własność liniowości. Ponadto $\int_a^b f^2(x)dx \geq 0$, bowiem $f^2(x) \geq 0$ i całka oznaczona zachowuje nierówność słabą.

3) $V = \mathbb{R}_n[x], \quad \langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}_n[x] \times \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R},$
 $\forall p, q \in V \quad \langle p, q \rangle = \sum_{i=0}^n p(x_i)q(x_i)$, gdzie $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ liczby ustalone


Rozważmy $\mathbb{R}_2[x]$ z iloczynem skalarnym $\langle p, q \rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$. Wówczas $\langle p, p \rangle = [p(-1)]^2 + [p(0)]^2 + [p(1)]^2 \geq 0$. Jeśli $\langle p, p \rangle = 0$, to oczywiście $p(-1) = p(0) = p(1) = 0$. Nie oznacza to jeszcze, że p jest wielomianem zerowym.



$\|i\| = 1$
 $\|j\| = 1$
 $\|k\| = 1$



$\langle u/v, v \rangle$
 $(u/v, v)$
 (u, v)



$(u_1, u_2, u_3) \circ (v_1, v_2, v_3)$
 $= u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$

$\vec{u} \circ \vec{u} = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = |\vec{u}|^2$

Niech $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. Załóżmy, że $\langle p, p \rangle = 0$. Wówczas $p(x_0) = p(x_1) =$

$$\dots = p(x_n) = 0, \text{ skąd otrzymujemy } \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Wyznacznik główny W tego układu, to *wyznacznik Vandermonde'a*.

$W = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \neq 0$, bowiem $x_i \neq x_j$ dla $i \neq j$. Zatem jest to układ oznaczony jednorodny, jego jedynym rozwiązaniem jest $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$, co oznacza, że p jest wielomianem zerowym.

4) $V = M_{m \times n}(\mathbb{R}), \langle \cdot, \cdot \rangle : M_{m \times n}(\mathbb{R}) \times M_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R},$

$\forall A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \quad \langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^T)$

ślad (suma elem. na przekątnej)

$\text{tr}(A+B) = \text{tr}A + \text{tr}B$

Na mocy twierdzenia 3.1.13, mówiącego o własnościach śladu macierzy, można wywnioskować, że jest to iloczyn skalarny.

$\text{tr}(\alpha A) = \alpha \cdot \text{tr}(A)$

Twierdzenie 12.1.3. Niech (V, s) będzie przestrzenią euklidesową. Wówczas

i) $\forall u, v, w \in V \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad s(u, \alpha v + \beta w) = \alpha s(u, v) + \beta s(u, w),$

ii) $\forall v \in V \quad s(v, \mathbf{0}_V) = 0,$

iii) $\forall u, v \in V \quad (s(u, v))^2 \leq s(u, u) \cdot s(v, v)$ *nierówność Schwarz'a*

lin. 120m
 $s(\alpha u_1 + \beta u_2, v) \stackrel{\text{sym}}{=} s(v, \alpha u_1 + \beta u_2)$
 $\alpha s(u_1, v) + \beta s(u_2, v)$
 $\alpha \cdot s(v, u_1) + \beta s(v, u_2)$

Dowód. i) $s(u, \alpha v + \beta w) = s(\alpha v + \beta w, u) = \alpha s(v, u) + \beta s(w, u) = \alpha s(u, v) + \beta s(u, w)$

ii) Dla dowolnego $\alpha \in \mathbb{R}$ mamy $s(v, \mathbf{0}_V) = s(v, \alpha \mathbf{0}_V) = \alpha s(v, \mathbf{0}_V)$. Stąd $s(v, \mathbf{0}_V) = 0$.

iii) Załóżmy, że $v \neq \mathbf{0}_V$. Dla dowolnego $\alpha \in \mathbb{R}$ mamy $s(u - \alpha v, u - \alpha v) \geq 0$. Równoważnie

$s(u, u) - 2\alpha s(u, v) + \alpha^2 s(v, v) \geq 0$. Biorąc $\alpha = \frac{s(u, v)}{s(v, v)}$, otrzymujemy $s(u, u) - 2 \frac{[s(u, v)]^2}{s(v, v)} + \frac{[s(u, v)]^2}{s(v, v)} \geq 0$. Stąd $s(u, u) + s(v, v) \geq [s(u, v)]^2$. \square

Niech $V = (V, +, \mathbb{R}, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową.


Definicja 12.1.4. Funkcję $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ nazywamy *normą*, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

i) $\forall v \in V \quad \|v\| \geq 0 \quad \wedge \quad \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \mathbf{0}_V,$


ii) $\forall v \in V \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|,$

iii) $\forall u, v \in V \quad \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ *tzw. warunek trójkąta*

$\|2\vec{v}\| = 2 \cdot \|\vec{v}\|$



Liczbę $\|v\| \geq 0$ nazywamy *normą (lub długością) wektora v*. Parę $(V, \|\cdot\|)$ nazywamy *przestrzenią unormowaną*.



$\mathbb{R}^3 \quad \vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$
 $\vec{u} \cdot \vec{u} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = |\vec{u}|$
 $|\vec{v}| = \sqrt{v \cdot v}$

Twierdzenie 12.1.5. Jeśli (V, s) jest przestrzenią euklidesową, to odwzorowanie $\|\cdot\|_s : V \rightarrow \mathbb{R}$ dane wzorem

$$\forall v \in V \quad \|v\|_s = \sqrt{s(v, v)}$$

jest normą w przestrzeni V . Mówimy, że jest to norma określona przez iloczyn skalarny.

Dowód. Ponieważ dla dowolnego $v \in V$ mamy $s(v, v) \geq 0$ oraz $s(v, v) = 0 \Leftrightarrow v = \mathbf{0}_V$, zatem $\|v\|_s = \sqrt{s(v, v)} \geq 0$ oraz $\|v\|_s = 0 \Leftrightarrow v = \mathbf{0}_V$. Dla dowolnego $\alpha \in \mathbb{R}$ mamy $\|\alpha v\|_s = \sqrt{s(\alpha v, \alpha v)} = \sqrt{\alpha^2 s(v, v)} = |\alpha| \sqrt{s(v, v)} = |\alpha| \cdot \|v\|_s$. Ponadto na mocy nierówności Schwarz'a $\|u + v\|_s^2 = s(u + v, u + v) = s(u, u) + 2s(u, v) + s(v, v) = \|u\|_s^2 + 2s(u, v) + \|v\|_s^2 \leq \|u\|_s^2 + 2\sqrt{s(u, u)}\sqrt{s(v, v)} + \|v\|_s^2 = (\|u\|_s + \|v\|_s)^2$, skąd otrzymujemy nierówność trójkąta. \square

Przykład 12.1.6. Rozważmy przestrzeń \mathbb{E}^n , tj. \mathbb{R}^n ze standardowym iloczynem skalarnym. Dla $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ mamy $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$. Jest to tzw. norma euklidesowa w \mathbb{R}^n .

Wniosek 12.1.7. Każda przestrzeń euklidesowa jest przestrzenią unormowaną.

12.2 Układy ortogonalne

Jeśli nie wyszczególniono inaczej, zawsze w danej przestrzeni euklidesowej rozpatrujemy normę pochodzącą od ustalonego iloczynu skalarnego.

Niech $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową. Wektor $v \in V$, którego długość jest równa 1 nazywamy unormowanym lub wersorem. Każdy wektor $v \in V, v \neq \mathbf{0}_V$ można unormować, tj. znaleźć wersor \hat{v} o tym samym zwrocie i kierunku co v .

Istotnie $\hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$ jest wersorem, bowiem $\|\hat{v}\| = \left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \left| \frac{1}{\|v\|} \right| \cdot \|v\| = \frac{1}{\|v\|} \cdot \|v\| = 1$.

Miara kąta między wektorami

W przestrzeni euklidesowej można wprowadzić pojęcie kąta między niezerowymi wektorami. Na mocy nierówności Schwarz'a dla dowolnych $u, v \in V$ mamy

$$|\langle u, v \rangle| \leq \sqrt{\langle u, u \rangle} \sqrt{\langle v, v \rangle} = \|u\| \cdot \|v\| \Rightarrow \frac{|\langle u, v \rangle|}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1.$$

Jeśli $v \neq \mathbf{0}_V, u \neq \mathbf{0}_V$, możemy widzieć $\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$ jako cosinus jednoznacznie określonego kąta $\alpha \in [0, \pi]$. Definiujemy kąt między wektorami u i v jako α . Utożsamiamy tutaj kąt z jego miarą. Zatem

$$\cos \angle(u, v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}, \quad \angle(u, v) = \arccos \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}.$$

Przyjmujemy, że kąt pomiędzy wektorem zerowym $\mathbf{0}_V$ a innym wektorem jest nieokreślony.

można w \mathbb{R} \rightarrow norma (długość) wektora $\rightarrow \frac{|\langle u, v \rangle|}{\|u\| \cdot \|v\|}$ \rightarrow $|\langle u, v \rangle|$

tw. 12.1.3
 (iii)

Przykład 12.2.1. Rozważmy przestrzeń euklidesową $(\mathbb{R}_1[x], \langle \cdot, \cdot \rangle)$, gdzie $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1)$. Wyznamy miarę kąta pomiędzy wektorami $u(x) = 2$, $v(x) = 5 - x$.

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= u(0)v(0) + u(1)v(1) = 2 \cdot 5 + 2 \cdot 4 = 18 \\ \|u\| &= \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{[u(0)]^2 + [u(1)]^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \\ \|v\| &= \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{[v(0)]^2 + [v(1)]^2} = \sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41} \\ \angle(u, v) &= \arccos \frac{18}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{41}} = \arccos \frac{9}{\sqrt{82}} \end{aligned}$$

$u \perp v$
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Definicja 12.2.2. i) Dwa wektory u, v nazywamy ortogonalnymi, jeśli ich iloczyn skalarny jest równy zero. Piszemy wówczas $u \perp v$.

ii) Układ wektorów $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ nazywamy układem ortogonalnym, jeżeli

$$\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad i \neq j \Rightarrow \langle v_i, v_j \rangle = 0.$$

ii) Układ wektorów nazywamy układem ortonormalnym, jeśli jest układem ortogonalnym i każdy wektor jest unormowany, czyli

wersory

$$\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 0 & ; \quad i \neq j \\ 1 & ; \quad i = j \end{cases}$$

$\|v_i\| = \|v_i\|^2$

Uwaga 12.2.3. Wektor zerowy 0_V jest ortogonalny do każdego wektora.

Przykład 12.2.4. Rozważmy przestrzeń euklidesową $(\mathcal{C}([- \pi, \pi], \mathbb{R}), \langle \cdot, \cdot \rangle)$, gdzie $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$. Sprawdźmy, czy wektory $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ są ortogonalne/ortonormalne.

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x dx = \left[-\frac{1}{4} \cos 2x \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{4}(-1 - (-1)) = 0 \\ \langle f, f \rangle &= \|f\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x \right]_{-\pi}^{\pi} = \pi \end{aligned}$$

Wektory są ortogonalne, ale nie ortonormalne.

Analiza 11) scem. szereg Fouriera

$\int_{-\pi}^{\pi} f$

Twierdzenie 12.2.5 (Pitagorasa). Niech V będzie przestrzenią euklidesową. Wówczas

$$\forall u, v \in V \quad u \perp v \Leftrightarrow \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Dowód. $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \stackrel{\langle u, v \rangle = 0}{=} \|u\|^2 + \|v\|^2 \quad \square$

$(u+v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$

Twierdzenie 12.2.6. Układ ortogonalny nie zawierający wektora zerowego jest liniowo niezależny.

Dowód. Załóżmy, że $\{v_1, \dots, v_k\}$ jest układem ortogonalnym oraz $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$, dla pewnych $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$. Dla dowolnego $j \in \{1, \dots, k\}$ mamy $0 = \langle 0_V, v_j \rangle = \langle \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i, v_j \rangle = \sum_{i=1}^k \alpha_i \langle v_i, v_j \rangle = \alpha_j \langle v_j, v_j \rangle = \alpha_j \|v_j\|^2$. Ponieważ $v_j \neq 0_V$, zatem $\|v_j\| \neq 0$ i stąd $\alpha_j = 0$. Jest to prawdą dla dowolnego j , zatem $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$ i układ jest liniowo niezależny. \square

Wniosek 12.2.7. i) Układ ortonormalny jest liniowo niezależny.

ii) W n -wymiarowej przestrzeni euklidesowej układ ortonormalny (lub układ ortogonalny nie zawierający wektora zerowego) nie może zawierać więcej niż n wektorów.

Definicja 12.2.8. Bazę przestrzeni euklidesowej, która jest układem ortogonalnym (ortonormalnym), nazywamy *bazą ortogonalną (ortonormalną)* tej przestrzeni.

Przykład 12.2.9. W przestrzeni \mathbb{R}^n ze standardowym iloczynem skalarnym bazą ortogonalną jest baza kanoniczna $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$.

\mathbb{R}^3 (u*ł*o*z*enie)
ortonormalna


Współrzędne wektora w bazie ortogonalnej

MOTYWACJA: Przestrzeń \mathbb{E}^3

baza ortogonalna $\mathcal{B}_k^3 = (\hat{i} = (1, 0, 0), \hat{j} = (0, 1, 0), \hat{k} = (0, 0, 1))$

Dla dowolnego wektora $v = (v_x, v_y, v_z)$ mamy $v_x = v \circ \hat{i}, v_y = v \circ \hat{j}, v_z = v \circ \hat{k}$.

Z dokładnością do znaku skalary v_x, v_y, v_z to długości rzutów ortogonalnych wektora v na osie Ox, Oy, Oz odpowiednio, zaś wektory $v_x \cdot \hat{i}, v_y \cdot \hat{j}, v_z \cdot \hat{k}$, to rzuty ortogonalne wektora v na osie Ox, Oy, Oz odpowiednio.



Twierdzenie 12.2.10. Niech $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ będzie bazą ortogonalną przestrzeni euklidesowej $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Niech $v \in V, v = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]_{\mathcal{B}}$. Wówczas

$v = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \dots + \alpha_n b_n \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \alpha_i = \frac{\langle v, b_i \rangle}{\|b_i\|^2}$

$\langle v, b_1 \rangle = \langle \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n, b_1 \rangle = \alpha_1 \langle b_1, b_1 \rangle + \dots = \alpha_1 \|b_1\|^2$

Ponadto $\langle v, b_1 \rangle = \langle \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n, b_1 \rangle = \alpha_1 \langle b_1, b_1 \rangle + \dots = \alpha_1 \|b_1\|^2$

$\forall u, w \in V \quad \langle u, w \rangle = \frac{\langle u, b_1 \rangle \langle w, b_1 \rangle}{\|b_1\|^2} + \frac{\langle u, b_2 \rangle \langle w, b_2 \rangle}{\|b_2\|^2} + \dots + \frac{\langle u, b_n \rangle \langle w, b_n \rangle}{\|b_n\|^2}$

$v \circ \hat{i} = v_x$
 $v \circ \hat{j} = v_y$
 $v \circ \hat{k} = v_z$

Dowód. Ponieważ $v = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \dots + \alpha_n b_n$, zatem $\langle v, b_1 \rangle = \langle \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \dots + \alpha_n b_n, b_1 \rangle = \alpha_1 \langle b_1, b_1 \rangle + \alpha_2 \langle b_2, b_1 \rangle + \dots + \alpha_n \langle b_n, b_1 \rangle = \alpha_1 \|b_1\|^2$. Stąd $\alpha_1 = \frac{\langle v, b_1 \rangle}{\|b_1\|^2}$. Analogiczne rachunki przeprowadzamy dla $\alpha_2, \dots, \alpha_n$.

Jeśli $v = \sum_{i=1}^n \frac{\langle v, b_i \rangle}{\|b_i\|^2} b_i, w = \sum_{j=1}^n \frac{\langle w, b_j \rangle}{\|b_j\|^2} b_j$, to wówczas $\langle v, w \rangle = \langle \sum_{i=1}^n \frac{\langle v, b_i \rangle}{\|b_i\|^2} b_i, \sum_{j=1}^n \frac{\langle w, b_j \rangle}{\|b_j\|^2} b_j \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\|b_i\|^2 \|b_j\|^2} \langle v, b_i \rangle \langle w, b_j \rangle \langle b_i, b_j \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\|b_i\|^4} \langle v, b_i \rangle \langle w, b_i \rangle \|b_i\|^2 = \sum_{i=1}^n \frac{\langle v, b_i \rangle \langle w, b_i \rangle}{\|b_i\|^2} \quad \square$

Wniosek 12.2.11. Jeśli $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ jest bazą ortonormalną przestrzeni euklidesowej $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ oraz $V \ni v = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]_{\mathcal{B}}$, to wówczas

$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \alpha_i = \frac{\langle v, b_i \rangle}{\|b_i\|}$

oraz

$\forall u, w \in V \quad \langle u, w \rangle = \langle u, b_1 \rangle \langle w, b_1 \rangle + \langle u, b_2 \rangle \langle w, b_2 \rangle + \dots + \langle u, b_n \rangle \langle w, b_n \rangle.$

Dowód. Wystarczy w twierdzeniu 12.2.10 przyjąć $\|b_i\| = 1$. \square

Wniosek 12.2.12. Niech $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ będzie bazą przestrzeni euklidesowej $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ oraz niech $v, w \in V$, $v = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]_{\mathcal{B}}$, $w = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]_{\mathcal{B}}$. Wówczas baza \mathcal{B} jest ortonormalna wtedy i tylko wtedy gdy $\langle v, w \rangle = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \dots + \alpha_n\beta_n$.

Dowód. Zauważmy, że $\langle v, w \rangle = \langle \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i, \sum_{j=1}^n \beta_j b_j \rangle = \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \beta_j \langle b_i, b_j \rangle$ równa się $\sum_i \alpha_i \beta_i$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\langle b_i, b_j \rangle = \begin{cases} 0 & ; i \neq j \\ 1 & ; i = j \end{cases}$. \square

$$\langle b_i, b_i \rangle = 1$$

$$\alpha_i \beta_i$$

$$i \neq j$$

$$\langle b_i, b_j \rangle = 0$$

$$\alpha_i \beta_j = 0$$

TEMAT: *Przestrzenie euklidesowe - ciąg dalszy*

13.1 Metody ortogonalizacji

$$\text{lin}\{b_1, \dots, b_m\} = U \subset V$$

Twierdzenie 13.1.1. Niech $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową. Niech $\{b_1, \dots, b_m\} \subset V$ będzie układem wektorów liniowo niezależnych. Wówczas istnieje układ ortogonalny $\{c_1, \dots, c_m\} \subset V$ taki, że $\text{lin}\{b_1, \dots, b_m\} = \text{lin}\{c_1, \dots, c_m\}$.

Bez dowodu. Metoda dowodowa jest analogiczna do tej przedstawionej w przykładzie 13.1.3 poniżej.

Wniosek 13.1.2. i) Każda skończenie wymiarowa przestrzeń euklidesowa różna od $\{0\}$ ma bazę ortogonalną i ortonormalną.

ii) W przestrzeni euklidesowej skończenie wymiarowej każdy układ ortonormalny można uzupełnić do bazy ortonormalnej.

Dowód. i) Na mocy twierdzenia 7.2.23 i) skończenie wymiarowa przestrzeń wektorowa różna od $\{0\}$ ma bazę. Na mocy twierdzenia 13.1.1, bazę tę można zortogonalizować. Ponadto możemy unormować wektory otrzymanej bazy ortogonalnej.

ii) Na mocy wniosku 12.2.7 układ ortonormalny jest liniowo niezależny. Na mocy twierdzenia 7.2.23 iii) układ liniowo niezależny może być uzupełniony do bazy. \square

Metoda ortogonalizacji Grama-Schmidta

Przykład 13.1.3. Rozważmy przestrzeń \mathbb{E}^3 , tj. \mathbb{R}^3 ze standardowym iloczynem skalarnym. Dana jest baza $\mathcal{B} = (b_1 = (1, -2, 0), b_2 = (5, 5, 1), b_3 = (5, 4, 4))$ przestrzeni \mathbb{R}^3 . Dokonamy ortogonalizacji bazy \mathcal{B} .

$$1 \cdot 5 + (-2) \cdot 5 + 0 \cdot 1$$

Zauważmy, że baza \mathcal{B} nie jest ortogonalna, bowiem $b_1 \circ b_2 = 5 - 10 + 0 = -5 \neq 0$.

Niech $\mathcal{C} = (c_1, c_2, c_3)$ oznacza poszukiwaną bazę ortogonalną.

I KROK: Niech $c_1 := b_1 = (1, -2, 0)$. Wówczas oczywiście $\text{lin}\{c_1\} = \text{lin}\{b_1\}$.


II KROK: Aby zagwarantować, że $\text{lin}\{c_1, c_2\} = \text{lin}\{b_1, b_2\}$, poszukujemy c_2 w postaci $c_2 = b_2 + \alpha c_1$, dla pewnego $\alpha \in \mathbb{R}$. Dobierzemy α w taki sposób, by $c_2 \circ c_1 = 0$.

Obliczamy $c_2 \circ c_1 = (b_2 + \alpha c_1) \circ c_1 = b_2 \circ c_1 + \alpha \cdot (c_2 \circ c_1)$.

$c_2 = ?$
 $\alpha = ?$

$c_2 \in \text{lin}\{b_1, b_2\}$
 \parallel
 c_1

c_2 - kom. liniowa
 $c_1 \vee b_2$



WNIOSEK PONIŻEJ

Aby $c_2 \circ c_1 = 0$, wystarczy przyjąć $\alpha = -\frac{b_2 \circ c_1}{c_1 \circ c_1}$.

W naszym przykładzie $0 = b_2 \circ c_1 + \alpha \cdot (c_2 \circ c_1) = (5, 5, 1) \circ (1, -2, 0) + \alpha \cdot (1, -2, 0) \circ (1, -2, 0) = -5 + 5\alpha$, skąd $\alpha = 1$. Zatem $c_2 = b_2 + c_1 = (6, 3, 1)$.

III KROK: Aby zagwarantować, że $\text{lin}\{c_1, c_2, c_3\} = \text{lin}\{b_1, b_2, b_3\}$, poszukujemy c_3 w postaci $c_3 = b_3 + \beta_1 c_1 + \beta_2 c_2$, dla pewnych $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$. Dobierzemy β_1, β_2 w taki sposób, by $c_3 \circ c_1 = 0$ oraz $c_3 \circ c_2 = 0$.

Mamy $0 = c_3 \circ c_1 = (b_3 + \beta_1 c_1 + \beta_2 c_2) \circ c_1 = b_3 \circ c_1 + \beta_1 (c_1 \circ c_1) + \beta_2 (c_2 \circ c_1) = b_3 \circ c_1 + \beta_1 \|c_1\|^2$, skąd $\beta_1 = -\frac{b_3 \circ c_1}{\|c_1\|^2}$. Analogicznie $0 = c_3 \circ c_2 = (b_3 + \beta_1 c_1 + \beta_2 c_2) \circ c_2 = b_3 \circ c_2 + \beta_1 (c_1 \circ c_2) + \beta_2 (c_2 \circ c_2) = b_3 \circ c_2 + \beta_2 \|c_2\|^2$, skąd $\beta_2 = -\frac{b_3 \circ c_2}{\|c_2\|^2}$.

W naszym przykładzie $\begin{cases} 0 = b_3 \circ c_1 + \beta_1 \|c_1\|^2 = (5, 4, 4) \circ (1, -2, 0) + \beta_1(1 + 4 + 0) = -3 + 5\beta_1 = 0 \\ 0 = b_3 \circ c_2 + \beta_2 \|c_2\|^2 = (5, 4, 4) \circ (6, 3, 1) + \beta_2(36 + 9 + 1) = 46 + 46\beta_2 = 0 \end{cases}$

Skąd $\beta_1 = \frac{3}{5}, \beta_2 = -1$.

Zatem $c_3 = b_3 + \frac{3}{5}c_1 - c_2 = (5, 4, 4) + \frac{3}{5}(1, -2, 0) - (6, 3, 1) = (-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 3)$.

$\mathcal{C} = (c_1 = (1, -2, 0), c_2 = (6, 3, 1), c_3 = (-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 3))$ jest bazą ortogonalną.

Ponieważ $\|c_1\| = \sqrt{5}, \|c_2\| = \sqrt{46}, \|c_3\| = \sqrt{\frac{46}{5}}$, zatem bazą ortonormalną jest

$$\mathcal{C}' = (c'_1 = \frac{c_1}{\|c_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot (1, -2, 0), c'_2 = \frac{c_2}{\|c_2\|} = \frac{1}{\sqrt{46}} \cdot (6, 3, 1), c'_3 = \frac{c_3}{\|c_3\|} = \sqrt{\frac{5}{46}} \cdot (-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 3))$$

Wniosek 13.1.4. Jeśli $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ jest dowolną bazą przestrzeni euklidesowej $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, to wówczas ciąg wektorów $\mathcal{C} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, zdefiniowany poniżej, jest bazą ortogonalną tej przestrzeni.

$$c_1 := b_1 \quad c_2 := b_2 - \frac{\langle b_2, c_1 \rangle}{\|c_1\|^2} c_1 \quad c_3 := b_3 - \frac{\langle b_3, c_1 \rangle}{\|c_1\|^2} c_1 - \frac{\langle b_3, c_2 \rangle}{\|c_2\|^2} c_2 \quad \dots \quad c_n := b_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\langle b_n, c_i \rangle}{\|c_i\|^2} c_i$$

Przykład 13.1.5. Rozważmy przestrzeń $\mathbb{R}_2[x]$ z iloczynem skalarnym $\langle p, q \rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$. Dokonamy ortogonalizacji bazy $\mathcal{B} = (1, x, x^2)$.

Niech $b_1 = 1, b_2 = x, b_3 = x^2$. Zauważmy, że baza \mathcal{B} nie jest ortogonalna, bowiem $b_1 \circ b_3 = 1 \cdot (-1)^2 + 1 \cdot 0^2 + 1 \cdot 1^2 = 2 \neq 0$.

Niech $\mathcal{C} = (c_1, c_2, c_3)$ oznacza poszukiwaną bazę ortogonalną.

I KROK: Niech $c_1 := b_1 = 1$.

II KROK: Poszukujemy $c_2 = b_2 + \alpha c_1, \alpha \in \mathbb{R}$. Dobierzemy α tak, by $c_2 \circ c_1 = 0$.

Obliczamy $0 = c_2 \circ c_1 = (b_2 + \alpha c_1) \circ c_1 = b_2 \circ c_1 + \alpha (c_1 \circ c_1) = (-1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) + \alpha(1 + 1 + 1) = 3\alpha$.

Skąd $\alpha = 0$. Zatem $c_2 = b_2 = x$. (Mogliśmy to zauważyć wcześniej.)

$b_3 \perp b_1$

$$\text{lin}(b_1, b_2) = \text{lin}(c_1, c_2) = \text{lin}(b_1, c_2)$$

$b_2 \perp c_1$ $c_1 \circ c_1$
 $\times \quad \perp \quad \perp \quad \perp$

$b_1 \perp b_2$
 $c_1 \perp c_2$

$$c_3 \in \text{lin}(c_1, c_2, b_3) \implies \text{lin}(b_1, b_2, b_3) = \text{lin}(c_1, c_2, c_3)$$

III KROK: Poszukujemy c_3 w postaci $c_3 = b_3 + \beta_1 c_1 + \beta_2 c_2$, $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$. Dobierzmy β_1, β_2 tak, by $c_3 \circ c_1 = 0$ oraz $c_3 \circ c_2 = 0$.

Mamy $0 = c_3 \circ c_1 = (b_3 + \beta_1 c_1 + \beta_2 c_2) \circ c_1 = b_3 \circ c_1 + \beta_1 (c_1 \circ c_1) + \beta_2 (c_2 \circ c_1) = b_3 \circ c_1 + \beta_1 \|c_1\|^2 = (1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) + \beta_1 \cdot 3$, skąd $\beta_1 = -\frac{2}{3}$.

Analogicznie $0 = c_3 \circ c_2 = (b_3 + \beta_1 c_1 + \beta_2 c_2) \circ c_2 = b_3 \circ c_2 + \beta_1 (c_1 \circ c_2) + \beta_2 (c_2 \circ c_2) = b_3 \circ c_2 + \beta_2 \|c_2\|^2 = (1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1) + \beta_2 \cdot ((-1)^2 + 0^2 + 1^2) = 2\beta_2$, skąd $\beta_2 = 0$.

Zatem $c_3 = b_3 - \frac{2}{3}c_1 = x^2 - \frac{2}{3}$.

$C = (c_1 = 1, c_2 = x, c_3 = x^2 - \frac{2}{3})$ jest bazą ortogonalną.

$$\|c_1\| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}, \|c_2\| = \sqrt{1+0+1} = \sqrt{2}, \|c_3\| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

Bazą ortonormalną jest układ wektorów

$$C' = \left(c'_1 = \frac{c_1}{\|c_1\|} = \frac{\sqrt{3}}{3}, c'_2 = \frac{c_2}{\|c_2\|} = \frac{\sqrt{2}}{2}x, c'_3 = \frac{c_3}{\|c_3\|} = \frac{\sqrt{6}}{2}(x^2 - \frac{2}{3}) = \frac{\sqrt{6}}{2}x^2 - \frac{\sqrt{6}}{3} \right).$$

$m \times m$ $m \times m$
 $A A^T$
 kwadratowa
 $m \times m$

Macierzowa metoda ortogonalizacji

Twierdzenie 13.1.6. Niech u_1, \dots, u_m będą wektorami liniowo niezależnymi w przestrzeni \mathbb{E}^n . Niech $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ będzie macierzą, której kolejnymi wierszami są współrzędne wektorów u_1, \dots, u_m w bazie kanonicznej przestrzeni \mathbb{R}^n . Wówczas stosując operacje elementarne na wierszach (bez zmiany kolejności!) macierzy blokowej $[AA^T | A]$, można doprowadzić ją do postaci $[G | A']$, gdzie $G \in M_m(\mathbb{R})$ jest macierzą trójkątną górną. Wektory wierszowe tak otrzymanej macierzy $A' \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ są ortogonalne w \mathbb{E}^n .

Bez dowodu. Dowód można znaleźć w [4].

$$[AA^T | A] \rightarrow [G | A']$$

Przykład 13.1.7. Stosując metodę macierzową, zortogonalizujemy układ wektorów $b_1 = (1, -2, 0)$, $b_2 = (5, 5, 1)$, $b_3 = (5, 4, 4)$ w przestrzeni \mathbb{E}^3 .

Układ ten jest liniowo niezależny, bowiem $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 5 & 5 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 46 \neq 0$.

Układ ten nie jest ortogonalny, bowiem $b_1 \circ b_2 = 5 - 10 + 0 = -5 \neq 0$.

$$A \cdot A^T = \begin{bmatrix} 5 & -5 & -3 \\ -5 & 51 & 49 \\ -3 & 49 & 57 \end{bmatrix}$$

$$[A \cdot A^T | A] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & -5 & -3 & -1 & 2 & 0 \\ -5 & 51 & 49 & 5 & 5 & 1 \\ -3 & 49 & 57 & 5 & 4 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow[w_3 + \frac{3}{5}w_1]{w_2 + w_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & -5 & -3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 46 & 46 & 6 & 3 & 1 \\ 0 & 46 & \frac{276}{5} & \frac{28}{5} & \frac{14}{5} & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{w_3 - w_2}$$

Układ ortogonalny $c_1 = (1, -2, 0)$, $c_2 = (6, 3, 1)$, $c_3 = (-\frac{2}{5}, -\frac{4}{5}, 3)$.

Jeśli nie używaliśmy operacji $\alpha \cdot w_i$, to na przekątnej macierzy G otrzymujemy $\|c_1\|^2, \|c_2\|^2, \|c_3\|^2$.


Zatem $\|c_1\| = \sqrt{5}, \|c_2\| = \sqrt{46}, \|c_3\| = \sqrt{\frac{46}{5}}$.

tutaj
wynik

13.2 Rzut ortogonalny na podprzestrzeń


Niech $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową, zaś $S \subset V$ dowolnym podzbiorem.

Definicja 13.2.1. Zbiór $S^\perp := \{v \in V : \forall x \in S \langle v, x \rangle = 0\}$ nazywamy dopełnieniem ortogonalnym zbioru S w przestrzeni euklidesowej V . Jeżeli zbiór S jest jednoelementowy tj. $S = \{x\}$, to zbiór S^\perp nazywamy dopełnieniem ortogonalnym wektora $x \in V$.



Twierdzenie 13.2.2. Niech V będzie przestrzenią euklidesową.

- Jeśli $U \subset V$ jest podprzestrzenią liniową przestrzeni V , to wówczas U^\perp również jest podprzestrzenią liniową.
- Dla dowolnego wektora $u \in V$ zbiór $\{u\}^\perp$ jest podprzestrzenią liniową przestrzeni V .



Dowód. i) Niech $x, y \in U^\perp$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Wówczas dla dowolnego $w \in U$ mamy $\langle \alpha x + \beta y, w \rangle = \alpha \langle x, w \rangle + \beta \langle y, w \rangle = 0$. Zatem $\alpha x + \beta y \in U^\perp$.
 ii) Niech $x, y \in \{u\}^\perp$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Wówczas $\langle \alpha x + \beta y, u \rangle = \alpha \langle x, u \rangle + \beta \langle y, u \rangle = 0$. Zatem $\alpha x + \beta y \in \{u\}^\perp$. \square

Przykład 13.2.3. W przestrzeni \mathbb{E}^4 wyznaczmy wszystkie wektory v ortogonalne do $u = (1, 0, 1, 0)$.

Niech $v = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. Wówczas $u \perp v \Leftrightarrow u \circ v = 0 \Leftrightarrow x + z = 0$. Zatem $v = (x, y, -x, t)$ oraz $\{u\}^\perp = \{(x, y, -x, t) : x, y, t \in \mathbb{R}\} = \text{lin}\{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$.

Definicja 13.2.4. Niech U będzie podprzestrzenią liniową przestrzeni V . Jeśli $w \in U^\perp$, to mówimy, że wektor w jest ortogonalny do podprzestrzeni U i piszemy $w \perp U$.

Uwaga 13.2.5. Niech U będzie podprzestrzenią liniową przestrzeni V , zaś $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_k\}$ bazą tej podprzestrzeni. Wówczas dla dowolnego wektora $w \in V$

$$w \perp U \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, k\} \quad w \perp b_i$$

Dowód. Implikacja z lewa na prawo jest oczywista. Ponadto jeśli dla dowolnego $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ mamy $\langle w, b_i \rangle = 0$, to wówczas dla dowolnego $u \in U, u = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]_{\mathcal{B}}$ mamy $\langle w, u \rangle = \alpha_1 \langle w, b_1 \rangle + \dots + \alpha_n \langle w, b_n \rangle = 0$. Zatem $w \perp U$. \square

Przykład 13.2.6. Rozważmy $V = \mathbb{R}_2[x]$ z iloczynem skalarnym $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx$, podprzestrzeń $U = \mathbb{R}_1[x]$ oraz $w = 6x^2 - 6x + 1$. Czy $w \perp U$?

$$w \perp U = \mathbb{R}_1[x] = \text{lin}\{1, x\} \Leftrightarrow \boxed{w \perp 1 \wedge w \perp x}$$

$$\langle w, 1 \rangle = \int_0^1 (6x^2 - 6x + 1)dx = 2x^3 - 3x^2 + x \Big|_0^1 = 0$$

$$\langle w, x \rangle = \int_0^1 (6x^3 - 6x^2 + x)dx = \frac{3}{2}x^4 - 2x^3 + \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 = 0 \quad \text{Zatem } w \perp U.$$

$w \notin U$
 $w \in U^\perp$


Własności dopełnienia ortogonalnego

Twierdzenie 13.2.7. Niech V będzie przestrzenią euklidesową, zaś U, U_1, U_2 jej podprzestrzeniami liniowymi. Wówczas:

i) $U_1 \subset U_2 \Rightarrow U_2^\perp \subset U_1^\perp$, *odwrotna inkluzja*

ii) $U^\perp = (\text{lin}U)^\perp$,

iii) $U \subset (U^\perp)^\perp$. *" = " skłamy miarowe*



Dowód. i) $x \in U_2^\perp \Leftrightarrow \forall y \in U_2 \ x \perp y \stackrel{U_1 \subset U_2}{\Rightarrow} \forall y \in U_1 \ x \perp y \Leftrightarrow x \in U_1^\perp$

ii) Wynika z uwagi 13.2.5.

iii) Niech $u \in U$. Wówczas $\langle u, x \rangle = 0$ dla dowolnego $x \in U^\perp$. Stąd $u \perp x$ dla dowolnego $x \in U^\perp$, czyli $x \in (U^\perp)^\perp$. \square

Niech V będzie przestrzenią euklidesową, zaś U jej podprzestrzenią liniową.


Definicja 13.2.8. Operator liniowy $\pi \in \text{End}(V)$ dany wzorem

$$\forall v \in V \ \pi(v) = u, \quad \text{gdzie } \underbrace{v - u}_{w \in U} \perp U,$$

π *proj.*

nazywamy rzutowaniem ortogonalnym lub projekcją ortogonalną na podprzestrzeń U .

Obraz wektora v poprzez π nazywamy rzutem ortogonalnym wektora $v \in V$ na podprzestrzeń U .



Twierdzenie 13.2.9 (Jednoznaczność rzutu ortogonalnego). Jeśli $\dim U < \infty$, to wówczas dla dowolnego $v \in V$ istnieje jednoznacznie wyznaczony rzt ortogonalny $u \in U$ tego wektora na podprzestrzeń U .

i) Jeśli $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_k)$ jest dowolną bazą podprzestrzeni U , wówczas $u = \pi(v) = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k]_{\mathcal{B}}$, gdzie *macierz Grama*

$$\begin{bmatrix} \langle b_1, b_1 \rangle & \langle b_1, b_2 \rangle & \dots & \langle b_1, b_k \rangle \\ \langle b_2, b_1 \rangle & \langle b_2, b_2 \rangle & \dots & \langle b_2, b_k \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle b_k, b_1 \rangle & \langle b_k, b_2 \rangle & \dots & \langle b_k, b_k \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle v, b_1 \rangle \\ \langle v, b_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle v, b_k \rangle \end{bmatrix}. \quad (1)$$

ii) Jeśli $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_k)$ jest bazą ortogonalną, wówczas rzt ten określony jest wzorem

$$u = \pi(v) = \frac{\langle v, b_1 \rangle}{\|b_1\|^2} b_1 + \frac{\langle v, b_2 \rangle}{\|b_2\|^2} b_2 + \dots + \frac{\langle v, b_k \rangle}{\|b_k\|^2} b_k.$$

$\vec{a} = [a_x, a_y] = a_x \cdot b_1 + a_y \cdot b_2$
 $\vec{d} = [d_x, d_y] = d_x \cdot b_1 + d_y \cdot b_2$

$\vec{a} \circ \vec{d} = a_x d_x (b_1 \circ b_1) + a_x d_y (b_1 \circ b_2) + a_y d_x (b_2 \circ b_1) + a_y d_y (b_2 \circ b_2)$
 $\stackrel{\perp}{=} 0$ *punkt* $u \in U$

$u = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_k b_k = [\alpha_1, \dots, \alpha_k]_{\mathcal{B}}$

iii) Jeśli baza \mathcal{B} jest bazą ortonormalną, wówczas

$$\|b_i\| = 1$$

$$u = \pi(v) = \underbrace{\langle v, b_1 \rangle}_{\alpha_1} b_1 + \underbrace{\langle v, b_2 \rangle}_{\alpha_2} b_2 + \dots + \underbrace{\langle v, b_k \rangle}_{\alpha_k} b_k.$$

Dowód. Jeśli $u = \pi(v)$, to $v - u \perp U$, co na mocy uwagi 13.2.5 jest równoważne $v - u \perp b_i$ dla $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. Zatem $\langle v - u, b_i \rangle = 0$ lub równoważnie $\langle v, b_i \rangle = \langle u, b_i \rangle$. Ponieważ $u \in U$, zatem istnieją $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ takie, że $u = [\alpha_1, \dots, \alpha_k]_{\mathcal{B}}$.

i) Otrzymujemy układ równań $\langle v, b_i \rangle = \langle u, b_i \rangle = \langle \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_k b_k, b_i \rangle = \alpha_1 \langle b_1, b_i \rangle + \dots + \alpha_k \langle b_k, b_i \rangle$, gdzie $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, który jest równoważny układowi (1).

ii) Na mocy twierdzenia 12.2.10 mamy $\alpha_i = \frac{\langle v, b_i \rangle}{\|b_i\|^2}$.

iii) Na mocy wniosku 12.2.11 mamy $\alpha_i = \langle v, b_i \rangle$. \square

Macierz $\begin{bmatrix} \langle b_1, b_1 \rangle & \langle b_1, b_2 \rangle & \dots & \langle b_1, b_k \rangle \\ \langle b_2, b_1 \rangle & \langle b_2, b_2 \rangle & \dots & \langle b_2, b_k \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle b_k, b_1 \rangle & \langle b_k, b_2 \rangle & \dots & \langle b_k, b_k \rangle \end{bmatrix}$ występującą w powyższym twierdzeniu nazywamy macierzą Grama układu wektorów (b_1, b_2, \dots, b_k) .

Przykład 13.2.10. W przestrzeni euklidesowej \mathbb{E}^4 wyznaczmy rzut ortogonalny wektora $v = (1, 1, 1, 0)$ na podprzestrzeń $U = \text{lin}\{(2, 1, 1, 2), (1, 1, -3, 0)\}$.

Just ortogonalna $b_1 \circ b_2 = 2 + 1 - 3 = 0$

Zauważmy, że $\mathcal{B} := (b_1, b_2)$ jest bazą U , bowiem $r \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix} = 2$.

METODA I

$u := \pi_U(v) = ?$, $w := v - u \perp U \Leftrightarrow w \perp b_1 := (2, 1, 1, 2) \wedge w \perp b_2 := (1, 1, -3, 0)$
 $u \in U$, zatem istnieją $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ takie, że $u = \alpha b_1 + \beta b_2$. Wówczas

$$w = (1, 1, 1, 0) - \alpha(2, 1, 1, 2) - \beta(1, 1, -3, 0) = (1 - 2\alpha - \beta, 1 - \alpha - \beta, 1 - \alpha + 3\beta, -2\alpha)$$

$$v - u = v - \alpha b_1 - \beta b_2$$

Otrzymujemy układ dwóch równań

$$0 = \langle w, b_1 \rangle = (1 - 2\alpha - \beta, 1 - \alpha - \beta, 1 - \alpha + 3\beta, -2\alpha) \circ (2, 1, 1, 2) = 4 - 10\alpha,$$

$$0 = \langle w, b_2 \rangle = (1 - 2\alpha - \beta, 1 - \alpha - \beta, 1 - \alpha + 3\beta, -2\alpha) \circ (1, 1, -3, 0) = -1 - 11\beta.$$

Stąd $\alpha = \frac{2}{5}, \beta = -\frac{1}{11}$ oraz

$$u = [\alpha, \beta]_{\mathcal{B}} = \left[\frac{2}{5}, -\frac{1}{11}\right]_{\mathcal{B}} = \frac{2}{5}b_1 - \frac{1}{11}b_2 = \left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right) - \left(\frac{1}{11}, \frac{1}{11}, -\frac{3}{11}, 0\right) = \left(\frac{39}{55}, \frac{17}{55}, \frac{37}{55}, \frac{4}{5}\right)$$

METODA II

Zauważmy, że baza $\mathcal{B} := (b_1, b_2)$ jest ortogonalna.


Istotnie $b_1 \circ b_2 = (2, 1, 1, 2) \circ (1, 1, -3, 0) = 0$. Na mocy twierdzenia 12.2.10 mamy

$u = \left[\frac{\langle v, b_1 \rangle}{\|b_1\|^2}, \frac{\langle v, b_2 \rangle}{\|b_2\|^2}\right]$. Ale $\langle v, b_i \rangle = \langle u, b_i \rangle$, zatem $u = \left[\frac{\langle v, b_1 \rangle}{\|b_1\|^2}, \frac{\langle v, b_2 \rangle}{\|b_2\|^2}\right]$. Obliczamy

$\langle v, b_1 \rangle = (1, 1, 1, 0) \circ (2, 1, 1, 2) = 4$, $\langle v, b_2 \rangle = (1, 1, 1, 0) \circ (1, 1, -3, 0) = -1$ oraz $\|b_1\|^2 = 10$, $\|b_2\|^2 = 11$. Stąd $u = [\alpha, \beta]_{\mathcal{B}}$. *TO SA MO*

UWAGA: Gdyby baza $\mathcal{B} := (b_1, b_2)$ nie była ortogonalna, zawsze możemy metodą Grama-Schmidta ją zortogonalizować i w dalszych rachunkach wykorzystać znaną bazę ortogonalną $\mathcal{C} := (c_1, c_2)$.

$\vec{a} \in U$
 $\pi_U(\vec{a}) = \vec{a}$
 $r \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix} = 3$
 $r \neq U$
 \mathbb{R}^3
 $\mathcal{B}^3 = (i, j, k)$
 ortogonalna
 $\vec{a} = [a_x, a_y, a_z]$
 $a_x = \vec{a} \circ \hat{u}$



$$w = v - u \perp U$$

$$w \circ b_1 = w \circ b_2 = 0$$

$$\langle v - u, b_1 \rangle = 0 \quad \langle v - u, b_2 \rangle = 0$$

$$\langle v, b_1 \rangle - \langle u, b_1 \rangle = 0$$

$$\langle v, b_1 \rangle = \langle u, b_1 \rangle \quad \langle v, b_2 \rangle = \langle u, b_2 \rangle$$

Interpretacja geometryczna metody Grama-Schmidta

Rozważmy przestrzeń \mathbb{E}^3 i jej bazę $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3)$. Niech $\mathcal{C} = (c_1, c_2, c_3)$ będzie szukaną bazą ortogonalną.

KROK I:

$$c_1 := b_1$$

$$\text{lin}\langle c_1 \rangle = \text{lin}\langle b_1 \rangle$$

KROK II:


$$c_2 := b_2 - \frac{\langle b_2, c_1 \rangle}{\|c_1\|^2} c_1 = b_2 - \pi_{\text{lin}\langle c_1 \rangle}(b_2)$$

$$c_2 = ?$$

$$\text{lin}\langle c_1, c_2 \rangle = \text{lin}\langle b_1, b_2 \rangle$$

$$c_2 \in \text{lin}\langle b_2, c_1 \rangle$$


$$c_2 = b_2 + \alpha \cdot c_1$$



KROK III:

$$c_3 := b_3 - \frac{\langle b_3, c_1 \rangle}{\|c_1\|^2} c_1 - \frac{\langle b_3, c_2 \rangle}{\|c_2\|^2} c_2 = b_3 - \pi_{\text{lin}\langle c_1, c_2 \rangle}(b_3)$$

$$\pi_{\text{lin}\langle c_1, c_2 \rangle}(b_3) = \alpha \cdot c_1 + \beta \cdot c_2$$



Przykładowy egzamin z przedmiotu Algebra wyższa

Łącznie można otrzymać 100 punktów. Aby otrzymać z egzaminu ocenę pozytywną, należy uzyskać nie mniej niż 50 punktów.

Zadanie 1. (20 pkt)

- a) Czy zbiór $\mathbb{Z}(i) = \{a + bi \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ wraz z działaniami dodawania i mnożenia liczb tworzy pierścień (przemienny, z jedynką)? Czy jest to ciało? Odpowiedź uzasadnij.
- b) Rozwiąż w zbiorze liczb zespolonych podane równanie.

$$z^3 = (\sqrt{12} - 2i)^{21}(i - 1)^{13}$$

Zadanie 2. (20 pkt)

- a) Podaj wszystkie możliwe wartości wyznacznika macierzy $A \in M_6(\mathbb{R})$ takiej, że

$$3A - (A^T)^7 = O.$$

- b) Dana jest płaszczyzna $\pi_1 : 4x + 2y - z + 2 = 0$. Napisz równanie ogólne i parametryczne płaszczyzny π przechodzącej przez punkty A, B, C , jeżeli $A = (2, 4, 6)$, zaś B i C to końce odcinka symetrycznego do odcinka

$$DE : \begin{cases} x = 2 + 7t \\ y = -3 + 6t \\ z = 4 - 2t \end{cases}, t \in [0, 1] \text{ względem płaszczyzny } \pi.$$

Zadanie 3. (20 pkt)

- a) Podaj definicję endomorfizmu diagonalizowalnego.
- b) Niech $\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ dany będzie wzorem

$$\varphi(x, y, z) = (2x + y + z, x + 2y + z, x + y + 2z).$$

Uzasadnij, że φ jest diagonalizowalny i oblicz $\varphi^{103}(2, 1, 0)$.

Zadanie 4. (20 pkt) Dane jest odwzorowanie liniowe

$$f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z, t) = (2x + 3y + z + t, -3x + y + 4z - 7t, x + 2y + z).$$

- Wyznacz $\text{Ker } f$, jego bazę i wymiar. Czy f jest monomorfizmem / epimorfizmem?
- W \mathbb{R}^4 rozważmy standardowy iloczyn skalarny. Wyznacz rzut ortogonalny wektora $(1, 1, -2, -1)$ na $\text{Ker } f$.
- Podaj macierz $M_f(\mathcal{B}, \mathcal{B}_k^3)$, gdy $\mathcal{B} = \left((1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0) \right)$ i korzystając z macierzy A oblicz $f(1, 1, -2, -1)$.

Zadanie 5. (20 pkt) Dana jest przestrzeń wektorowa $(\mathbb{R}_2[x], +, \mathbb{R}, \cdot)$. W przestrzeni tej definiujemy iloczyn skalarny

$$(p(x), q(x)) = aa' + bb' + cc', \quad \text{dla } p(x) = ax^2 + bx + c, q(x) = a'x^2 + b'x + c'$$

- Udowodnij, że $\mathcal{B} = (p, q, r)$ jest bazą $\mathbb{R}_2[x]$, gdy $p(x) = x^2 + x, q(x) = x^2, r(x) = x - 1$.
- Metodą Grama-Schmidta przeprowadź ortogonalizację bazy \mathcal{B} .

Contents

	1
1.1 Zbiory i relacje	1
1.2 Działania wewnętrzne i ich własności	5
1.3 Podstawowe struktury algebraiczne	6
	11
2.1 Ciało liczb zespolonych	11
2.2 Postać trygonometryczna i wykładnicza	14
2.3 Pierwiastkowanie, równania wielomianowe	17
2.4 Interpretacja geometryczna	21
	23
3.1 Macierze i ich własności	23
3.2 Wyznacznik macierzy	28
3.3 Macierz odwrotna	31
	35
4.1 Układy równań liniowych	35
4.2 Twierdzenie Kroneckera-Capellego	39
	45
5.1 Wektory w przestrzeni	45
5.2 Płaszczyzna w przestrzeni \mathbb{R}^3	50
5.3 Prosta w przestrzeni \mathbb{R}^3	52
	53
6.1 Wzajemne położenie płaszczyzn i prostych	53
	60
7.1 Przestrzenie liniowe i ich podprzestrzenie	60
7.2 Liniowa niezależność wektorów, baza i wymiar przestrzeni liniowej	63
	74
8.1 Definicja i podstawowe własności	74
8.2 Jądro, obraz i rząd odwzorowania liniowego	77
8.3 Działania na odwzorowaniach liniowych	78
	80
9.1 Reprezentacja macierzowa odwzorowania liniowego	80
9.2 Zmiana baz	85
	86
10.1 Wartości własne i wektory własne endomorfizmu	86
10.2 Diagonalizacja	91

	97
11.1 Definicja formy kwadratowej	97
11.2 Określoność formy kwadratowej	98
	102
12.1 Iloczyn skalarny i norma	102
12.2 Układy ortogonalne	104
	108
13.1 Metody ortogonalizacji	108
13.2 Rzut ortogonalny na podprzestrzeń	111
Przykładowy egzamin z przedmiotu Algebra wyższa	115