


TEMAT: *Geometria analityczna w  $\mathbb{R}^3$*

### 5.1 Wektory w przestrzeni

$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$  możemy interpretować jako:

- zbiór punktów  $P = (x, y, z)$ , gdzie  $x, y, z$  to współrzędne punktu
- zbiór wektorów zaczepionych w początku układu współrzędnych  $\vec{a} = \overrightarrow{OP} = [x, y, z]$ , gdzie  $x, y, z$  to współrzędne wektora
- zbiór wektorów swobodnych  $\vec{a}$ . Wektor swobodny to zbiór wszystkich wektorów zaczepionych (w różnych punktach) mających ten sam zwrot, kierunek i długość.





Oznaczamy przez  $\vec{0} = [0, 0, 0]$  wektor zerowy.

#### Działania na wektorach

Niech  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$ ,  $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

- $\vec{u} + \vec{v} = [u_x + v_x, u_y + v_y, u_z + v_z]$  suma wektorów
- $\lambda \cdot \vec{u} = [\lambda u_x, \lambda u_y, \lambda u_z]$  iloczyn wektora przez skalar
- $-\vec{u} = [-u_x, -u_y, -u_z]$  wektor przeciwny do  $\vec{u}$
- $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) = \vec{u} + (-1) \cdot \vec{v}$  różnica wektorów



#### Długość wektora

Oznaczamy przez  $|\vec{u}|$  długość wektora  $\vec{u}$ . Jeśli  $P_1 = (x_1, y_1, z_1), P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ , to wówczas

$$\overrightarrow{P_1P_2} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1], \quad |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Wektor długości 1 nazywamy *wersorem*. Oznaczamy przez  $\hat{i} = [1, 0, 0]$ ,  $\hat{j} = [0, 1, 0]$ ,  $\hat{k} = [0, 0, 1]$  wersory osi układu współrzędnych. Wówczas zapis  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$  oznacza  $\vec{u} = u_x \hat{i} + u_y \hat{j} + u_z \hat{k}$ . Ponadto  $|\vec{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$ .



Własności długości:  $|\vec{u}| = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$ ,  $|\lambda \cdot \vec{u}| = |\lambda| \cdot |\vec{u}|$ ,  $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$ .

Wersorem niezerowego wektora  $\vec{u}$  nazywamy wersor o tym samym kierunku i zwrocie co  $\vec{u}$ . Oznaczamy go  $\hat{u}$ . Oczywiście  $\hat{u} = \frac{1}{|\vec{u}|} \cdot \vec{u}$ .

Jeśli  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$ , to  $\hat{u} = \left[ \frac{u_x}{|\vec{u}|}, \frac{u_y}{|\vec{u}|}, \frac{u_z}{|\vec{u}|} \right]$  oraz

$$|\hat{u}| = \sqrt{\frac{u_x^2}{|\vec{u}|^2} + \frac{u_y^2}{|\vec{u}|^2} + \frac{u_z^2}{|\vec{u}|^2}} = \frac{1}{|\vec{u}|^2} \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = 1.$$

Jeśli wektor  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$  tworzy z dodatnimi półosiami układu współrzędnych kąty  $\alpha, \beta, \gamma$ , odpowiednio, to kąty te nazywamy *kątami kierunkowymi*, zaś współrzędne wersora  $\hat{u}$ , czyli liczby  $\cos \alpha = \frac{u_x}{|\vec{u}|}$ ,  $\cos \beta = \frac{u_y}{|\vec{u}|}$ ,  $\cos \gamma = \frac{u_z}{|\vec{u}|}$  nazywamy *cosinusami kierunkowymi* wektora  $\vec{u}$ .



$\hat{u}$  wersor

$\vec{u} = [1, 2, 3] = [1, 0, 0] + [0, 2, 0] + [0, 0, 3]$   
 $1 \cdot \hat{i} + 2 \cdot \hat{j} + 3 \cdot \hat{k}$   
 kombinacja liniowa

### Iloczyn skalarny

Oznaczamy przez  $\angle(\vec{u}, \vec{v})$  kąt między wektorami  $\vec{u}, \vec{v}$ . Przyjmujemy, że należy on do przedziału  $[0, \pi]$ .

**Definicja 5.1.1.** *Iloczynem skalarnym* dwóch niezerowych wektorów  $\vec{u}, \vec{v}$  nazywamy liczbę  $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \angle(\vec{u}, \vec{v})$ . Oznaczamy ją symbolem  $\vec{u} \circ \vec{v}$ . Gdy jeden z wektorów jest zerowy, przyjmujemy, że iloczyn jest równy 0.

**Twierdzenie 5.1.2.** Jeśli  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$ ,  $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$ , to wówczas  $\vec{u} \circ \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$ .

**Przykład 5.1.3.**  $[1, 4, 0] \circ [2, -1, 1] = 1 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 = -2 < 0$   
 Cosinus kąta między wektorami jest ujemny, zatem kąt jest rozwarty.


na znak wpływa tylko cosinus

**Twierdzenie 5.1.4** (Własności iloczynu skalarnego). Dla dowolnego  $\lambda \in \mathbb{R}$  i dla dowolnych wektorów  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  prawdziwe są następujące równości.

- i)  $\vec{u} \circ \vec{v} = \vec{v} \circ \vec{u}$  *operacja przemienna*
- ii)  $\vec{u} \circ \vec{u} = |\vec{u}|^2$   *$u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$  suma kwadratów współrz.  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$*
- iii)  $(\lambda \vec{u}) \circ \vec{v} = \lambda(\vec{u} \circ \vec{v})$
- iv)  $(\vec{u} + \vec{v}) \circ \vec{w} = (\vec{u} \circ \vec{w}) + (\vec{v} \circ \vec{w})$  *rozdzielność wzg. dodawania*
- v)  $|\vec{u} \circ \vec{v}| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$   *$|\vec{u} \circ \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot 1$*
- vi)  $\vec{u} \neq \vec{0}, \vec{v} \neq \vec{0}, \vec{u} \circ \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$   *$\cos \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$   $\alpha \in [0, \pi]$*

**Układ współrzędnych**

Układ współrzędnych w  $\mathbb{R}^3$  - trójka wzajemnie prostopadłych prostych, przecinających się w jednym punkcie, zwanym początkiem układu współrzędnych.



**Definicja 5.1.5.** Uporządkowana trójka wektorów  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  ma orientację zgodną z orientacją układu współrzędnych, jeśli

$$\begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} > 0.$$


**Iloczyn wektorowy**

Dwa wektory  $\vec{u}, \vec{v}$  nazywamy współliniowymi lub kolinearnymi, gdy istnieje prosta, w której zawarte są te wektory. Piszemy wówczas  $\vec{u} \parallel \vec{v}$ .


**Definicja 5.1.6.** Iloczynem wektorowym uporządkowanej pary niewspółliniowych wektorów  $\vec{u}, \vec{v}$  nazywamy wektor  $\vec{w}$  taki, że:

- i)  $\vec{w} \perp \vec{u}, \vec{w} \perp \vec{v}$ , *których*
- ii)  $|\vec{w}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$ , *długość*

*ozn.  $\alpha$   $\alpha \in [0, \pi]$   $\sin \alpha$  nieujemny*



iii) orientacja trójki  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  jest zgodna z orientacją układu współrzędnych.



Wektor  $\vec{w}$  oznaczamy symbolem  $\vec{u} \times \vec{v}$ .

Jeśli  $\vec{u} = \vec{0}$  lub  $\vec{v} = \vec{0}$ , to przyjmujemy  $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ .

**Przykład 5.1.7.**  $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$   
 $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}, \quad \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}, \quad \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}, \quad \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$

**Twierdzenie 5.1.8.** Jeśli  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z], \vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$ , to wówczas

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

*wektory*  
*składowe*

*reguła mnemotechniczna*

**Przykład 5.1.9.** Niech  $\vec{u} = [1, 2, -3], \vec{v} = [3, 4, 5]$ . Korzystamy z twierdzenia Laplace'a

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = [22, -14, -2]$$

*(-1)<sup>2</sup>      (-1)<sup>3</sup>      (-1)<sup>1</sup>*


lub metody Sarrusa

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 10\hat{i} + 4\hat{k} - 9\hat{j} - 6\hat{k} + 12\hat{i} - 5\hat{j} = 22\hat{i} - 14\hat{j} - 2\hat{k}.$$

**Twierdzenie 5.1.10** (Własności iloczynu wektorowego). Dla dowolnego  $\lambda \in \mathbb{R}$  i dla dowolnych wektorów  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  prawdziwe są następujące równości.

- i)  $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$  *operacja nieprzemienna*
- ii)  $\lambda(\vec{u} \times \vec{v}) = (\lambda\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (\lambda\vec{v})$
- iii)  $(\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w})$
- iv)  $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$
- v)  $|\vec{u} \times \vec{v}| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$
- vi)  $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow (\vec{u} \parallel \vec{v} \vee \vec{u} = \vec{0} \vee \vec{v} = \vec{0})$


Reguła prawej dłoni:



**Uwaga 5.1.11.** Pole równoległoboku rozpiętego na wektorach  $\vec{u}, \vec{v}$  równe jest  $|\vec{u} \times \vec{v}|$ .

*długość*  
 $|\vec{u} \times \vec{v}|$

$$\alpha = \angle(\vec{u}, \vec{v})$$




$$P = |\vec{u}| \cdot h$$

## Iloczyn mieszany

**Definicja 5.1.12.** Niech  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$ ,  $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$ ,  $\vec{w} = [w_x, w_y, w_z]$ . Iloczynem mieszanym uporządkowanej trójki wektorów  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  nazywamy liczbę  $(\vec{u} \times \vec{v}) \circ \vec{w}$ . Oznaczamy ją symbolem  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ . ← skalar

**Twierdzenie 5.1.13.** Niech  $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]$ ,  $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$ ,  $\vec{w} = [w_x, w_y, w_z]$ . Wówczas

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}.$$



**Uwaga 5.1.14.** Objętość równoległościanu rozpiętego na wektorach  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  równa jest

$|(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$  — moduł w  $\mathbb{R}$

*Dowód.* Niech  $\alpha = \angle(\vec{u} \times \vec{v}, \vec{w})$ . Ponieważ  $V = P_p \cdot d = |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot h$  oraz  $\cos \alpha = \frac{h}{|\vec{w}|}$ , zatem  $V = |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cos \alpha = \vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v})$ . □

**Przykład 5.1.15.** Czy punkty  $A = (1, 0, 2)$ ,  $B = (5, 1, 5)$ ,  $C = (3, -1, 2)$ ,  $D = (1, 3, 5)$  leżą w jednej płaszczyźnie?

Punkty leżą w jednej płaszczyźnie wtedy i tylko wtedy, gdy objętość czworościanu rozpiętego na wektorach  $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$  jest równa zero.

$$\vec{AB} = [4, 1, 3], \vec{AC} = [2, -1, 0], \vec{AD} = [0, 3, 3]$$

$$(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -12 + 18 - 6 = 0$$

Punkty są współpłaszczyznowe (komplanarne).

**Twierdzenie 5.1.16** (Własności iloczynu mieszanego). Dla dowolnego  $\lambda \in \mathbb{R}$  i dla dowolnych wektorów  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{a}$  prawdziwe są następujące równości.

- i)  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u})$
- ii)  $\lambda(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\lambda\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \lambda\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \lambda\vec{w})$
- iii)  $(\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}, \vec{a}) = (\vec{u}, \vec{w}, \vec{a}) + (\vec{v}, \vec{w}, \vec{a})$
- iv)  $|(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot |\vec{w}|$

$$\begin{aligned} (\vec{w}, \vec{v}, \vec{u}) &\stackrel{af}{=} (\vec{u} \times \vec{v}) \circ \vec{w} \\ i) \parallel & \\ (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}) &\stackrel{af}{=} (\vec{v} \times \vec{w}) \circ \vec{u} = \vec{u} \circ (\vec{v} \times \vec{w}) \end{aligned}$$

## 5.2 Płaszczyzna w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

### Równanie ogólne i normalne płaszczyzny

Niech  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$  będzie ustalonym punktem, zaś  $\vec{n} = [A, B, C] \neq \vec{0}$  ustalonym wektorem. Wówczas zbiór


$$\pi = \{P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \overrightarrow{P_0P} \perp \vec{n}\}$$

jest płaszczyzną przechodzącą przez punkt  $P_0$  i prostopadłą do wektora  $\vec{n}$ . Wektor  $\vec{n}$  nazywamy wektorem normalnym płaszczyzny  $\pi$ .

$$P \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{P_0P} \circ \vec{n} = 0 \Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Równanie normalne:  $\pi : A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$


Równanie ogólne:  $\pi : Ax + By + Cz + D = 0, D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$



**Przykład 5.2.1.**  $P_0 = (1, 2, 5), \vec{n} = [1, -1, 3], P_0 \in \pi, \vec{n} \perp \pi, \pi = ?$

$\pi : 1 \cdot (x - 1) + (-1) \cdot (y - 2) + 3 \cdot (z - 5) = 0$  równanie normalne

$\pi : x - y + 3z - 14 = 0$  równanie ogólne



### Równanie parametryczne płaszczyzny

Niech  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$  będzie ustalonym punktem, zaś  $\vec{a} = [a_x, a_y, a_z] \neq \vec{0}, \vec{b} = [b_x, b_y, b_z] \neq \vec{0}$  ustalonymi wektorami niewspółliniowymi, tj.  $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ . Wówczas zbiór

$$\pi = \{P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \exists t, s \in \mathbb{R} \overrightarrow{P_0P} = t\vec{a} + s\vec{b}\}$$

jest płaszczyzną przechodzącą przez punkt  $P_0$  i równoległą do wektorów  $\vec{a}, \vec{b}$ . Mówimy, że wektory  $\vec{a}, \vec{b}$  są wektorami rozpinającymi płaszczyznę  $\pi$ .

$$\overrightarrow{P_0P} = t\vec{a} + s\vec{b} \Leftrightarrow [x - x_0, y - y_0, z - z_0] = t[a_x, a_y, a_z] + s[b_x, b_y, b_z]$$

Równanie parametryczne:  $\pi : \begin{cases} x = x_0 + t \cdot a_x + s \cdot b_x \\ y = y_0 + t \cdot a_y + s \cdot b_y \\ z = z_0 + t \cdot a_z + s \cdot b_z \end{cases}, t, s \in \mathbb{R}$

**Przykład 5.2.2.** Napisz równanie parametryczne płaszczyzny  $\pi$  przechodzącej przez punkty  $A = (1, 1, 4), B = (2, 5, 4)$  i równoległej do osi  $Oy$ .

$$\overrightarrow{AB} = [1, 4, 0] \parallel \pi, \hat{j} = [0, 1, 0] \parallel Oy \Rightarrow \hat{j} \parallel \pi, A \in \pi$$

$$\pi : \begin{cases} x = 1 + 1 \cdot t + 0 \cdot s = 1 + t \\ y = 1 + 4 \cdot t + 1 \cdot s = 1 + 4t + s \\ z = 4 + 0 \cdot t + 0 \cdot s = 4 \end{cases}, t, s \in \mathbb{R}$$



## Inne równania płaszczyzny

Równanie postaci  $\pi : \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ , gdzie  $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , opisuje płaszczyznę przechodzącą przez punkty  $(a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$ . Jest to tzw. równanie odcinkowe płaszczyzny.



Równanie płaszczyzny przechodzącej przez trzy niewspółliniowe punkty

$P_1 = (x_1, y_1, z_1), P_2 = (x_2, y_2, z_2), P_3 = (x_3, y_3, z_3)$  ma postać

$$\pi : \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\pi \perp \vec{n}$$

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$$



Istotnie, ponieważ  $\vec{P_1P_2} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1], \vec{P_1P_3} = [x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1] \parallel \pi$  oraz  $\vec{n} = \vec{P_1P_2} \times \vec{P_1P_3} \perp \pi$ , zatem

$$\pi = \{P = (x, y, z) : \vec{P_1P} \perp \vec{n}\} = \{P = (x, y, z) : [x - x_1, y - y_1, z - z_1] \circ \vec{n} = 0\}.$$

## 5.3 Prosta w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

### Równanie parametryczne i kierunkowe prostej

Niech  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$  będzie ustalonym punktem, zaś  $\vec{a} = [a_x, a_y, a_z] \neq \vec{0}$  ustalonym wektorem. Wówczas zbiór

$$l = \{P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \vec{P_0P} \parallel \vec{a}\}$$

jest prostą przechodzącą przez punkt  $P_0$  i równoległą do wektora  $\vec{a}$ . Wektor  $\vec{a}$  nazywamy wektorem kierunkowym prostej  $l$ .

$$P_0 \in l \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} : \vec{P_0P} = t\vec{a}$$

Równanie postaci  $l : \begin{cases} x = x_0 + t \cdot a_x \\ y = y_0 + t \cdot a_y \\ z = z_0 + t \cdot a_z \end{cases}, t \in \mathbb{R}$  nazywamy równaniem parametrycznym prostej  $l$ .

Rugując z każdego z powyższych równań parametr  $t$  otrzymujemy równanie postaci  $l :$


$$l = \frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}, \text{ które nazywamy równaniem kierunkowym prostej } l.$$

### Równanie krawędziowe prostej

Niech  $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ , gdzie  $A_1^2 + B_1^2 + C_1^2 \neq 0, A_2^2 + B_2^2 + C_2^2 \neq 0$  będą dwiema nierównoległymi płaszczyznami. Ich częścią wspólną jest prosta  $l = \pi_1 \cap \pi_2$ .

$$P \in l \Leftrightarrow (P \in \pi_1 \wedge P \in \pi_2)$$

Równanie krawędziowe:  $l : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$



A 49 B

$$r(A) = 2 \\ m - r = 1$$


$$\emptyset \leftarrow \leftarrow$$

$$\pi_1 = \pi_2 \leftarrow \leftarrow$$

**Przykład 5.3.1.** Napisz równanie prostej  $l$  przechodzącej przez punkt  $P_0 = (2, 3, 1)$  i równoległej do płaszczyzn  $\pi_1 : 6x - y + z - 2 = 0$ ,  $\pi_2 : x + 3y - 2z + 1 = 0$ . *równoległa*

Oznaczmy  $\vec{n}_1 = [6, -1, 1] \perp \pi_1$ ,  $\vec{n}_2 = [1, 3, -2] \perp \pi_2$  oraz  $\vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 \parallel l$ .

Wówczas  $\vec{a} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 6 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = [-1, 13, 19]$  oraz  $l : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 13t \\ z = 1 + 19t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ .



## 5.4 Wzajemne położenie płaszczyzn i prostych

### Wzajemne położenie płaszczyzn

Niech  $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ,  $\vec{n}_1 = [A_1, B_1, C_1] \neq \vec{0}$ ,  
 $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ ,  $\vec{n}_2 = [A_2, B_2, C_2] \neq \vec{0}$ .

Szukanie punktów wspólnych  $\pi_1$  oraz  $\pi_2$  polega na rozwiązaniu układu równań

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -D_1 \\ -D_2 \end{bmatrix}.$$

Niech  $A = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix}$ ,  $U = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & -D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & -D_2 \end{bmatrix}$ .




Płaszczyzny mogą być równoległe.  $\pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow n_1 \parallel n_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0}$

Wówczas albo  $\pi_1 = \pi_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$ , gdy  $r(U) = r(A) = 1$

albo  $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$ , gdy  $r(U) = 2, r(A) = 1$ .

Gdy  $r(U) = r(A) = 2$ , płaszczyzny  $\pi_1 \not\parallel \pi_2$  przecinają się wzdłuż prostej. W szczególności mogą być prostopadłe.

$$\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \circ \vec{n}_2 = 0$$






## Wzajemne położenie prostych

Niech  $\vec{a}$  będzie wektorem kierunkowym prostej  $l$ , przechodzącej przez punkt  $P_1$ , zaś  $\vec{b}$  wektorem kierunkowym prostej  $k$ , przechodzącej przez punkt  $P_2$ .

Proste mogą być równoległe.  $l \parallel k \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ .  
Wówczas albo  $l = k$ , albo  $l \cap k = \emptyset$ .




Gdy  $l \not\parallel k$ , możliwe są dwie sytuacje.

1) Proste  $l$  i  $k$  leżą w jednej płaszczyźnie, co jest równoważne stwierdzeniu, że wektory  $\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{a}, \vec{b}$  leżą w jednej płaszczyźnie. Wówczas  $l$  i  $k$  mają jeden punkt wspólny tj.  $l \cap k = \{P\}$ ,

2) Proste  $l$  i  $k$  nie leżą w jednej płaszczyźnie (tzw. proste skośne), co jest równoważne stwierdzeniu, że wektory  $\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{a}, \vec{b}$  nie leżą w jednej płaszczyźnie. Wówczas  $l \cap k = \emptyset$ .



Zatem proste  $l$  i  $k$  są skośne wtedy i tylko wtedy gdy  $(\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{a}, \vec{b}) \neq 0$ .



## Kąty

**Definicja 5.4.1.** i) *Kątem między dwiema prostymi* nazywamy kąt ostry (lub prosty, gdy proste są prostopadłe) między odpowiednio zwróconymi wektorami kierunkowymi tychże prostych.


ii) *Kątem między dwiema płaszczyznami* nazywamy kąt ostry (lub prosty, gdy płaszczyzny są prostopadłe) między odpowiednio zwróconymi wektorami normalnymi tychże płaszczyzn.




$$P \in \pi \Rightarrow P' = P$$

**Definicja 5.4.2.** i) Rzutem prostokątnym punktu  $P$  na płaszczyznę  $\pi$  nazywamy punkt  $P' \in \pi$  taki, że  $\overrightarrow{PP'} \perp \pi$ .

$$\overrightarrow{PP'} \parallel \vec{n}$$




ii) Rzutem prostokątnym punktu  $P$  na prostą  $l$  nazywamy punkt  $P' \in l$  taki, że  $PP' \perp l$ .



Można zdefiniować *rzut ukośny* w kierunku zadanego wektora.

Rzut punktu  $P$  na płaszczyznę  $\pi$  w kierunku wektora  $\vec{v} \parallel \pi$ :



$$\{P'\} = \pi \cap l$$

$$\vec{v} \parallel l$$


żadny

$$\vec{v} \parallel \pi$$

Rzut nie istnieje

$$l \cap \pi = \emptyset$$

Rzut punktu  $P$  na prostą  $l$  w kierunku wektora  $\vec{v}$ , o którym zakładamy, że należy do płaszczyzny zawierającej  $P$  oraz  $l$ :



$$l \cap k = \{P'\}$$

$l, k$  - linie  
w jednej  
płaszczyźnie

żadny

$k, l$  - skośne  
Rzut nie istnieje


$$\vec{v} \parallel l$$

-||-

**Przykład 5.4.3.** Wyznacz rzut prostokątny punktu  $P = (4, 5, -3)$  na płaszczyznę

$$\pi : \begin{cases} x = 2 + 2t + s \\ y = 1 + 3s \\ z = 3 + t + s \end{cases}, t, s \in \mathbb{R}.$$

wektory rozpinające  $\pi$



Niech  $k$  będzie prostą taką, że  $k \perp \pi$ ,  $P \in k$ .

$$\vec{u} = [2, 0, 1] \parallel \pi, \quad \vec{v} = [1, 3, 1] \parallel \pi, \quad A = (2, 1, 3) \in \pi$$


$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} \perp \pi, \quad \vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = [-3, -1, 6], \quad (k \perp \pi \Rightarrow k \parallel \vec{n})$$

$$k : \begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = 5 - t \\ z = -3 + 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \quad \pi : -3(x-2) - (y-1) + 6(z-3) = 0 \quad \text{row normalne}$$

$$\pi : 3x + y - 6z + 11 = 0 \quad \{P'\} = k \cap \pi = ?$$

$$3(4-3t) + 5 - t - 6(-3+6t) = 0 \Rightarrow t = 1, \quad P' = (1, 4, 3)$$

**Definicja 5.4.4.** Kątem między płaszczyzną a prostą nazywamy kąt o mierze  $\frac{\pi}{2} - \alpha$ , gdzie  $\alpha$  to miara kąta ostrego (lub prostego, gdy prosta i płaszczyzna są równoległe) między odpowiednio zwróconym wektorem kierunkowym prostej a wektorem normalnym płaszczyzny.



$$\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$$

$$\alpha = \angle(\vec{n}, \vec{a})$$

**Przykład 5.4.5.** Wyznacz kąt między prostą  $l : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 \\ z = 2 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

a płaszczyzną  $\pi : 3x + y + z + 1 = 0$ .

Mamy  $\vec{a} = [-1, 0, 2] \parallel l$ ,  $\vec{n} = [3, 1, 1] \perp \pi$ . Oznaczmy  $\beta = \angle(\vec{n}, \vec{a})$ ,  $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$ .

$$\text{Obliczamy } \cos \beta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|} = \frac{|-3+0+2|}{\sqrt{9+1+1} \cdot \sqrt{1+4}} = \frac{1}{\sqrt{55}}, \quad \alpha = \frac{\pi}{2} - \arccos \frac{1}{\sqrt{55}},$$

$$\text{albo } \sin \alpha = \cos \beta \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{55}}$$


$$\vec{n} \cdot \vec{a} = |\vec{n}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos \angle(\vec{n}, \vec{a})$$

bo duodni o kąt ostrej!

## Odległości

**Definicja 5.4.6.** i) *Odległością punktu  $P$  od płaszczyzny  $\pi$* , nazywamy długość odcinka  $PP'$ , gdzie  $P'$  jest rzutem prostokątnym  $P$  na  $\pi$ . Oznaczamy ją  $d(P, \pi)$ .


ii) *Odległością punktu  $P$  od prostej  $l$* , nazywamy długość odcinka  $PP'$ , gdzie  $P'$  jest rzutem prostokątnym  $P$  na  $l$ . Oznaczamy ją  $d(P, l)$ .



### Wzór na odległość punktu od płaszczyzny

Niech  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  oraz  $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ ,  $\vec{n} = [A, B, C] \neq \vec{0}$ . Wówczas

$$d(P_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{|\vec{n}|}$$



Istotnie, niech  $k$  będzie prostą taką, że  $P_0 \in k$ ,  $k \perp \pi$ . Wówczas  $k : \begin{cases} x = x_0 + At \\ y = y_0 + Bt \\ z = z_0 + Ct \end{cases}$

$$\{P'_0\} = k \cap \pi = ?$$


$$A(x_0 + At) + B(y_0 + Bt) + C(z_0 + Ct) + D = 0, \quad t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$d(P, \pi) = |P_0 P'_0| = \sqrt{(At)^2 + (Bt)^2 + (Ct)^2} = |t| \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

### Wzór na odległość punktu od prostej

Niech  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  oraz niech  $l$  będzie prostą przechodzącą przez punkt  $P_1$  o wektorze kierunkowym  $\vec{a}$ . Wówczas



$$d(P_0, l) = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$$



Odległość prostej od płaszczyzny


$l \cap \pi \neq \emptyset$   
 $d(l, \pi) = 0$

Jeśli prosta nie przecina płaszczyzny  $\pi$ , to wówczas odległością prostej  $l$  od płaszczyzny  $\pi$  nazywamy odległość dowolnego punktu prostej od płaszczyzny.



**Definicja 5.4.7.** Odległością dwóch płaszczyzn (prostych) równoległych nazywamy odległość dowolnego punktu jednej z nich od drugiej.

Można wykazać, że dla płaszczyzn równoległych  $\pi_1 : Ax + By + Cz + D_1 = 0$ ,  $\pi_2 : Ax + By + Cz + D_2 = 0$ ,  $\vec{n}_2 = [A, B, C] \neq \vec{0}$  zachodzi wzór  $d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_2 - D_1|}{|\vec{n}_1|}$ .




$\pi_1 \nparallel \pi_2 \Rightarrow \pi_1 \cap \pi_2 = l \quad d(\pi_1, \pi_2) = 0$   
 $\pi_1 = \pi_2 \Rightarrow d(\pi_1, \pi_2) = 0$   
 $\pi_1 \parallel \pi_2 \wedge \pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$   
 $d(\pi_1, \pi_2) = d(P_1, \pi_2)$

**Definicja 5.4.8.** Odległością dwóch prostych skośnych nazywamy odległość dwóch płaszczyzn równoległych zawierających te proste.

Niech  $\vec{a}$  będzie wektorem kierunkowym prostej  $l$ , przechodzącej przez punkt  $P_1$ , zaś  $\vec{b}$  wektorem kierunkowym prostej  $k$ , przechodzącej przez punkt  $P_2$ . Załóżmy że proste te są skośne. Wówczas

$$d(k, l) = \frac{|(\overrightarrow{P_1 P_2}, \vec{a}, \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

← objętości (moduł il. mieszanej)  
 ↑ pole podstawy



## Symetrie

**Definicja 5.4.9.** Niech  $S$  będzie ustalonym punktem,  $l$  ustaloną prostą oraz  $\pi$  ustaloną płaszczyzną.

- i) Punkt  $P_s$  jest *punktem symetrycznym* do punktu  $P$  względem punktu  $S$ , jeżeli  $\overrightarrow{PS} = \overrightarrow{SP_s}$ .
- ii) Punkt  $P_s$  jest punktem symetrycznym do punktu  $P$  względem prostej  $l$ , jeżeli istnieje  $A \in l$  taki, że  $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{AP_s}$  oraz  $\overrightarrow{PA} \perp l$ .
- iii) Punkt  $P_s$  jest punktem symetrycznym do punktu  $P$  względem płaszczyzny  $\pi$ , jeżeli istnieje  $A \in \pi$  taki, że  $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{AP_s}$  oraz  $\overrightarrow{PA} \perp \pi$ .

