

Zad. 1 Czy  $f$  jest liniowe?

a)  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = (7x+y+7, 7x-y)$

NIE  
 $L = f(\alpha(x,y)) = f(\alpha x, \alpha y) = (7\alpha x + \alpha y + 7, 7\alpha x - \alpha y)$   
 $P = \alpha \cdot f(x,y) = \alpha(7x+y+7, 7x-y) = (7\alpha x + \alpha y + \alpha 7, 7\alpha x - \alpha y)$  L ≠ P

b)  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y,z) = x+y+z$  TAK

$\forall (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

$\alpha \cdot f(x,y,z) = \alpha \cdot (x+y+z) = \alpha x + \alpha y + \alpha z = f(\alpha x, \alpha y, \alpha z) = f(\alpha \cdot (x,y,z))$   
 $f(x_1, y_1, z_1) + f(x_2, y_2, z_2) = (x_1+y_1+z_1) + (x_2+y_2+z_2) = (x_1+x_2) + (y_1+y_2) + (z_1+z_2) = f(x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2) = f[(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)]$

c)  $f: M_3(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}, f(A) = \det A$  NIE

$L = 2 \cdot f(I_3) = 2 \cdot \det(I_3) = 2 \cdot 1$  L ≠ P  
 $P = f(2I_3) = \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 2^3$

d)  $f: \mathbb{R}_2[X] \rightarrow M_2(\mathbb{R}), f(ax^2+bx+c) = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & c \end{bmatrix}$  TAK

$\forall a_1x^2+b_1x+c_1 \in \mathbb{R}_2[X]$   
 $\forall a_2x^2+b_2x+c_2 \in \mathbb{R}_2[X]$   
 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$\alpha \cdot f(a_1x^2+b_1x+c_1) = \alpha \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ -\alpha b_1 & \alpha c_1 \end{bmatrix} = f(\alpha a_1x^2 + \alpha b_1x + \alpha c_1) = f[\alpha \cdot (a_1x^2+b_1x+c_1)]$

$f[(a_1x^2+b_1x+c_1) + (a_2x^2+b_2x+c_2)] = f[(a_1+a_2)x^2 + (b_1+b_2)x + (c_1+c_2)] = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ -b_1-b_2 & c_1+c_2 \end{bmatrix}$   
 $= \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & c_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & c_2 \end{bmatrix} = f(a_1x^2+b_1x+c_1) + f(a_2x^2+b_2x+c_2)$

Zad. 2  $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, \varphi(x,y,z,t) = (x+2y+z-t, x+2z+t, 2x+y+3t)$

a)  $\text{Im} \varphi = ? \quad \text{Ker} \varphi = ? \quad \oplus$  ich bazy i wymiary

b) *krótka*  $\varphi$

$\varphi(x,y,z,t) = x(1,1,2) + y(2,0,1) + z(1,2,0) + t(-1,1,3)$

$\text{Im} \varphi = \text{lin}\{(1,1,2), (2,0,1), (1,2,0), (-1,1,3)\}$

generatory, ale nie baza  
 $\text{Im} \varphi \subset \mathbb{R}^3 \Rightarrow \dim \text{Im} \varphi \leq 3$

$\begin{matrix} r & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\substack{w_2-2w_1 \\ w_3-w_1 \\ w_4+w_1}} & r & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\substack{w_2 \cdot (-\frac{1}{2}) \\ w_4+w_2}} & r & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} & \xrightarrow{w_3-w_2} & r & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = 3 \end{matrix}$   $\dim \text{Im} \varphi = 3$   
Baza  $\{(1,1,2), (0,1,0), (0,0,1)\}$

$\dim \text{Im} \varphi = \dim \mathbb{R}^3$   
 $\varphi$ -EPIMORFIZM

$\dim \text{Ker} \varphi = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \text{Im} \varphi = 4 - 3 = 1$

$\text{Ker} \varphi = ? \quad \varphi(x,y,z,t) = (0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} x+2y+z-t=0 \\ x+2z+t=0 \\ 2x+y+3t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{w_2-w_1 \\ w_3-2w_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2-w_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_3+3w_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -4 & 0 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{w_3 \cdot \frac{1}{7}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{7} & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{w_2-3w_3 \\ w_1-w_3}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -\frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{9}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{7} & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_1-2w_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{15}{7} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{9}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{7} & 0 \end{bmatrix}$

$\text{Ker} \varphi = \{(-\frac{15}{7}t, \frac{9}{7}t, \frac{4}{7}t); t \in \mathbb{R}\} = \text{lin}\{(-15, 9, 4)\}$  baza  $\{(-15, 9, 4)\}$   
 $\text{Ker} \varphi \neq \{(0,0,0)\}$   
 $\varphi$  nie jest MONOMORFIZMEM

Zad. 3

$f: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$  liniowa

$f(p)(x) = (3-x) \cdot p''(x) + 4p'(x)$

a)  $A = ?$   $A = M_f(B, C)$   $B = (1, x, x^2)$  baza  $\mathbb{R}_2[x]$   
 $C = (1, x)$  baza  $\mathbb{R}_1[x]$

$f(1) = (3-x) \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 0 = [0, 0]_C$   
 $f(x) = (3-x) \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 4 = [4, 0]_C$   
 $f(x^2) = (3-x) \cdot 2 + 4 \cdot 2x = 6 - 2x + 8x = 6 + 6x = [6, 6]_C$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

b)  $\text{Ker } f = ?$   $\text{Im } f = ?$   $\oplus$  ichi bazy i wymiary  
c) Własności  $f'$

$p \in \mathbb{R}_2[x]$   $p(x) = ax^2 + bx + c$   $p'(x) = 2ax + b$   $p''(x) = 2a$

$f(p)(x) = (3-x) \cdot 2a + 4(2ax + b) = 6a - 2ax + 8ax + 4b = 6ax + (6a + 4b) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a = 0 \\ 6a + 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = 0 \Rightarrow \text{Ker } f = \{p \in \mathbb{R}_2[x] : p(x) = c ; c \in \mathbb{R}\}$   
Wielomiany stałe

$\text{Ker } f = \text{lin} \{1\}$  baza  $\dim \text{Ker } f = 1$

$\dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}_2[x] - \dim \text{Ker } f = 3 - 1 = 2$

lub  $\dim \text{Im } f = \text{r} \begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} = 2$

$\text{Im } f \subseteq \mathbb{R}_1[x]$   $\wedge \dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}_1[x] = 2 \Rightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}_1[x]$   
baza  $(1, x)$   
 $f$  - epimorfizm

Zad. 4

$U, V$  - przestrzenie  $\mathbb{R}$ -liniowe

$\varphi: U \rightarrow V$  liniowa

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 7 & 9 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$\dim \text{Ker } \varphi = ?$

$A \in M_{3 \times 5}(\mathbb{R}) \Rightarrow \dim U = 5$   
 $\dim V = 3$

$\dim \text{Ker } \varphi = \dim U - \dim \text{Im } \varphi = 5 - \text{r}(A)$

$\text{r}(A) \stackrel{\substack{W_2 - 2W_1 \\ W_3 - 4W_1}}{=} \text{r} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -7 & -2 & -1 \\ 0 & -5 & -7 & -2 & -1 \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow \dim \text{Ker } \varphi = 5 - 2 = 3$

Zad. 5

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$   $f(1,1,1) = (2,2)$ ,  $f(1,0,1) = (1,0)$ ,  $f(0,1,1) = (1,1)$

a) Wzór  $f$  ?

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 - 1 \neq 0 \Rightarrow ((1,1,1), (1,0,1), (0,1,1))$   
pchna baza  $\mathbb{R}^3$

$B_{\mathbb{R}^3} = (e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1))$   
baza kanoniczna  $\mathbb{R}^3$

$f(x, y, z) = f(xe_1 + ye_2 + ze_3) = x f(e_1) + y f(e_2) + z f(e_3)$   $f$ -liniowa  
 $f(e_1) = ?$ ,  $f(e_2) = ?$ ,  $f(e_3) = ?$

$\begin{cases} f(1,1,1) = f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) = (2,2) \\ f(1,0,1) = f(e_1) + f(e_3) = (1,0) \\ f(0,1,1) = f(e_2) + f(e_3) = (1,1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(e_2) = (2,2) - (1,0) = (1,2) \\ f(e_1) = (2,2) - (1,1) = (1,1) \\ f(e_3) = (1,1) - f(e_2) = (1,1) - (1,2) = (0,-1) \end{cases}$

$f(x, y, z) = x \cdot (1,1) + y \cdot (1,2) + z \cdot (0,-1) = (x+y, x+2y-z)$

b)  $B = (b_1 = (3,1,1), b_2 = (5,1,6), b_3 = (4,-1,2))$  baza  $\mathbb{R}^3$

$C = (c_1 = (-1,1), c_2 = (1,0))$  baza  $\mathbb{R}^2$

$A = M_f(B, C) = ?$   
 $f(3,1,1) = (4,4) = 4c_1 + 8c_2 = [4, 8]_C$   
 $f(5,1,6) = (6,1) = c_1 + 7c_2 = [1, 7]_C$   
 $f(4,-1,2) = (3,0) = 3c_2 = [0, 3]_C$

$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 8 & 7 & 3 \end{bmatrix}$

$$c) C = (C_1 = (1,1), C_2 = (2,1)) \quad \mathcal{P} = \mathcal{P}_{C \rightarrow C'} = ?$$

$$C_1' = (1,1) = (-1,1) + (2,0) = [1, 2]_C \quad \mathcal{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C_2' = (2,1) = (-1,1) + (3,0) = [1, 3]_C$$

$$d) v = [2, 5]_C \quad v' = [2, p]_{C'} = ? \quad X = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad X' = \begin{bmatrix} 2 \\ p \end{bmatrix} \quad \mathcal{P}X' = X \quad X' = \mathcal{P}^{-1}X$$

$$\mathcal{P}^{-1} = ? \quad \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{u_2 - 2u_1} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{u_1 + u_2} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{u_1 + 1 \\ p-1}} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v' = [1, 1]_{C'}$$

## Zad. 6

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad A = M_{\varphi}(B_C^2, B_C^3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = (b_1 = (1,1), b_2 = (2,1)) \text{ baza } \mathbb{R}^2$$

$$C = (C_1 = (1,2,0), C_2 = (2,3,0), C_3 = (0,0,1)) \text{ baza } \mathbb{R}^3$$

$$A' = M_{\varphi}(B, C) = ?$$

$$A' = Q^{-1} A \mathcal{P} \quad \mathcal{P} = \mathcal{P}_{B_C^2 \rightarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad Q = \mathcal{P}_{B_C^3 \rightarrow C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A' = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -7 \\ 4 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Zad. 7} \quad \varphi: \mathbb{R}_1[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x] \quad B = (1, x) \quad A = M_{\varphi}(B, B) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B' = (1, -5x) \quad A' = M_{\varphi}(B', B') = ?$$

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_{B \rightarrow B'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \quad A' = \mathcal{P}^{-1} A \mathcal{P}$$

$$\mathcal{P}^{-1} = \frac{-1}{5} \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \quad A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ \frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}$$

## Zad. 8

$$\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$B = (b_1 = (1,1,1,1), b_2 = (1,1,1,0), b_3 = (1,1,0,0), b_4 = (1,0,0,0)) \text{ baza } \mathbb{R}^4$$

$$C = (C_1 = (0, -1, 0), C_2 = (1, 0, 0), C_3 = (1, 1, 1)) \text{ baza } \mathbb{R}^3$$

$$A' = M_{\varphi}(B, C) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a) v = (5, 0, 1, 0) \quad \varphi(v) = ?$$

$$v = [\alpha, \beta, \gamma, \delta]_B = ?$$

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_{B_C^4 \rightarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{P} \cdot \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma + \delta = 5 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta = 1 \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 1 \\ \gamma = -\alpha - \beta = -1 \\ \delta = 5 - \alpha - \beta - \gamma = 5 - 0 - 1 + 1 = 5 \end{cases}$$

$$v = [0, 1, -1, 5]_B$$

$$A' \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\varphi(v) = [-10, 7, 0]_C = -10c_1 + 7c_2 = -10(0, -1, 0) + 7(1, 0, 0) = \underline{\underline{(7, 10, 0)}}$$

$$b) \begin{cases} \varphi(1,1,1,1) = [1,4,2]_C = (0,-1,0) + 4(1,0,0) + 2(1,1,1) = (6,1,2) & = \varphi(e_1) + \varphi(e_2) + \varphi(e_3) + \varphi(e_4) \\ \varphi(1,1,1,0) = [-2,3,0]_C = -2(0,-1,0) + 3(1,0,0) = (3,2,0) & = \varphi(e_1) + \varphi(e_2) + \varphi(e_3) \\ \varphi(1,1,0,0) = [-2,1,0]_C = -2(0,-1,0) + (1,0,0) = (1,2,0) & = \varphi(e_1) + \varphi(e_2) \\ \varphi(1,0,0,0) = [-2,1,0]_C = (1,2,0) & = \varphi(e_1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi(e_1) = (1,2,0), \varphi(e_2) = (0,0,0), \varphi(e_3) = (3,2,0) - (1,2,0) = (2,0,0) \\ \varphi(e_4) = (6,1,2) - (3,2,0) = (3,-1,2)$$

$$\varphi(x,y,z,t) = x\varphi(e_1) + y\varphi(e_2) + z\varphi(e_3) + t\varphi(e_4) = \\ = x(1,2,0) + y(0,0,0) + z(2,0,0) + t(3,-1,2) = (x+2z+3t, 2x-t, 2t)$$


## Zad. 9

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad f(x,y,z) = (x-y+z, 2y+z)$$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad g(x,y) = (2x+y, x-y)$$

$$h := g^2 \circ f$$

$$\text{N20R } h? \\ h(1,2,0) = ?$$



$$\bullet A = M_f(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = M_g(\mathcal{B}_k^2, \mathcal{B}_k^2) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$C = M_h(\mathcal{B}_k^3, \mathcal{B}_k^2) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 6 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$h(x,y,z) = ? \quad C \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5x-3y+6z \\ x+3y+3z \end{bmatrix} \quad h(x,y,z) = (5x-3y+6z, x+3y+3z)$$

$$\bullet h(1,2,0) = ? \quad C \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 6 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \end{bmatrix} \quad h(1,2,0) = (-1, 7)$$

## Zad. 10

Prawda / fałsz

$$\varphi: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x] \quad \text{endomorfizm}$$

a) Jeśli  $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ , to  $\varphi$  jest izomorfizmem.

PRAWDA

$$\text{Ker } \varphi = \{0\} \Rightarrow \varphi \text{ monomorfizm}$$

$$\dim \text{Im } \varphi = \dim \mathbb{R}_3[x] - \dim \text{Ker } \varphi = 4 - 0 = 4 \Rightarrow \text{Im } \varphi = \mathbb{R}_3[x] \\ \varphi \text{ epimorfizm}$$

b) Jeśli  $\text{Ker } \varphi = \{0\}$  to  $\{\varphi(1), \varphi(x), \varphi(x^2)\}$  jest liniowo niezależny

PRAWDA

$\text{Ker } \varphi = \{0\} \Rightarrow \varphi$  monomorfizm, więc przekształca układ liniowo niezależny  $\{1, x, x^2\}$  w układ lin. niezależny

$$c) A = M_\varphi(\mathcal{B}, \mathcal{B}) \quad \mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3)$$

Czy kwadratowa stopnia 3?

FAŁSZ

$$A \in M_4(\mathbb{R})$$