

Podręczniki:

M. Gewert, Z. Skoczylas,

„Analiza Matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory”

„Analiza Matematyczna 1, Przykłady i zadania”

W. Żakowski „Matematyka”, tom 1, EIT Politechnika Warszawska

G.M. Fichtenholz, „Rachunek różniczkowy i całkowy”, t. I, II, III

Zbiory zadań:

J. Banaś, S. Wędrychowicz, „Zbiór zadań z analizy matematycznej”

W. Stankiewicz „Analiza matematyczna dla wyższych uczelni technicznych”, t. IB

W. Kryszicki, L. Włodarski, „Analiza matematyczna w zadaniach” t. I i II

## LOGIKA

$p$	$q$	zaprzeczenie $\sim p$	alternatywa $p \vee q$	koniunkcja $p \wedge q$	implikacja $p \Rightarrow q$	równoważność $p \Leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1

**TW.**

Zał: ...

Teza: ...

co oznacza: Zał  $\Rightarrow$  Teza

**TW.**

Zał. ogólne:  $p$

Teza:  $q \Rightarrow r$

Mówimy wtedy, że  $q$  jest **warunkiem wystarczającym** (w skrócie **WW**) na  $r$ .

Ale można też wtedy powiedzieć, że  $r$  jest **warunkiem koniecznym** (w skrócie **WK**) na  $q$ .

**PRZ.**

**TW.**

Zał.:  $W(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  jest wielomianem o współczynnikach całkowitych  
 $p$  i  $q$  są liczbami całkowitymi

Teza: jeśli  $\frac{p}{q}$  jest pierwiastkiem  $W(x)$ , to  $p$  jest dzielnikiem  $a_0$  i  $q$  jest dzielnikiem  $a_n$

**TW.**

Zał. ogólne:  $p$

Teza:  $q \Leftrightarrow r$

Mówimy wtedy, że  $q$  jest **warunkiem koniecznym i wystarczającym** (w skrócie **WKW**) na  $r$ .

**PRZ.**

## TW.

Zał.:  $W(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  jest wielomianem,  $a$  jest liczbą rzeczywistą

Teza:  $a$  jest pierwiastkiem  $W(x)$  wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian  $W(x)$  jest podzielny przez  $x - a$

Przykłady ważnych **tautologii** (tzn. takich zdań złożonych dla których niezależnie od prawdziwości czy fałszywości zdań składowych całe zdanie złożone jest zawsze prawdziwe).

Prawo transpozycji:  $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$

Zaprzeczenie implikacji:  $\sim (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$

$p$	$q$	$p \Rightarrow q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim (p \Rightarrow q)$	$p \wedge \sim q$
0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

**Dowód nie wprost** opiera się na prawie transpozycji tzn. zaprzeczamy tezę twierdzenia i dochodzimy do sprzeczności z założeniami.

Aby pokazać, że hipoteza ("twierdzenie") nie jest prawdziwa korzystamy prawa zaprzeczenia implikacji i konstruujemy tzw. kontrprzykład czyli taki obiekt, który spełnia założenia i nie spełnia tezy tej hipotezy.

Prawa de Morgana:

$$\sim (p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p) \wedge (\sim q)$$

$$\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p) \vee (\sim q)$$

## KWANTYFIKATORY

- ogólny, duży  $\forall x \phi(x)$  (dla każdego  $x$  zachodzi  $\phi(x)$ )  
for All

- szczegółowy, mały  $\exists x \phi(x)$  (istnieje  $x$  dla którego zachodzi  $\phi(x)$ )  
there Exists

Np.  $\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad n \geq x$

Nie wolno zmieniać dowolnie kolejności różnego rodzaju kwantyfikatorów.

Np.  $\exists n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad n \geq x$

Prawo de Morgana dla kwantyfikatorów

$$\sim (\forall x \phi(x)) \Leftrightarrow \exists x \sim \phi(x)$$

$$\sim (\exists x \phi(x)) \Leftrightarrow \forall x \sim \phi(x)$$

Np.

$$\sim (\exists n \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R} n \geq x) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \exists x \in \mathbb{R} n < x$$

## TEORIA MNOGOŚCI

$\emptyset$  - zbiór pusty

suma zbiorów  $A \cup B \stackrel{df}{=} \{x : x \in A \vee x \in B\}$

przecięcie (wspólna część) zbiorów  $A \cap B \stackrel{df}{=} \{x : x \in A \wedge x \in B\}$

różnica zbiorów  $A \setminus B \stackrel{df}{=} \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$

iloczyn kartezjański zbiorów  $A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : \forall i \in \{1, \dots, n\} a_i \in A_i\}$$

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ razy}}$$

Oznaczenia zbiorów liczbowych

$\mathbb{N}$  - zbiór liczb naturalnych

$\mathbb{Z}$  - zbiór liczb całkowitych

$\mathbb{Q}$  - zbiór liczb wymiernych

$\mathbb{R}$  - zbiór liczb rzeczywistych

$\mathbb{C}$  - zbiór liczb zespolonych

## FUNKCJE

**DEF.**  $X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset$

Jeśli każdemu  $x \in X$  przyporządkowana jest dokładnie jedna wartość  $y \in Y$  to takie przyporządkowanie nazywamy funkcją.

$$f: X \ni x \longrightarrow y = f(x) \in Y$$

$$f: X \rightarrow Y$$

$$f \text{ jest funkcją} \Leftrightarrow \forall x \in X \exists! y \in Y \ y = f(x)$$

$X$  - zbiór argumentów, dziedzina funkcji, często oznaczany przez  $D$  lub  $D_f$

$Y$  - zbiór wartości, zbiór docelowy

$y = f(x)$  - wzór funkcji, równanie wykresu

$x$  - zmienna niezależna

$y$  - zmienna zależna

$\{(x, y) : x \in X, y = f(x)\}$  - wykres funkcji  $f \subset X \times Y$

Dziedzina naturalna - zbiór tych argumentów, dla których da się obliczyć wartość funkcji  $f$ .

Przeciwdziedzina funkcji

$$\mathcal{C}_f = \{f(x) : x \in D_f\}$$

**DEF.**  $f: X \rightarrow Y$

$f$  nazywamy różnowartościową (injekcją) na  $X \stackrel{\text{df}}{\Leftrightarrow}$

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad (x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$$

$$(\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in X \quad (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2))$$

**DEF.**  $f: X \rightarrow Y$  nazywamy surjeksią (funkcją „na”)  $\stackrel{\text{df}}{\Leftrightarrow} Y = \mathcal{C}_f$

$$\Leftrightarrow \forall y \in Y \exists x \in X \ y = f(x)$$

**PRZ.**  $f(x) = \sin x$

**DEF.**  $f: X \rightarrow Y$  nazywamy bijekcją  $\Leftrightarrow f$  jest injekcją i surjeksią.

**DEF.**  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  nazywamy ograniczoną z góry na zbiorze  $A \subset X \Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R} \forall x \in A \ f(x) \leq M$

$f: X \rightarrow \mathbb{R}$  nazywamy ograniczoną z dołu na zbiorze  $A \subset X \Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R} \forall x \in A \ f(x) \geq M$

$f$  nazywamy ograniczoną na  $A \stackrel{\text{df}}{\Leftrightarrow}$  gdy  $f$  jest ograniczona z góry i z dołu na  $A$

Monotoniczność funkcji ( $X \subseteq \mathbb{R}$ )!

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}$$

**DEF.**  $f$  jest rosnąca w  $A \subset X$   $\stackrel{\text{df}}{\Leftrightarrow} \forall x_1, x_2 \in A (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \underset{(>)}{<} f(x_2))$   
(malejąca)

**DEF.**  $f$  jest niemalejąca w  $A \subset X$   $\stackrel{\text{df}}{\Leftrightarrow} \forall x_1, x_2 \in A (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \underset{(\geq)}{\leq} f(x_2))$   
(nierosnąca)

**DEF.**  $f: X \rightarrow Y, \quad g: Y \rightarrow Z$

Złożeniem funkcji  $g$  i  $f$  nazywamy funkcję  $g \circ f: X \rightarrow Z$  taką, że

$$\forall x \in X \quad (g \circ f)(x) \stackrel{\text{df}}{=} g(f(x))$$

$f$  - funkcja wewnętrzna

$g$  - funkcja zewnętrzna

**PRZ.**  $f(x) = x^2, \quad g(x) = \cos x$   
 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \cos(x^2)$

**Uwaga.** Składanie funkcji nie jest przemienne!

**DEF.**  $f: X \rightarrow Y$  - bijekcja

Funkcją odwrotną do funkcji  $f$  nazywamy funkcję  $f^{-1}: Y \rightarrow X$  taką, że:

$$\forall y \in Y \quad f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow y = f(x)$$

**PRZ.** Wyznacz funkcję odwrotną do  $f(x) = x^3$ .

**Uwaga.** Wykresy funkcji i funkcji do niej odwrotnej są symetryczne względem prostej  $y = x$ .

Podstawowe funkcje elementarne:

1. Wielomiany  $W(x) = a_n x^n + \dots + a_0, \quad a_n \neq 0, \quad D = \mathbb{R}, \quad n$  - stopień wielomianu

2. Wymierne  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad P(x), Q(x)$  - wielomiany,  $D = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : Q(x) = 0\}$   
Szczególny przypadek.  $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$  - funkcja homograficzna,  $ad - bc \neq 0$

3. Potęgowe  $f(x) = x^r, \quad r \in \mathbb{R}$

dziedzina funkcji zależy od  $r$

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad D = [0, +\infty)$$

$$f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad D = \mathbb{R}$$

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}, \quad m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$$

$$x^{-r} = \frac{1}{x^r}$$

4. Wykładnicze  $f(x) = a^x, \quad a > 0, \quad a \neq 1$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

$$a > 1 \quad f(x) = a^x \text{ rosnąca}$$

$$a^{x_1} < a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 < x_2$$

$$0 < a < 1 \quad f(x) = a^x \text{ malejąca}$$

$$a^{x_1} < a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 > x_2$$

dla  $a > 0, a \neq 1 \quad f(x) = a^x$  różnowartościowa

$$a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

5. Logarytmiczne  $f(x) = \log_a x$ ,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$   
 $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$ , (zał.:  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $b > 0$ )  
 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$   
 $a > 1$   $f(x) = \log_a x$  rosnąca  
 $\log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 < x_2$

$0 < a < 1$   $f(x) = \log_a x$  malejąca  
 $\log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 > x_2$

dla  $a > 0$ ,  $a \neq 1$   $f(x) = \log_a x$  różnowartościowa  
 $\log_a x_1 = \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$

Przy odpowiednich założeniach zachodzą:

(a)  $\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c)$   
 $\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$

(b)  $\log_a b^k = k \log_a b$

(c)  $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

logarytm naturalny

$\ln x = \log_e x$

$e = 2,71 \dots$  - stała Eulera

$a = e^{\ln a}$  dla  $a > 0$

$a^x = e^{\ln a \cdot x}$

## 6. Trygonometryczne

### 7. Cyklometryczne (odwrotne do trygonometrycznych)

$\sin: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$

$\arcsin: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$y = \arcsin x$ ,  $x \in [-1, 1] \Leftrightarrow \sin y = x \wedge y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

**PRZ.**

$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$  bo  $\sin \frac{\pi}{2} = 1$

$\arcsin 2$  - nie istnieje

$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$  bo  $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

arccos:

$\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$

$\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$

$y = \arccos x$ ,  $x \in [-1, 1] \Leftrightarrow x = \cos y \wedge y \in [0, \pi]$

arctg:

$\text{tg}: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$

$\text{arctg}: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$y = \text{arctg} x$ ,  $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x = \text{tgy} \wedge y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Analogicznie definiujemy arctctg

Podstawowe tożsamości:

$$1) \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in [-1, 1]$$

$$2) \operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$3) \sin(\arcsin x) = x \quad \forall x \in [-1, 1]$$

$$\arcsin(\sin x) = x \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

8. Złożenie, suma, różnica, iloczyn, iloraz dowolnej (skończonej) liczby funkcji elementarnych jest funkcją elementarną.

**PRZ.** Czy  $f(x) = x^x$  jest funkcją elementarną?

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln(f(x))}, \quad f(x) > 0$$

## CIĄGI LICZBOWE

**DEF.**  $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  - funkcja określona na zbiorze liczb naturalnych

$$a: \mathbb{N} \ni n \rightarrow a(n) \in \mathbb{R}$$

$$a(n) =: a_n$$

Ozn.  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  - ciąg

**DEF.** Ciąg  $(a_n)$  jest rosnący  $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} a_{n+1} > a_n$

Ciąg  $(a_n)$  jest niemalejący  $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} a_{n+1} \geq a_n$

Ciąg  $(a_n)$  jest malejący  $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} a_{n+1} < a_n$

Ciąg  $(a_n)$  jest nierosnący  $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} a_{n+1} \leq a_n$

Ciąg  $(a_n)$  jest ograniczony z góry  $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} a_n \leq M$

(z dołu)  $\exists m \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (a_n \geq m)$

$(a_n)$  jest ograniczony  $\Leftrightarrow (a_n)$  jest ograniczony z dołu i z góry

**PRZ.** Czy ciąg o wyrazie ogólnym  $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$  jest monotoniczny? Czy jest ograniczony?

**DEF.** (Cauchy'ego granicy właściwej ( $g \in \mathbb{R}$ ) ciągu)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g \stackrel{\text{df}}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 |a_n - g| < \varepsilon$$

**PRZ.**  $a_n = \frac{1}{n} \quad g = 0$

**DEF.** (granicy niewłaściwej  $+\infty$ )

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 a_n > M$$

Ciąg, który nie ma granicy nazywamy niezbieżnym.

**TW.** (o jednoznaczności granicy)

Jeśli ciąg posiada granicę, to tylko jedną.

**TW.** (o zachowaniu słabej nierówności)

$$(\exists M \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 a_n \leq M \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g) \Rightarrow \underset{(\geq)}{g} \leq \underset{(g \geq A)}{A}$$

**PRZ.**  $a_n = \frac{1}{n}$

$\forall n \in \mathbb{N} a_n > 0 \Rightarrow g > 0$ ? nie!

**TW.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$

**TW.** Zał.  $a_n = a_0 q^n$  - ciąg geometryczny, gdzie  $|q| < 1$   
Teza:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_0 q^n = 0$

**TW.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

**TW.** 1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0$   
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

**PRZ.** Oblicz  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n}$

**TW.** (o działaniach arytmetycznych na ciągach)

Zał.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

Wtedy:

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n (= a \pm b)$
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n (= a \cdot b)$
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} (= \frac{a}{b})$  (o ile  $\forall n \in \mathbb{N} b_n \neq 0$  oraz  $b \neq 0$ ).

**PRZ.** Oblicz  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3n + 4}{4n^3 - 2n^2 + 3n + 5}$

**PRZ.** Oblicz  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} - 3^n}{5 \cdot 3^n - 4^n}$

**TW.** (o ciągu monotonicznym i ograniczonym)

Każdy ciąg monotoniczny i ograniczony jest zbieżny (do granicy właściwej)

$$[\exists M \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 (a_n \leq M \wedge (a_{n+1} \geq a_n))] \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g (\leq M)$$

(ciąg ograniczony od góry od pewnego indeksu i niemalejący od pewnego indeksu)

Analogicznie dla ciągu malejącego (nierosnącego) i ograniczonego od dołu.

**TW.** (zasada indukcji matematycznej)

Zał:

1.  $T(1)$
2.  $\forall n \in \mathbb{N} (T(n) \Rightarrow T(n+1))$

Teza:  $\forall n \in \mathbb{N} T(n)$ .

**PRZ.** Pokaż, że ciąg rekurencyjny jest zbieżny i oblicz jego granicę.

$$a_1 = 1$$

$$\forall n \in \mathbb{N} a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

**TW.** (o trzech ciągach)

Zał:

1.  $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \quad a_n \leq b_n \leq c_n$

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$

Teza:  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = g$

**PRZ.** Oblicz granicę ciągu  $b_n = \sqrt[n]{n+2^n}$ .

**TW.** (o ciągu ograniczonym i zbieżnym do 0)

Zał:

1.  $(a_n)$  - ograniczony

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

Teza:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = 0$

**PRZ.** Oblicz granicę ciągu  $\frac{n^2 \sin n}{n^3 + 2n - 1}$

**TW.**

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2,718\dots$  - stała Eulera

2. Jeśli  $a_n \rightarrow +\infty$  to  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$ .

**Ćw.** Pokaż, że ciąg  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  jest rosnący i ograniczony od góry (przez 3).

Symbole nieoznaczone (7)

$\left[\frac{0}{0}\right], \left[\frac{\infty}{\infty}\right], [\infty - \infty], [0 \cdot \infty], [1^\infty], [0^0], [\infty^0]$

**PRZ.**

$[\infty - \infty] \quad \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \rightarrow 1$

$[\infty^0] \quad \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$

$[0^0] \quad \sqrt[n]{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$

$[0^0] \quad \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} \rightarrow 0$

**PODCIĄGI**

**DEF.**  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  - ciąg

Niech  $\mathbb{N} \ni k \rightarrow n_k \in \mathbb{N}$  rosnący ciąg liczb naturalnych

$(n_{k+1} > n_k) \forall k \in \mathbb{N}$

Ciąg  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  nazywamy **podciągiem** ciągu  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**PRZ.**  $a_n : 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$

$n_k : 2, 4, 6, \dots$  czyli  $n_k = 2k$

$a_{n_k} : \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots$

$(a_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ , gdzie  $a_{2k} = \frac{1}{2k}$



**TW.** Jeśli  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$ , to dla każdego podciągu  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  ciągu  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  zachodzi  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = g$   
(Jeśli ciąg jest zbieżny do  $g$ , to każdy podciąg tego ciągu też jest zbieżny do  $g$ ).

**WN.** Jeśli istnieją dwa podciągi  $(a_{n_k}), (a_{n_i})$  ciągu  $(a_n)$  takie, że  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \neq \lim_{i \rightarrow \infty} a_{n_i}$  to ciąg  $(a_n)$  nie jest zbieżny.

**PRZ.** Pokaż, że ciąg  $a_n = \cos n\pi$  nie jest zbieżny.

**TW.** (Bolzano-Weierstrassa)

Jeśli ciąg jest ograniczony, to ma podciąg zbieżny (do granicy właściwej).

**PRZ.** Z ciągu  $a_n = n$  nie da się wybrać podciągu zbieżnego (do granicy właściwej).

**DEF. Granicą górną** ciągu  $(a_n)$  (limes superior ciągu  $a_n$ ) nazywamy  
 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{g : g \text{ jest granicą podciągu zbieżnego ciągu } (a_n)\}$   
**Granicą dolną** ciągu  $(a_n)$  (limes inferior ciągu  $a_n$ ) nazywamy  
 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{g : g \text{ jest granicą podciągu zbieżnego ciągu } (a_n)\}$

**PRZ.** Oblicz granicę górną i dolną ciągu  $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$ .

## GRANICA FUNKCJI

**DEF.** Otoczeniem punktu  $x_0 \in \mathbb{R}$  o promieniu  $r > 0$  nazywamy przedział  $(x_0 - r, x_0 + r)$  i oznaczamy przez  $U(x_0, r)$ .

Sąsiedztwem punktu  $x_0 \in \mathbb{R}$  o promieniu  $r > 0$  nazywamy  $(x_0 - r, x_0) \cup (x_0, x_0 + r)$  i oznaczamy przez  $S(x_0, r)$ .

$S^+(x_0, r) = (x_0, x_0 + r)$  - sąsiedztwo prawostronne punktu  $x_0$

$S^-(x_0, r) = (x_0 - r, x_0)$  - sąsiedztwo lewostronne punktu  $x_0$ .

Zbiór wszystkich otoczeń punktu  $x_0$  oznaczamy przez  $ot(x_0)$ .

Otoczeniem (sąsiedztwem)  $+\infty$  nazywamy przedział postaci  $(K, +\infty)$ , gdzie  $K \in \mathbb{R}$  i oznaczamy przez  $U(+\infty, K)$ .

Analogicznie, otoczeniem (sąsiedztwem)  $-\infty$  nazywamy przedział postaci  $(-\infty, K) = U(-\infty, K)$ .

**DEF.** (Heinego granicy funkcji)

$f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, D_f \subset \mathbb{R}$

$x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$

$f$  jest określona w pewnym sąsiedztwie punktu  $x_0$

$g \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g \iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  spełniającego:

1.  $\forall n \in \mathbb{N} x_n \in D_f$

2.  $\forall n \in \mathbb{N} x_n \neq x_0$

3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

zachodzi  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = g$

**PRZ.** Oblicz  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ .

**DEF.** (granic jednostronnych)

Granica lewostronna funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$ :

$f$  jest określona w pewnym lewostronnym sąsiedztwie punktu  $x_0$

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = g \Leftrightarrow \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  spełniającego:

1.  $x_n \in D_f$
2.  $x_n < x_0$
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

zachodzi  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = g$

Analogicznie definiujemy granicę prawostronną funkcji  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ .

**TW.** (WKW na istnienie granicy)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = g$ .

( $f$  ma granicę wtedy i tylko wtedy gdy  $f$  ma obie granice jednostronne i są one równe)

**PRZ.**  $f(x) = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

**TW.** (o arytmetyce granic funkcji)

Zał:

$f, g$  są określone w sąsiedztwie  $x_0$  oraz  $f$  i  $g$  mają granice w  $x_0$ .

Wtedy:

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
3.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$  (o ile w pewnym sąsiedztwie  $x_0$   $g(x) \neq 0$  oraz  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$ ).

Uwaga. Twierdzenie powyższe zachodzi również w przypadku granic jednostronnych.

**PRZ.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 5^x - 2^x}{3^x - 4 \cdot 5^x}$   
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{1-x}}$

**TW.** (o trzech funkcjach)

Zał.

1.  $f, g, h$  są określone na pewnym sąsiedztwie  $S$  punktu  $x_0$
2.  $\forall x \in S f(x) \leq g(x) \leq h(x)$

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = g$$

Teza:  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g$

**PRZ.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$

**TW.** Jeżeli  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$  i  $g$  jest ograniczona w pewnym sąsiedztwie  $x_0$ , to

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = 0.$$

Uwaga. Powyższe 3 twierdzenia zachodzą również w przypadku granic jednostronnych.

**TW.** (granice specjalne)

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad a > 0$$

$$4. \text{Jeśli } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty(-\infty), \text{ to } \lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$$

**PRZ.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$

**TW.** (o granicy funkcji złożonej  $g(f(x))$ )

Zał:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$

$$\forall x \in S(x_0, r) \quad f(x) \neq y_0$$

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = z_0$$

Teza:  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = z_0$

## CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI

**DEF.**  $f$  określona w otoczeniu punktu  $x_0 \in D_f$

$$f \text{ jest ciągła w } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

$$f \text{ jest lewostronnie (prawostronnie) ciągła w } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^- (x_0^+)} f(x) = f(x_0)$$

**PRZ.** Czy  $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$  jest ciągła w 0?

**PRZ.** Dla jakiej wartości parametru  $a$  funkcja  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 5x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$

jest ciągła w 0?

**TW.** (o działaniach na funkcjach ciągłych)

1. Suma, różnica, iloczyn funkcji ciągłych w punkcie  $x_0$  jest funkcją ciągłą w  $x_0$ .

Iloraz  $\frac{f(x)}{g(x)}$  funkcji ciągłych jest ciągły w  $x_0$  (o ile  $g(x) \neq 0$  w pewnym otoczeniu punktu  $x_0$ ).

2. Jeśli  $f$  jest ciągła w  $x_0$  i  $g$  jest ciągła w  $y_0 = f(x_0)$ , to złożenie funkcji  $g \circ f$  jest ciągłe w  $x_0$ .

**DEF.**  $f$  jest ciągła na zbiorze  $A \subset D_f \Leftrightarrow \forall x_0 \in A$   $f$  jest ciągła w  $x_0$ .

Ozn.  $C(A)$  - zbiór wszystkich funkcji ciągłych na zbiorze  $A$   
 $f \in C(A) \Leftrightarrow f$  jest ciągła na zbiorze  $A$

**TW.** Wszystkie funkcje **elementarne są ciągłe** na swoich dziedzinach.

**PRZ.**  $f(x) = \log_2(x^2 \cos x)$

Własności funkcji ciągłych.

**TW.** (o lokalnym zachowaniu znaku)

Zał: 1.  $f$  jest określona w pewnym otoczeniu punktu  $x_0$

2.  $f$  jest ciągła w  $x_0$

3.  $f(x_0) > 0$   
( $<$ )

Wtedy istnieje takie otoczenie  $U$  punktu  $x_0$ , że  $\forall x \in U$   $f(x) > 0$   
( $<$ )

**TW.** (o własności Darboux)

$f \in C([a, b]) \wedge f(a) \neq f(b)$

$c$  - dowolna liczba pomiędzy  $f(a)$  i  $f(b)$

Teza: istnieje takie  $x_0 \in (a, b)$ , że  $f(x_0) = c$ .

**PRZ.** Każdy wielomian nieparzystego stopnia ma przynajmniej jeden pierwiastek rzeczywisty.

**TW.** (Weierstrassa o osiągnięciu kresów)

Jeżeli funkcja  $f$  jest ciągła na przedziale domkniętym  $[a, b]$ , to istnieje

1.  $x_1 \in [a, b]$ ,  $f(x_1) = \inf\{f(x) : x \in [a, b]\}$  - wartość najmniejsza funkcji  $f$  na  $[a, b]$

2.  $x_2 \in [a, b]$ ,  $f(x_2) = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\}$  - wartość największa funkcji  $f$  na  $[a, b]$

**PRZ.**  $f(x) = x$  na  $(0, 1)$  nie osiąga swoich kresów (nie ma wartości najmniejszej ani największej)

## RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ

**DEF.**  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D_f$

$f$  określona na pewnym otoczeniu  $U$  punktu  $x_0$  ( $x_0 \in U \subset D_f$ )

Jeśli istnieje granica właściwa  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ , to mówimy, że funkcja  $f$  jest różniczkowalna w punkcie  $x_0$ . Wartość tej granicy oznaczamy przez  $f'(x_0)$  i nazywamy **pochodną** funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$ .

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Inny zapis:  $h = x - x_0, \quad x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow h \rightarrow 0$

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Inny zapis:  $f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)$

**PRZ.**  $s(t)$ -położenie punktu w chwili  $t$

$\frac{s(t_1) - s(t_0)}{t_1 - t_0}$  - prędkość średnia w czasie od  $t_0$  do  $t_1$

$\lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{s(t_1) - s(t_0)}{t_1 - t_0} = s'(t_0) = v(t_0)$  - prędkość chwilowa w chwili  $t_0$

$\lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{Q(t_1) - Q(t_0)}{t_1 - t_0} = I(t_0)$  - natężenie prądu w chwili  $t_0$

**PRZ.** Oblicz pochodną funkcji  $f(x) = \sqrt{x}$  w  $x_0 \in D_f$ .

**PRZ.** Oblicz pochodną funkcji  $f(x) = |x|$  w  $x_0 = 0$ .

**DEF.** Niech  $f$  będzie określona przynajmniej w pewnym w lewostronnym otoczeniu

$U^- = (x_0 - \delta, x_0]$  punktu  $x_0$ .

Pochodną lewostronną funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$  nazywamy  $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  (o ile jest to granica właściwa).

Analogicznie definiujemy pochodną prawostronną w punkcie.

**TW.** (WKW istnienia pochodnej w punkcie)

$$f'(x_0) = g \Leftrightarrow f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = g$$

Funkcja  $f$  ma pochodną w punkcie  $x_0 \Leftrightarrow$  pochodne jednostronne w punkcie  $x_0$  istnieją i są sobie równe.

**TW.** (WK istnienia pochodnej)

Jeśli  $f$  jest różniczkowalna w  $x_0$ , to  $f$  jest ciągła w  $x_0$ .

**Dowód:**  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0$ .

Zatem  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  więc  $f$  jest ciągła w  $x_0$ .

**PRZ.** Czy  $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$  jest różniczkowalna w  $x_0 = 0$ ?

**PRZ.** Czy  $f(x) = |x|$  jest różniczkowalna w  $x_0 = 0$ ?

**TW.** (interpretacja geometryczna pochodnej)

Funkcja  $f$  jest różniczkowalna w  $x_0 \Leftrightarrow$  istnieje styczna do wykresu funkcji  $f$  w punkcie  $(x_0, f(x_0))$ .

Ponadto:

1.  $\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$ , gdzie  $\alpha$  jest kątem pomiędzy dodatnim kierunkiem osi OX, a prostą styczną,
2.  $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$  jest równaniem stycznej do wykresu funkcji  $f$  w punkcie  $(x_0, f(x_0))$ .

**PRZ.** Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji  $f(x) = \sqrt{x}$  w punkcie  $x_0 = 1$ .

Wzory na pochodne ważniejszych funkcji elementarnych.

$$(c)' = 0$$

$$(x^r)' = rx^{r-1}, \quad r \in \mathbb{R}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \operatorname{ctg}^2 x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

**DEF.** Mówimy, że  $f$  jest różniczkowalna na zbiorze  $A \Leftrightarrow f$  jest różniczkowalna w każdym punkcie  $x \in A$ .

**DEF.** Jeśli  $f$  jest różniczkowalna na zbiorze  $A$ , to funkcję  $f' : A \rightarrow \mathbb{R}$  nazywamy **funkcją pochodną** funkcji  $f$ .

$$f' : A \ni x \rightarrow f'(x) \in \mathbb{R}$$

**PRZ.** Funkcją pochodną funkcji  $f(x) = \sqrt{x}$  jest funkcja  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  (dla  $x > 0$ ).

**TW.** (o działaniach arytmetycznych na pochodnych)

Zał.  $f$  i  $g$  różniczkowalne w  $x$

Teza

1.  $(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$ ,  $c$  - stała  $\in \mathbb{R}$

2.  $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$

3.  $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

4.  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$  (o ile  $g$  jest różna od 0 w pewnym otoczeniu punktu  $x$ ).

**Dowód:** 3)

$$\begin{aligned} [f(x) \cdot g(x)]' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot g(x+h) + f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \end{aligned}$$

**PRZ.** Oblicz  $\left(\frac{e^x \sin x}{x^2}\right)'$

**TW.** (o pochodnej funkcji złożonej)

Zał.

$f$  - różniczkowalna w  $x_0$

$g$  - różniczkowalna w  $y_0 = f(x_0)$

Teza:  $g \circ f$  jest różniczkowalna w  $x_0$  i  $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

**PRZ.** Oblicz pochodne funkcji:

$$h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$h(x) = \cos^5 3x$$

$$h(x) = x^x$$

$$h(x) = \cos x^{\sin x}$$

$$h(x) = x^{(x^x)}$$

**TW.** (o pochodnej funkcji odwrotnej)

Zał:

1.  $f : U \rightarrow V$  jest bijekcją,  
gdzie  $U$  jest otoczeniem punktu  $x_0$  oraz  $V$  jest otoczeniem punktu  $y_0 = f(x_0)$ ,
2.  $f$  jest różniczkowalna w  $x_0$ ,
3.  $f'(x_0) \neq 0$ ,

Teza:  $f^{-1}$  jest różniczkowalna w  $y_0 = f(x_0)$  oraz  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ .

**PRZ.** Oblicz  $(\arctg x)'$  korzystając z tw. o pochodnej funkcji odwrotnej.

c. d. wzorów podstawowych na pochodne:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad x \in (-1, 1)$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad x \in (-1, 1)$$

$$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\text{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

**Uwaga.** Pochodne funkcji elementarnych są funkcjami elementarnymi.

**Spostrzeżenie**

$$f(x) \cong f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \text{ dla } x \text{ bliskich } x_0.$$

**PRZ.** Oblicz przybliżoną wartość  $\arctg 1,05$

**DEF.** (druga pochodna funkcji)

$f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  różniczkowalna w otoczeniu  $U$  punktu  $x_0$

$f' : U \ni x \rightarrow f'(x) \in \mathbb{R}$

Drugą pochodną (pochodną 2-go rzędu) funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$  nazywamy

$$f''(x_0) \stackrel{df}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \text{ (o ile istnieje).}$$

Prościej:  $f''(x) = (f'(x))'$ .

Ogólnie. Jeśli istnieje pochodna rzędu  $(n-1)$ -go funkcji  $f$  w otoczeniu punktu  $x$ , to **pochodna rzędu  $n$ -tego** jest równa  $f^{(n)}(x) \stackrel{df}{=} \left(f^{(n-1)}(x)\right)'$ .

Oznaczenia:

$$A \subseteq \mathbb{R}$$

$D^n(A)$  - zbiór funkcji  $n$ -krotnie różniczkowalnych na  $A$

$C^n(A)$  - zbiór funkcji  $n$ -krotnie różniczkowalnych na  $A$  i takich, że  $f^{(n)}$  jest ciągła na  $A$

$$C^n(A) \subset D^n(A)$$

**PRZ.**

Wyznacz wzór na  $n$ -tą pochodną funkcji  $f(x) = \ln x$ .

**TW.** (o zerowaniu się pochodnej w punkcie, w którym funkcja przyjmuje wartość ekstremalną)

Zał:

1.  $f \in C([a, b])$
2.  $f \in D((a, b))$
3. istnieje takie  $x_0 \in (a, b)$ , że  $f(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$  lub  $f(x_0) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$

Teza:  $f'(x_0) = 0$

**Dowód:** Pokażemy dla przypadku, gdy  $f(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \stackrel{?}{=} 0$$

Ip.

$$x < x_0 \Leftrightarrow x - x_0 < 0$$

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ bo } f(x_0) - \max$$

$$f(x) - f(x_0) \leq 0$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \text{ (co wynika z twierdzenia zachowaniu nierówności dla funkcji)}$$

$$f'_-(x_0) \geq 0$$

IIp.

$$x > x_0 \Leftrightarrow x - x_0 > 0$$

$$f(x) - f(x_0) \leq 0$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$f'_+(x_0) \leq 0$$

$$f'_-(x_0) \geq 0 \wedge f'_+(x_0) \leq 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0. \quad \square$$

**TW.** (Rolle'a)

Zał:

1.  $f \in C([a, b])$



$$2. f \in D((a, b))$$

$$3. f(a) = f(b)$$

$$\text{Teza: } \exists c \in (a, b) \quad f'(c) = 0.$$

**Dowód:**

I  $f$  jest stała na  $[a, b]$  tzn.  $\forall x \in [a, b] f(x) = f(a) \Rightarrow f'(c) = 0 \quad \forall c \in (a, b)$ .

II  $f(x)$  nie jest stała  $\xrightarrow{\text{Tw. Weierstrassa}} \exists c \in (a, b) f(c) = \max_{x \in [a, b]} f(x) \vee f(c) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$

z poprzedniego Tw.  $f'(c) = 0$ .  $\square$

**TW. (Lagrange'a)**

Zał:

$$1. f \in C([a, b])$$

$$2. f \in D((a, b))$$

$$\text{Teza: } \exists c \in (a, b) f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**Dowód:** Stosujemy twierdzenie Rolle'a do funkcji  $h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$  na  $[a, b]$ .

$$h(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = f(a)$$

$$h(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a)$$

$$\Rightarrow h(a) = h(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) h'(c) = 0$$

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot 1$$

$$0 = h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Leftrightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \square$$

**TW. (Cauchy'ego)**

$$1. f, g \in C([a, b])$$

$$2. f, g \in D((a, b))$$

$$3. \forall x \in (a, b) g'(x) \neq 0$$

$$\text{Wtedy } \exists c \in (a, b) \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a i Cauchy'ego nazywamy **twierdzeniami o wartości średniej** rachunku różniczkowego.

**TW. (reguła de L'Hospitala)**

Zał:

$$1. f \text{ i } g \text{ są różniczkowalne pewnym sąsiedztwie } S \text{ punktu } x_0$$

$$2. \forall x \in S g(x) \neq 0 \wedge g'(x) \neq 0$$

$$3. \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \wedge \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \right) \text{ lub } \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty \wedge \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty \right)$$

$$4. \text{ istnieje } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\text{Teza: istnieje } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

**Uwaga.** Twierdzenie de L'Hospitala można stosować do granic niewłaściwych i do granic jednostronnych.

**PRZ.** obliczyć granice:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$

**TW.** (warunki wystarczające monotoniczności funkcji)

Niech  $f$  będzie funkcją różniczkowalną na przedziale  $I = (a, b)$ .

Jeśli  $\forall x \in I$ :

1.  $f'(x) = 0$ , to  $f$  jest stała w  $I$
2.  $f'(x) > 0$ , to  $f$  jest rosnąca na  $I$
3.  $f'(x) \geq 0$ , to  $f$  jest niemalejąca na  $I$
4.  $f'(x) < 0$ , to  $f$  jest malejąca na  $I$
5.  $f'(x) \leq 0$ , to  $f$  jest nierosnąca na  $I$

**Dowód:** 2)

$$x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$$

$$\text{z tw. Lagrange'a } \exists c \in (x_1, x_2) f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$f'(c) > 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$$

$$x_2 - x_1 > 0 \Leftrightarrow f(x_2) - f(x_1) > 0$$

$$f(x_2) > f(x_1) \quad \square$$

**PRZ.** Czy  $f(x) = \frac{1}{x}$  jest malejąca na całej dziedzinie?

**PRZ.** Pokazać, że  $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \forall x \in [-1, 1]$

**EKSTREMA LOKALNE** funkcji

**DEF.** Niech  $f$  będzie określona w pewnym otoczeniu  $U$  punktu  $x_0$ .

Mówimy, że  $f$  ma w punkcie  $x_0$  (minimum) maksimum lokalne  $\Leftrightarrow$  istnieje takie sąsiedztwo  $S(x_0, \delta) \subset U$ ,

w którym  $\forall x \in S(x_0, \delta) f(x) \underset{(>)}{<} f(x_0)$

**TW.** (Fermata, warunek konieczny istnienia ekstremum)

Zał:

1.  $f$  przyjmuje ekstremum lokalne w  $x_0$
2.  $f$  jest różniczkowalna w  $x_0$

Teza:  $f'(x_0) = 0$

**Dowód:** Analogiczny do dowodu twierdzenia o zerowaniu się pochodnej w punkcie, w którym funkcja osiąga wartość ekstremalną.

**TW.** (I warunek wystarczający istnienia ekstremum lokalnego)

1.  $f$  jest różniczkowalna w pewnym otoczeniu  $U$  punktu  $x_0$
2.  $f'(x_0) = 0$
3. istnieje takie sąsiedztwo  $S(x_0, \delta)$ , że:
  - a. jeśli  $(\forall x \in S^-(x_0, \delta) f'(x) > 0$  oraz  $\forall x \in S^+(x_0, \delta) f'(x) < 0)$  to  $f$  przyjmuje w  $x_0$  maksimum lokalne,
  - b. jeśli  $(\forall x \in S^-(x_0, \delta) f'(x) < 0$  oraz  $\forall x \in S^+(x_0, \delta) f'(x) > 0)$  to  $f$  przyjmuje w  $x_0$  minimum lokalne.

**Dowód:** (wynika z tw. Lagrange'a).

**PRZ.**  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

**Ekstrema globalne**

**PRZ.** Wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji  $f(x) = x^3|x+2|$  osiąganą na przedziale  $[-4, 1]$ .

**Spostrzeżenie** Jeśli  $f$  jest ciągła na przedziale domkniętym, to aby wyznaczyć wartość największą i najmniejszą wystarczy wziąć pod uwagę wartości funkcji osiąmane w punktach:

- a) w których pochodna jest równa 0,
- b) w których funkcja nie jest różniczkowalna,
- c) które są końcami przedziału.

**PRZ.** Wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji  $f(x) = x^x$  osiąganą na całej dziedzinie.

**TW.** (Taylora)

Zał:

1.  $U$  - otoczenie punktu  $x_0$
2.  $x \in U$
3.  $f \in C^n(U)$

Teza:  $\exists c \in (x_0, x)$

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + R_n(x_0, x),$$

gdzie  $R_n(x_0, x) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-x_0)^n$  - reszta Lagrange'a we wzorze Taylora

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R_n(x_0, x), \text{ (gdzie przyjmujemy, że } f^{(0)}(x) = f(x))$$

Inny zapis wzoru Taylora:  $h = x - x_0$

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}h^{n-1} + R_n(x_0, x),$$

gdzie  $R_n(x_0, x) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}h^n$

Inny zapis reszty Lagrange'a:

$$\exists \theta \in (0, 1) R_n(x) = \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{n!}(x-x_0)^n$$

Jeśli  $x_0 = 0$ , to wzór Taylora nazywany jest wzorem **Maclaurina**.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}x^n \quad c \in (0, x)$$

**DEF.** Wielomian  $W(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}$  nazywamy wielomianem Taylora dla funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$

**Spostrzeżenie**  $\forall k = 0, \dots, n-1 \quad W^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$

**WN.** 1.  $f(x) \cong W(x) \quad \forall x \in U$

$$2. |f(x) - W(x)| = |R_n(x)| \quad \forall x \in U$$

**PRZ.** Oblicz  $\sqrt[10]{e}$  z dokładnością do  $10^{-4}$ .

**PRZ.** Wyznacz dokładność wzoru przybliżonego  $\sin x \cong x - \frac{x^3}{6}$  dla  $|x| \leq 0, 1$ .

**TW.** (II warunek wystarczający istnienia ekstremum lokalnego)

Zał:

1.  $U$  - otoczenie punktu  $x_0$

2.  $f \in C^2(U)$

3.  $f'(x_0) = 0$

Teza:

1. Jeśli  $f''(x_0) > 0$ , to  $f$  przyjmuje minimum lokalne w  $x_0$ .

2. Jeśli  $f''(x_0) < 0$ , to  $f$  przyjmuje maksimum lokalne w  $x_0$ .

**Dowód:** 1) z tw. Taylora

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(c)(x - x_0)^2, \quad c \in (x_0, x)$$

$$f(x) = f(x_0) + f''(c)(x - x_0)^2$$

Jeśli  $f''(x_0) > 0$ , to ponieważ  $f''$  jest ciągła, to  $f''$  zachowuje znak w pewnym otoczeniu  $U'$  punktu  $x_0$ . Stąd:

$$\forall x \in U' \quad f''(c) > 0, \quad c \in (x_0, x)$$

$$\Rightarrow f(x) = f(x_0) + \underset{>0}{f''(c)}(x - x_0)^2 \Rightarrow f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in U', \quad x \neq x_0$$

$\Rightarrow$  w  $x_0$   $f$  przyjmuje minimum lokalne

**TW.**

Zał:

1.  $U$  - otoczenie punktu  $x_0$
2.  $f \in C^{2n}(U)$
3.  $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(2n-1)}(x_0) = 0$

Teza:

1. Jeśli  $f^{(2n)}(x_0) > 0$ , to  $f$  w  $x_0$  przyjmuje minimum lokalne.
2. Jeśli  $f^{(2n)}(x_0) < 0$ , to  $f$  w  $x_0$  przyjmuje maksimum lokalne.

**PRZ.** Pokaż, że  $f(x) = x^4$  ma minimum lokalne w 0.

**Funkcje wypukłe i wklęsłe**

**DEF.**

$I$  - przedział  $\subset \mathbb{R}$ ,  $I \subset D_f$

Funkcję  $f$  nazywamy wypukłą w  $I \Leftrightarrow$  gdy nadwykres funkcji  $f$  czyli  $\{(x, y) : x \in I, y \geq f(x)\}$  jest zbiorem wypukłym.

Funkcję  $f$  nazywamy wklęsłą w  $I \Leftrightarrow$  gdy nadwykres funkcji  $-f$  czyli jest zbiorem wypukłym.

**DEF.**  $f$  jest różniczkowalna w  $I = (a, b)$

$f$  jest ściśle wypukła w  $I \Leftrightarrow$

$$\forall x_0 \in I \quad \forall x \in I, \quad x \neq x_0 \quad f(x) \underset{(<)}{>} f(x_0) + \underset{(\text{wklęsła})}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

**TW.** (warunek wystarczający wypukłości i wklęsłości funkcji)

Zał.  $f \in C^2(I)$ ,

Teza:

1. Jeśli  $\forall x \in I \quad f''(x) > 0$ , to  $f$  jest wypukła w  $I$ .
2. Jeśli  $\forall x \in I \quad f''(x) < 0$ , to  $f$  jest wklęsła w  $I$ .

**Dowód:** 1) z tw. Taylora:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(c)}{2!}(x - x_0)^2, \quad x \in I, \quad c \in (x_0, x), \quad c \in I,$$

$$f''(c) > 0, \quad R_2(x) > 0 \quad \forall x \neq x_0, \quad x \in I$$

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

**DEF.**

$f$  jest określona w pewnym otoczeniu  $U$  punktu  $x_0$ ,

$f$  jest ciągła w  $x_0$ ,

Mówimy, że punkt  $(x_0, f(x_0))$  jest punktem przegięcia funkcji  $f \Leftrightarrow$  w jednym sąsiedztwie jednostronnym punktu  $x_0$  funkcja  $f$  jest wypukła, a w drugim wklęsła.

**PRZ.**  $f(x) = x^3$

**TW.** (warunek konieczny istnienia punktu przegięcia)

Zał:

1.  $U$  - otoczenie punktu  $x_0$
2.  $f \in C^2(U)$
3. punkt  $(x_0, f(x_0))$  jest punktem przegięcia funkcji  $f$

Teza:  $f''(x_0) = 0$

**TW.** (warunek wystarczający istnienia punktu przegięcia)

Zał:

1.  $f$  jest określona w pewnym otoczeniu  $U$  punktu  $x_0$ ,
2.  $f$  jest klasy  $C^2$  na pewnym sąsiedztwie  $S$  punktu  $x_0$ ,
3.  $f$  jest ciągła w  $x_0$ ,
4.  $\exists S^-(x_0, \delta) \forall x \in S^-(x_0, \delta) \quad f''(x) \underset{(<)}{>} 0$  oraz  
 $\exists S^+(x_0, \delta) \forall x \in S^+(x_0, \delta) \quad f''(x) \underset{(>)}{<} 0$

Teza:  $f$  ma w punkcie  $x_0$  punkt przegięcia

**PRZ.**  $f(x) = e^{-x^2}$

**Asymptoty**

**DEF.** Mówimy, że prosta  $x = x_0$  jest **asymptotą pionową lewostronną** funkcji  $f \Leftrightarrow$

1.  $f$  jest określona w pewnym lewostronnym sąsiedztwie punktu  $x_0$
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$

Analogicznie określamy asymptotę pionową **prawostronną**.

Jeśli prosta  $x = x_0$  jest asymptotą pionową lewostronną i prawostronną to nazywamy ją asymptotą pionową **obustronną**.

**PRZ.** Wyznacz asymptoty pionowe funkcji  $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$ .

**Spostrzeżenie** Jeśli  $f$  jest ciągła w  $x_0$ , to  $x = x_0$  nie jest asymptotą pionową funkcji  $f$ .

**DEF.** Prostą  $y = ax + b$  nazywamy **asymptotą ukośną** funkcji  $f$  w  $+\infty \Leftrightarrow$

1.  $f$  jest określona w otoczeniu  $+\infty$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

Analogicznie definiujemy asymptotę ukośną w  $-\infty$ .  
Jeśli  $a = 0$ , to asymptotę nazywamy **poziomą**.

**TW.** Funkcja  $f(x)$  ma asymptotę ukośną  $y = ax + b$  w  $+\infty \Leftrightarrow$

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \text{ i } b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

Analogiczne twierdzenie zachodzi dla asymptoty ukośnej w  $-\infty$ .

**PRZ.**  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

**PRZ.** Wyznacz wszystkie asymptoty funkcji  $f(x) = x \ln(1 + \frac{1}{x})$ .

**DEF.**  $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subseteq \mathbb{R}$

Funkcję  $f$  nazywamy **parzystą**  $\Leftrightarrow$

1.  $\forall x \in D -x \in D$  ( $D$  - zbiór symetryczny względem 0)
2.  $\forall x \in D \quad f(-x) = f(x)$

**DEF.** Funkcję  $f$  nazywamy **nieparzystą**  $\Leftrightarrow$

1.  $\forall x \in D -x \in D$
2.  $\forall x \in D \quad f(-x) = -f(x)$

**PRZ.** Pokaż, że funkcja  $f(x) = \sin x$  jest nieparzysta.

**Spostrzeżenie** Wykres funkcji parzystej jest symetryczny względem osi OY, a wykres funkcji nieparzystej jest symetryczny względem punktu  $(0, 0)$ .

**DEF.**  $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subseteq \mathbb{R}$

Funkcję  $f$  nazywamy **okresową**  $\Leftrightarrow$  gdy istnieje takie  $T > 0$ , że:

1.  $\forall x \in D \quad x + T \in D$
2.  $\forall x \in D \quad f(x + T) = f(x)$

Liczbę  $T$  nazywa się wówczas **okresem** funkcji  $f$ .

**PRZ.** Pokaż, że funkcja  $f(x) = \cos x$  jest okresowa.

## BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI

### I Analiza wzoru funkcji

1. Dziedzina
2. Punkty przecięcia z osiami ukł. wsp.
3. Własności szczególne (parzystość, nieparzystość, okresowość, ciągłość)
4. Granice na krańcach dziedziny
5. Asymptoty

## II Analiza pochodnej funkcji ( $f'$ )

6. Obliczamy  $f'$ , rozwiązujemy równanie  $f'(x) = 0$  oraz nierówności  $f'(x) > 0$  i  $f'(x) < 0$ .
7. Przedziały monotoniczności
8. Ekstrema lokalne

## III Analiza drugiej pochodnej funkcji ( $f''$ )

9. Obliczamy  $f'$ , rozwiązujemy równanie  $f''(x) = 0$  oraz nierówności  $f''(x) > 0$  i  $f''(x) < 0$ .
10. Przedziały wypukłości i wklęsłości
11. Punkty przegięcia

## IV Tabelka

### V Szkic wykresu funkcji

**PRZ.** Zbadaj przebieg zmienności funkcji  $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ .

**PRZ.** Zbadaj przebieg zmienności funkcji  $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$

## RACHUNEK CAŁKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ

**DEF.**  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I \subseteq \mathbb{R}$

Funkcję  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  nazywamy funkcją pierwotną funkcji  $f$  na przedziale  $I \stackrel{df}{\Leftrightarrow}$  gdy  
 $\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$ .

**DEF.** Jeśli funkcja  $f$  ma funkcję pierwotną na  $I$ , to  $f$  nazywamy całkowlaną w sensie Newtona na  $I$ .

**PRZ.** Wyznacz funkcje pierwotne funkcji  $f(x) = 2x$  oraz funkcji  $f(x) = \frac{1}{x}$ .

**TW.**  $F$  jest funkcją pierwotną funkcji  $f$  na  $I$ .

Teza:  $G$  jest funkcją pierwotną funkcji  $f$  na  $I \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R} \forall x \in I \quad G(x) = F(x) + C$

**Dowód:**  $(\Leftarrow) \quad G(x) = F(x) + C$

$$G'(x) = F'(x) + (C)'$$

$$G'(x) = f(x) \Rightarrow G \text{ jest funkcją pierwotną funkcji } f.$$

$(\Rightarrow) \quad G$  jest funkcją pierwotną funkcji  $f$  na  $F$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I \quad G'(x) = f(x).$$

$$\forall x \in I \quad h(x) \stackrel{df}{=} G(x) - F(x)$$

$$\forall x \in I \quad h'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

$$\Rightarrow \forall x \in I \quad h(x) = C - \text{stała}$$

$$G(x) - F(x) = C$$

$$G(x) = F(x) + C \blacksquare$$

**DEF.**  $f$  - całkowlana w sensie Newtona

$F$  - funkcja pierwotna funkcji  $f$

Całką nieoznaczoną funkcji  $f$  nazywamy zbiór wszystkich funkcji pierwotnych funkcji  $f$ , czyli  $\{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}$ .

Zapis.  $\int f(x)dx = F(x) + C, C \in \mathbb{R}$

$\int$  - symbol całki

$x$  - zmienna całkowania

$f(x)$  - funkcja podcałkowa

$C$  - stała całkowania



**Spostrzeżenie** 1. Jeśli funkcja  $f$  ma funkcję pierwotną na  $I$ , to

$$\forall x \in I \left( \int f(x) dx \right)' = f(x)$$

2. Jeśli funkcja  $f$  jest różniczkowalna na  $I$ , to

$$\forall x \in I \int f'(x) dx = f(x) + C, C \in \mathbb{R}$$

**DEF.**  $f$  - całkowna w sensie Newtona

$F$  - funkcja pierwotna funkcji  $f$  na  $[a, b]$

Całkę oznaczoną (Newtona) nazywamy

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{df}{=} F(b) - F(a) - \text{liczba}$$

$a$  - dolna granica całkowania

$b$  - górna granica całkowania

$$\text{Inny zapis: } F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = F(x)|_a^b$$

**Spostrzeżenie** Wartość całki oznaczonej nie zależy od wyboru funkcji pierwotnej tzn.

jeśli  $F$  i  $G$  są funkcjami pierwotnymi funkcji  $f$  na  $[a, b]$ , to

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = G(b) - G(a).$$

**Dowód:**  $G(x) = F(x) + C$

$$G(b) - G(a) = F(b) + C - (F(a) + C) = F(b) - F(a).$$

**TW.** (warunek wystarczający istnienia funkcji pierwotnej)

Jeśli funkcja  $f$  jest ciągła na  $I$ , to  $f$  ma pierwotną na  $I$ .

**Uwaga.** Funkcja pierwotna funkcji elementarnej nie musi być funkcją elementarną!

np.  $\int e^{-x^2} dx$ ,  $\int \frac{\sin x}{x} dx$ ,  $\int \sqrt{1+x^3} dx$ ,  $\int \cos(x^2) dx$ , ... nie są funkcjami elementarnymi.

**CAŁKI FUNKCJI ELEMENTARNYCH**

$$\int 0 dx = 0 + C$$

$$\int a dx = ax + C$$

$$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C, r \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

**TW.**  $f, g$  - całkownalne na  $I$ ,  $a \in \mathbb{R}$

Wtedy:

$$1. \int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$2. \int [af(x)] dx = a \int f(x) dx$$

**PRZ.**

$$\int (2x^3 - 4x^2 + 2x + 1) dx$$

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

**TW.** (wzór na całkowanie przez części)

$$u, v \in C^1(I)$$

$$\text{Wtedy } \int u(x)v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

**Dowód:**

$$(u(x) \cdot v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$\int (u(x) \cdot v(x))' dx = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx$$

$$u(x) \cdot v(x) = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx$$

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x)v(x) dx. \blacksquare$$

Typ I.

$$\text{PRZ. } \int x^2 \sin x dx$$

Analogicznie całkujemy:

$$\int W(x) \cos x dx$$

$$\int W(x) a^x dx$$

Typ II.

$$\text{PRZ. } \int x^2 \ln x dx$$

$$\text{PRZ. } \int \ln x dx$$

Analogicznie całkujemy:

$$\int W(x) \arcsin x dx$$

$$\int W(x) \arccos x dx$$

$$\int W(x) \operatorname{arctg} x dx$$

$$\int W(x) \ln x dx$$

Typ III.

**PRZ.**  $\int e^x \sin x dx$  - całka dwumienna

**PRZ.**  $\int \sin^2 x dx$

**TW.** (o całkowaniu przez podstawienie)

Zał:

1)  $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  całkowna na  $J$

2)  $\varphi : I \rightarrow J$ ,  $\varphi \in C^1(I)$

Teza:  $\int f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C$ ,

gdzie  $F$  jest dowolną funkcją pierwotną funkcji  $f$ .

**Dowód:** Wynika z tw. o pochodnej funkcji złożonej.

Inny zapis:  $\int f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = \left| \begin{array}{l} t = \varphi(x) \\ dt = \varphi'(x) dx \end{array} \right| = \int f(t) dt = F(t) \Big|_{t=\varphi(x)} + C = F(\varphi(x)) + C$ .

**PRZ.**

1)  $\int 2 \cos 2x dx$

2)  $\int (3x - 5)^{10} dx$

3)  $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

**Spostrzeżenie**  $f \in C^1(I)$

Wtedy  $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

**Dowód:**  $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \left| \begin{array}{l} t = f(x) \\ dt = f'(x) dx \end{array} \right| = \int \frac{1}{t} dt = \ln |t| + C = \ln |f(x)| + C$

**PRZ.**

$$\int \operatorname{tg} x dx$$

$$\int \operatorname{arctg} x dx$$

## CAŁKOWANIE FUNKCJI WYMIERNYCH

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

$P(x), Q(x)$  - wielomiany

**DEF.** Funkcję wymierną nazywamy **właściwą** jeśli stopień wielomianu w liczniku jest mniejszy od stopnia wielomianu w mianowniku.

**Spostrzeżenie** Każdą funkcję wymierną da się przedstawić w postaci sumy wielomianu i funkcji wymiernej właściwej.

**Dowód:**  $P(x) = W(x) \cdot Q(x) + R(x)$     st.  $R(x) < \text{st. } Q(x)$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = W(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}. \quad \square$$

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int W(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$$

**TW.** Każdy wielomian  $Q(x)$  da się rozłożyć na iloczyn wielomianów stopnia pierwotnego i wielomianów nierozkładalnych stopnia 2-go.

$$Q(x) = a_n(x-x_1)^{k_1} \cdot (x-x_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x^2+p_1x+q_1)^{l_1} \cdot (x^2+p_2x+q_2)^{l_2} \cdot \dots,$$

gdzie  $\Delta = p_i^2 - 4q_i < 0$  dla każdego  $i$ .

**PRZ.**

a)  $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

b)  $x^4 + 1 = \dots = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$

**TW.** Każdą funkcję wymierną właściwą da się w jednoznaczny sposób zapisać w postaci:

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-x_1} + \frac{A_2}{(x-x_1)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-x_1)^k} + \dots - \text{ułamki proste I-go rodzaju}$$

$$+ \frac{B_1x+C_1}{(x^2+p_1x+q_1)} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+p_1x+q_1)^2} + \dots + \frac{B_lx+C_l}{(x^2+p_1x+q_1)^l} + \dots - \text{ułamki proste II-go rodzaju}$$

gdzie  $A_1, \dots, A_k, \dots, B_1, \dots, B_l, \dots, C_1, \dots, C_l, \dots$  - stałe  $\in \mathbb{R}$

**PRZ.** Rozłożyć na sumę ułamków prostych funkcje:

a)  $\frac{4}{x^4-1}$

b)  $\frac{6}{(x^2-1)(x-2)}$

c)  $\frac{1}{x^2+x^4}$

Całkowanie ułamków prostych I-go rodzaju

1.  $\int \frac{1}{x-x_0} dx = \ln|x-x_0| + C$

2.  $\int \frac{1}{(x-x_0)^n} dx = \left| \begin{matrix} t = x-x_0 \\ dt = dx \end{matrix} \right| = \int t^{-n} dt = \frac{t^{-n+1}}{-n+1} + C = \frac{1}{1-n} \cdot \frac{1}{(x-x_0)^{n-1}} + C$

Całkowanie ułamków prostych II-go rodzaju:

**PRZ.**

$$a) \int \frac{2x+3}{x^2+2x+3} dx$$

$$b) \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$$

**TW.**

$$I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$$

$$I_1 = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C$$

$$I_n = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}$$

**DEF. Jednomianem dwóch zmiennych** nazywamy funkcję postaci  $ax^ny^m$ , gdzie  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ,  $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  oraz  $a$  - stała.

**Wielomianem dwóch zmiennych**  $W(x,y)$  nazywamy dowolną sumę skończoną jednomianów dwóch zmiennych.

**Funkcją wymierną dwóch zmiennych** nazywamy iloraz wielomianów dwóch zmiennych czyli

$$R(x,y) = \frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$$

Analogicznie definiujemy jednomian, wielomian i funkcję wymierną  $n$  zmiennych.

## CAŁKOWANIE FUNKCJI NIETYMIERNYCH

I.  $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx = *$ , gdzie  $R(x,y)$  jest funkcją wymierną,  $a > 0$

**Podstawienie Eulera:**  $\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{ax}$

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{ax} \quad /()^2$$

$$ax^2+bx+c = t^2 - 2\sqrt{at}x + ax^2$$

$$bx + 2\sqrt{at}x = t^2 - c$$

$$x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{at}}$$

$$dx = \left( \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{at}} \right)' dt$$

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \frac{\sqrt{a}(t^2 - c)}{b + 2\sqrt{at}}$$

$$* = \int R_1(t) dt, \quad R_1 - \text{funkcja wymierna jednej zmiennej } t$$

**PRZ.** Pokaż, że  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+A}} = \ln|x + \sqrt{x^2+A}| + C$ .

II. **Metoda współczynników nieoznaczonych (Lagrange'a)**

$$\int \frac{W_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = W_{n-1}(x) \sqrt{ax^2+bx+c} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

**PRZ.**  $\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$

$$\text{III. } \int \frac{dx}{(x-x_0)^k \sqrt{ax^2+bx+c}} = \begin{cases} t = \frac{1}{x-x_0} \\ x-x_0 = \frac{1}{t} \\ x = \frac{1}{t} + x_0 \\ dx = -\frac{dt}{t^2} \end{cases} \rightarrow \text{metoda współczynników Lagrange'a}$$

**PRZ.**  $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$

IV.  $\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_1}{q_1}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_n}{q_n}}\right) dx \leftarrow$  funkcja wymierna  $n+1$  zmiennych  
 $= \left| \frac{ax+b}{cx+d} = t^s, s = NWW(q_1, \dots, q_n) \right| \rightarrow$  całka funkcji wymiernej

**PRZ.**  $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt[3]{x+1}-1} dx$

**CAŁKOWANIE FUNKCJI TRYGONOMETRYCZNYCH**

I.  $\int \sin^n x \cos^m x dx = I, m, n \in \mathbb{Z}$

a) przynajmniej jedna z potęg jest nieparzysta, np.  $m = 2k + 1$

$$I = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^k \cdot \cos x dx = \left| \begin{array}{l} t = \sin x \\ dt = \cos x dx \\ \cos^2 x = 1 - t^2 \end{array} \right| = \int t^n (1 - t^2)^k dt$$

b) obie potęgi są parzyste,  $n, m \in \mathbb{N}$ , korzystamy ze wzorów na funkcje podwojonego kąta

$$\left| \begin{array}{l} \sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \\ \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \\ \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right|$$

**PRZ.**  $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

II.  $\int \sin ax \cos b x dx = \frac{1}{2} \int [\sin(a+b)x + \sin(a-b)x] dx$   
 $\int \sin ax \sin b x dx = \frac{1}{2} \int [\cos(b-a)x - \cos(b+a)x] dx$   
 $\int \cos ax \cos b x dx = \frac{1}{2} \int [\cos(b-a)x + \cos(b+a)x] dx$

III.  $\int R(\sin^2 x, \cos^2 x, \sin x \cos x) dx = \left| \begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x \\ x = \operatorname{arctg} t \\ dx = \frac{1}{1+t^2} dt \\ \sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \frac{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 1} = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{t^2}{1+t^2} \\ \cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x + 1} = \frac{1}{1+t^2} \\ \sin x \cos x = \frac{t}{1+t^2} \end{array} \right|$

**PRZ.**  $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x}$

IV.  $\int R(\sin x, \cos x) dx = \left| \begin{array}{l} t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \\ x = 2 \operatorname{arctg} t \\ dx = \frac{2}{1+t^2} dt \\ \sin x = \sin\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} + 1} = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right|$

**PRZ.**  $\int \frac{dx}{\sin x}$

**CAŁKA RIEMANNA**

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , ograniczona

Tworzymy ciąg podziałów  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  przedziału  $[a, b]$ :

$P_n : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_i < \dots < x_n = b$

$x_0, \dots, x_n$  - punkty podziału

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, i = 1, \dots, n$

$\delta_n = \max\{x_i - x_{i-1} : i = 1, \dots, n\}$  - średnica podziału  $P_n$

Ciąg podziałów  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  nazywamy **normalnym**  $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$

Niech  $P_n$  będzie podziałem przedziału  $[a, b]$ .

W każdym z przedziałów  $[x_{i-1}, x_i]$  wybieramy punkt pośredni  $c_i: \forall i = 1, \dots, n \quad c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ .

Niech  $S_n \stackrel{df}{=} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$  - suma całkowa dla podziału  $P_n$  przy ustalonym wyborze punktów pośrednich  $c_i$ .

$(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  - ciąg sum całkowych dla ciągu podziałów  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**DEF.** Jeśli dla każdego normalnego ciągu podziałów przedziału  $[a, b]$  i dowolnego wyboru punktów pośrednich  $c_i$  istnieje  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ , która nie zależy ani od wyboru ciągu podziałów, ani od wyboru punktów pośrednich, to granicę tę nazywamy całką Riemanna funkcji  $f$  na przedziale  $[a, b]$ .

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ (\delta_n \rightarrow 0)}} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

Przyjmujemy, że  $\int_a^a f(x) dx = 0$ .

**PRZ.** Oblicz całkę Riemanna funkcji stałej  $f(x) = K$  na  $[a, b]$ .

**TW.** Funkcja ciągła na przedziale domkniętym i ograniczonym  $[a, b]$  jest całkowna w sensie Riemanna.

**TW.** (interpretacja geometryczna całki Riemanna)

Zał:  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , ciągła

$\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq 0$

Teza: pole obszaru  $D = \{(x, y) : x \in [a, b] \wedge 0 \leq y \leq f(x)\}$  jest równe  $\int_a^b f(x) dx$ .

**PRZ.** Pokaż, że funkcja Dirichleta nie jest całkowna w sensie Riemanna na  $[0, 1]$ .

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \\ 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \end{cases}$$

**DEF.**  $A \subset \mathbb{R}$

$A$  jest "zbiorem miary Riemanna równej 0"  $\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \exists [a_i, b_i], i \in \{1, \dots, n\} \quad A \subset \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i] \wedge \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \leq \varepsilon$ .

**PRZ.** Pokaż, że zbiór złożony z jednego elementu czyli  $\{x_0\}$ , gdzie  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jest "zbiorem miary Riemanna równej 0".

**Spostrzeżenie** Każdy zbiór skończony  $X \subset \mathbb{R}$  jest "zbiorem miary Riemanna równej 0".

**PRZ.** Ćw. dom.

Pokaż, że zbiór  $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ , jest "zbiorem miary Riemanna równej 0".

**TW.** Zał:  $f$  jest całkowalna w sensie Riemanna na  $[a, b]$ ,  
 $\{x \in [a, b] : f(x) \neq g(x)\}$  jest "zbiorem miary Riemanna równej 0"

Teza:  $g$  jest całkowalna na  $[a, b]$  oraz  $\int_a^b g(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ .

**PRZ.** Funkcja nieciągła, która jest całkowalna w sensie Riemanna.

**TW.**

Zał:  $f$  całkowalna na  $[a, b]$

$c \in [a, b]$

Teza:  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

**PRZ.** Funkcja nieciągła sklejana, która jest całkowalna w sensie Riemanna.

**TW.** (własności funkcji całkowalnych w sensie Riemanna)

Zał:  $f, g$  całkowalne na  $[a, b]$

Teza:

1)  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$   $\alpha \cdot f + \beta \cdot g$  jest całkowalna na  $[a, b]$

oraz  $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$

2)  $f \cdot g$  jest całkowalna na  $[a, b]$

3)  $|f|$  jest całkowalna na  $[a, b]$  i  $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

4)  $\forall x \in [a, b]$   $f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq 0$

5)  $\forall x \in [a, b]$   $f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

**TW.** (I tw. o wartości średniej)

Zał:  $f$  całkowalna na  $[a, b]$

$\exists M, m \in \mathbb{R} \quad \forall x \in [a, b] \quad m \leq f(x) \leq M$

Teza:  $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$



**Dowód:**

Wystarczy przyjąć, że  $g_1(x) = m$ ,  $g_2(x) = M \quad \forall x \in [a, b]$  i zastosować poprzednie twierdzenie.

$$g_1(x) \leq f(x) \Rightarrow \int_a^b g_1(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b g_1(x) dx = \int_a^b m dx = m(b-a)$$

$$\Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx.$$

Analogicznie dowodzimy, że  $\int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ .

**DEF.** Wartością średnią funkcji całkowalnej  $f$  na  $[a, b]$  nazywamy liczbę  $f_{\text{sr}} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$ .

**TW.** (II tw. o wartości średniej)

Zał:  $f \in C([a, b])$

Teza:  $\exists c \in [a, b] \quad f(c) = f_{\text{sr}} \quad (= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx)$

**Dowód:**  $f$  osiąga swoje kresy, bo  $f$  ciągła na  $[a, b]$  (z tw. Weierstrassa)

$$\left. \begin{array}{l} \exists x_1 \in [a, b] \quad f(x_1) = m = \inf\{f(x) : x \in [a, b]\} \\ \exists x_2 \in [a, b] \quad f(x_2) = M = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\} \end{array} \right\} \Rightarrow \forall x \in [a, b] \quad m \leq f(x) \leq M$$

$$\xrightarrow{\text{Tw I}} f(x_1)(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f(x_2)(b-a)$$

$$f(x_1) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq f(x_2)$$

Z własności Darboux  $\Rightarrow \forall y \in [f(x_1), f(x_2)] \exists c \in [a, b] \quad f(c) = y$

$$y = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \in [f(x_1), f(x_2)]$$

$$\Rightarrow \exists c \in [a, b] \quad f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}.$$

**DEF.**  $f$  całkowalna  $[a, b]$

**Funkcją górnej granicy całkowania** nazywamy funkcję  $\phi(x) = \int_a^x f(t) dt$

**TW.** (o ciągłości funkcji górnej granicy całkowania)

Zał:  $f$  całkowalna na  $[a, b]$

Teza: funkcja  $\phi(x) = \int_a^x f(t) dt$  jest ciągła na  $[a, b]$ .

**Dowód:**  $x_0 \in [a, b]$

$$\phi \text{ ciągła w } x_0 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \phi(x_0 + h) = \phi(x_0) \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} [\phi(x_0 + h) - \phi(x_0)] = 0$$

$$\phi(x_0 + h) - \phi(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(x) dx - \int_a^{x_0} f(x) dx = \int_a^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx - \int_a^{x_0} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx$$

$$\left| \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx \right| \leq \int_{x_0}^{x_0+h} |f(x)| dx \leq M(x_0 + h - x_0) = M \cdot h$$

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0} |\phi(x_0 + h) - \phi(x_0)| \leq \lim_{h \rightarrow 0} M \cdot h = 0$$

**TW.** (o różniczkowalności funkcji górnej granicy całkowania)

Zał:  $f$  całkowna na  $[a, b]$

$f$  jest ciągła w otoczeniu  $x_0 \in [a, b]$

Teza: funkcja  $\phi(x) = \int_a^x f(t) dt$  jest różniczkowalna w  $x_0$  oraz  $\phi'(x_0) = f(x_0)$ .

**Dowód:** 
$$\frac{\phi(x_0 + h) - \phi(x_0)}{h} = \frac{\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx}{h} \stackrel{\text{Tw. II o w. średniej } (*)}{=} \text{Tw. II o w. średniej } (*)$$

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx = (x_0 + h - x_0) \cdot f(c), \quad c \in [x_0, x_0 + h]$$

$$c = (x_0 + \theta h), \quad \theta \in [0, 1]$$

$$(*) = \frac{f(c) \cdot h}{h} = f(c) = f(x_0 + \theta h)$$

$$\phi'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\phi(x_0 + h) - \phi(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + \theta h) = f(x_0), \text{ bo } f \text{ jest ciągła w } x_0.$$

**Uwaga.** Jeśli zdefiniujemy funkcję  $\phi(x) = \int_c^x f(x) dx$ , gdzie  $c$  jest dowolnym punktem należącym do  $[a, b]$ , to twierdzenia poprzednie są prawdziwe dla  $\phi$ .

**TW.** (Newtona - Leibniza)

Zał:  $f$  ciągła na  $[a, b]$  (domkniętym i ograniczonym)

$F$  pierwotna do  $f$  na  $[a, b]$

Teza:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

(Całka Riemanna na  $[a, b]$  = całka Newtona)

**Dowód:** Z poprzedniego twierdzenia,  $\phi(x) = \int_a^x f(x) dx$  jest funkcją pierwotną do  $f$  na  $[a, b]$ .

$$\int_a^b f(x) dx = \phi(b) = \phi(b) - \int_a^a f(x) dx = \phi(b) - \phi(a) = F(b) - F(a), \text{ bo}$$

$$\phi(x) = F(x) + C$$

$$\phi(b) - \phi(a) = F(b) + C - (F(a) + C) = F(b) - F(a).$$

**PRZ.**

1)  $\int_0^1 x^2 dx$

2)  $\int_0^2 f(x) dx, f(x) = \begin{cases} x+1, & x \in [-1, 0) \\ 2-x, & x \in [0, 2] \end{cases}$

3)  $\int_0^\pi f(x) dx, f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi] \setminus \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \\ \frac{\sin x}{x}, & x \in \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \end{cases}$

**PRZ.** Oblicz  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{n+n}$ .**CAŁKI NIEWŁAŚCIWE**

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \text{ ciągła} \xrightarrow{\text{Tw.N-L}} \int_a^b f(x) dx = \phi(b) - \phi(a)$

**I.**1)  $f$  jest ciągła w  $[a, b)$  ( $f$  nie jest ciągła  $b$  lub  $f$  nie jest określona w  $b$ )

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow b^-} \int_a^\beta f(x) dx$$

Jeśli istnieje ta granica, to tę granicę nazywamy całką niewłaściwą na  $[a, b]$  i mówimy, że ta całka jest zbieżna (w przeciwnym razie mówimy, że jest rozbieżna).

**PRZ.**  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

2)  $f$  jest ciągła w  $(a, b]$  ( $f$  nie jest ciągła  $a$  lub  $f$  nie jest określona w  $a$ )

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} \int_\alpha^b f(x) dx$$

**PRZ.**  $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$

3)  $f$  jest ciągła w  $(a, b)$  ( $f$  nie jest ciągła lub nieokreślona w punktach  $a$  i  $b$ )

$x_0 \in (a, b)$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} \int_\alpha^{x_0} f(x) dx + \lim_{\beta \rightarrow b^-} \int_{x_0}^\beta f(x) dx$$

**II.**

1)  $f \in C([a, +\infty))$

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{\beta} f(x)dx$$

**PRZ.** Zbadać zbieżność  $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ .

2)  $f \in C((-\infty, b])$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \int_{\alpha}^b f(x)dx$$

3)  $f \in C((-\infty, +\infty))$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

**PRZ.**  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

**TW.** (o zbieżności całek)

Zał:  $\forall x \in [a, b] \quad 0 \leq f(x) \leq g(x)$

$f, g$  ciągłe  $[a, b]$

Teza:  $\int_{[a,b]} g(x)dx$  zbieżna  $\Rightarrow \int_{[a,b]} f(x)dx$  zbieżna

**PRZ.** Zbadać zbieżność  $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx$ .

**PRZ.** Znaleźć funkcję pierwotną funkcji  $f(x)$ .

$$f(x) \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 1] \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$$

**TW.** (całkowanie przez części dla całek oznaczonych)

Zał:  $u, v \in C^1([a, b])$

Teza:  $\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$

**TW.** (całkowanie przez podstawienie dla całek oznaczonych)

Zał:  $f \in C([a, b])$

$\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ ,  $\varphi$  - bijekcja,  $\varphi \in C^1([\alpha, \beta])$

$\varphi(\alpha) = a$ ,  $\varphi(\beta) = b$

Teza:  $\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

**PRZ.** Oblicz  $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx, a > 0$

## ZASTOSOWANIA GEOMETRYCZNE CAŁEK

### Pole obszaru

**TW.**  $D = \{(x, y) : x \in [a, b], \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$   
 $\varphi, \psi$  - ciągłe w  $[a, b]$  ( $\forall x \in [a, b] \varphi(x) \leq \psi(x)$ )

Teza:  $|D| = \int_a^b (\psi(x) - \varphi(x)) dx$

### Współrzędne biegunowe

$r$  - promień wodzący

$\varphi$  - kąt (biegunowy) skierowany

$$\frac{x}{r} = \cos \varphi$$

$$\frac{y}{r} = \sin \varphi$$

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$(r, \varphi)$  - współrzędne biegunowe punktu

$r \in [0, +\infty)$  ( $r \geq 0$ !)

$\varphi \in \mathbb{R}$

**PRZ.**

Narysować spiralę Archimedesesa daną wzorem  $r = \varphi$ .

**PRZ.** Narysować lemniskatę Bernoulliego  $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), a > 0$ .

Obliczyć pole obszaru  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, 0 \leq r \leq r(\varphi), \varphi \in [\alpha, \beta]\}$ .

**TW.** Zał:  $r(\varphi)$  ciągła w  $[\alpha, \beta]$

$$r(\varphi) \geq 0$$

Teza:  $|D| = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$ .

**PRZ.** Obliczyć pole ograniczone lemniskatą Bernoulliego  $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ .

$$\frac{1}{4}|P| = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} a^2 \cos 2\varphi d\varphi = \left[ \frac{1}{4} a^2 \sin 2\varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4} a^2 (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{1}{4} a^2 (1 - 0) = \frac{1}{4} a^2$$
$$|P| = a^2$$

### Krzywa zadana parametrycznie

$x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$

**PRZ.** Okrąg zadany parametrycznie.

**TW.** (pole obszaru ograniczonego krzywą zadaną parametrycznie)

$$\text{Zał: } L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$$

$$\forall t \in [\alpha, \beta] \quad \psi(t) \geq 0$$

$$\forall t \in [\alpha, \beta] \quad \varphi'(t) > 0$$

$$\varphi \in C^1([\alpha, \beta])$$

$$\psi \in C([\alpha, \beta])$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi(\alpha) \leq x \leq \varphi(\beta), 0 \leq y \leq \psi(t), t \in [\alpha, \beta]\}$$

$$\text{Teza: } |D| = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt$$

**Dowód:**

$$L: \begin{cases} x = \varphi(t) & t = \varphi^{-1}(x) \\ y = \psi(t) & y = \psi(\varphi^{-1}(x)) \end{cases}$$

$$|D| = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} y(x) dx = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} \psi(\varphi^{-1}(x)) dx = \left| \begin{array}{l} t = \varphi^{-1}(x) \\ x = \varphi(t) \\ dx = \varphi'(t) dt \end{array} \right| \stackrel{\text{Tw. o podst.}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt. \blacksquare$$

$$\text{Inaczej: } |D| = \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \cdot x'(t) dt$$

**PRZ.**

Obliczyć pole obszaru ograniczonego elipsą  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

**PRZ.**

Obliczyć pole obszaru ograniczonego cykloidą

$$x = a(t - \sin t)$$

$$y = a(1 - \cos t)$$

$$t \in [0, 2\pi]$$

**Długość krzywej**

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Tworzymy ciąg podziałów przedziału  $[\alpha, \beta]$

$$\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = \beta$$

$$\delta_n = \max\{|t_i - t_{i-1}|, i = 1, \dots, n\}$$

$$P_{i-1} = (x(t_{i-1}), y(t_{i-1}))$$

$$P_i = (x(t_i), y(t_i))$$

$$|P_{i-1}P_i| = \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}$$

$$d_n = \sum_{i=1}^n |P_{i-1}P_i|$$

**DEF.** Jeśli istnieje  $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ (\delta_n \rightarrow 0)}} d_n$ , to krzywą nazywamy **prostowalną** i tę granicę nazywamy **długością** krzywej.

**DEF.** Krzywą  $L$  nazywamy **łukiem gładkim**  $\Leftrightarrow$

$$1) x(t), y(t) \in C^1([\alpha, \beta])$$

2)  $\forall t \in [\alpha, \beta] ((x'(t))^2 + (y'(t))^2 > 0) (\Leftrightarrow \text{w ka\u017cdym punkcie krzywej istnieje styczna})$

**TW.** Ka\u017cdy łuk gładki jest krzywą prostowalną i jego długość

$$|L| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

**Uwaga.** Długość łuku gładkiego w przestrzeni  $\mathbb{R}^n$

$$x_1 = x_1(t) \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$$x_2 = x_2(t)$$

$\vdots$

$$x_n = x_n(t)$$

$$x_1, \dots, x_n \in C^1([\alpha, \beta])$$

$$\sum_{i=1}^n (x'_i(t))^2 > 0 \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\text{Wtedy } |L| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x'_i(t))^2} dt.$$

**WN.** Krzywa zadana w sposób jawny

$$L: y = f(x), \quad x \in [a, b]$$

$$f \in C^1([a, b])$$

$$\text{Wtedy } |L| = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

**Dowód:**

$$x = t$$

$$y = y(t)$$

$$t \in [a, b]$$

$$|L| = \int_a^b \sqrt{1^2 + (y'(t))^2} dt.$$

**TW.** (długość krzywej zadanej równaniem biegunowym)

$$\text{Zał: } L: r = r(\varphi), \quad \varphi \in [\alpha, \beta]$$

$$r(\varphi) \in C^1([\alpha, \beta])$$

$$\text{Teza: } |L| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi.$$

**Dowód:**

$$x = r \cos \varphi \quad x(\varphi) = r(\varphi) \cdot \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi \quad y(\varphi) = r(\varphi) \cdot \sin \varphi$$

$$|L| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(\varphi))^2 + (y'(\varphi))^2} d\varphi$$

$$x'(\varphi) = r'(\varphi) \cos \varphi + r(\varphi)(-\sin \varphi)$$

$$y'(\varphi) = r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cdot \cos \varphi$$

$$(x'(\varphi))^2 + (y'(\varphi))^2 =$$

$$= (r'(\varphi))^2 \cos^2 \varphi - 2r'(\varphi) \cdot r(\varphi) \cos \varphi \sin \varphi + r^2(\varphi) \sin^2 \varphi +$$

$$+ (r'(\varphi))^2 \sin^2 \varphi + 2r'(\varphi)r(\varphi) \sin \varphi \cos \varphi + r^2(\varphi) \cos^2 \varphi =$$

$$\begin{aligned}
&= (r'(\varphi))^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + r^2(\varphi)(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = \\
&= (r'(\varphi))^2 + (r(\varphi))^2 \\
|L| &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi
\end{aligned}$$

Podsumowanie:

$$|L| = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx, \quad y = f(x), x \in [a, b]$$

$$|L| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt, \quad t \in [\alpha, \beta], x = x(t), y = y(t)$$

$$|L| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi, \quad \varphi \in [\alpha, \beta], r = r(\varphi)$$

**PRZ.** Obliczyć długość cykloidy

$$\begin{aligned}
x &= a(t - \sin t) \\
y &= a(1 - \cos t) \\
t &\in [0, 2\pi]
\end{aligned}$$

**PRZ.** Obliczyć długość asteroidy

$$\begin{aligned}
x &= a \cos^3 t \\
y &= a \sin^3 t \\
t &\in [0, 2\pi]
\end{aligned}$$

**PRZ.** Obliczyć długość kardioidy

$$r = a(1 + \cos \varphi)$$

**Objętość bryły obrotowej**

$$y = f(x), x \in [a, b]$$

$$f \in C([a, b])$$

$V$  - bryła powstała przez obrót krzywej  $y = f(x)$  wokół osi  $OX$ .

$$\text{Wtedy: objętość bryły } |V| = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

**Dowód:**

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \text{ - podział}$$

$$c_i \in [x_{i-1}, x_i] \quad \Delta V_i = \pi \cdot f^2(c_i) \cdot \Delta x_i$$

$$V_n = \sum_{i=1}^n \pi f^2(c_i) \cdot \Delta x_i = \pi \sum_{i=1}^n f^2(c_i) \Delta x_i$$

$$|V| = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ (\delta_n \rightarrow 0)}} \pi \sum_{i=1}^n f^2(c_i) \Delta x_i = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx.$$

Jeśli krzywa jest zadana parametrycznie:

$$x = x(t)$$

$$y = y(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$$y(t) \in C([\alpha, \beta])$$

$$x(t) \in C^1([\alpha, \beta])$$



$$\forall t \in [\alpha, \beta] \quad x'(t) > 0$$

$$\text{Wtedy } |V| = \pi \int_{\alpha}^{\beta} y^2(t) \cdot x'(t) dt.$$

**PRZ.**

Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót elipsy  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

Obliczyć objętość torusa  $x^2 + (y - R)^2 = r^2$ .

**TW.** (pole powierzchni bocznej bryły obrotowej)

Zał:

$$y = f(x), \quad x \in [a, b]$$

$$f \in C^1([a, b])$$

$$\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq 0$$

Teza: pole powierzchni bocznej bryły powstałej przez obrót krzywej wokół osi  $OX$

$$|S| = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

**PRZ.** Obliczyć pole powierzchni torusa  $x^2 + (y - R)^2 = r^2$ .

Jeśli krzywa jest łukiem gładkim:

$$x = x(t)$$

$$y = y(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$$x(t), y(t) \in C^1([\alpha, \beta])$$

$$\forall t \in [\alpha, \beta] \quad y(t) \geq 0$$

Teza: pole powierzchni bocznej bryły powstałej przez obrót krzywej wokół osi  $OX$

$$|S| = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

## PRZESTRZENIE METRYCZNE

**DEF.** zbiór  $X \neq \emptyset$

**Metryką** w zbiorze  $X$  nazywamy dowolną funkcję  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  taką, że:

- 1)  $\forall x, y \in X \quad d(x, y) \geq 0$
- 2)  $\forall x, y \in X \quad d(x, y) = d(y, x)$  (symetria)
- 3)  $\forall x, y, z \in X \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (warunek trójkąta)
- 4)  $\forall x, y \in X \quad d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

Parę  $(X, d)$  nazywamy **przestrzenią metryczną**.

**PRZ.**  $X = \mathbb{R}, x, y \in \mathbb{R}$

$$d(x, y) = |y - x|$$

**Dowód:**  $d(x, z) = |z - x| = |z - y + y - x| \leq |z - y| + |y - x| = d(y, z) + d(x, y)$   
 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  - przestrzeń metryczna

**PRZ.**  $X = \mathbb{R}^2, (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$

$$d_e((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} - \text{metryka euklidesowa}$$

$$d_t((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1| - \text{metryka taksówkowa}$$

$$d_m((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max\{|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|\} - \text{metryka maksimum}$$

**PRZ.**  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d_e(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}$$

$$d_t(x, y) = \sum_{i=1}^n |y_i - x_i|$$

$$d_m(x, y) = \max\{|y_i - x_i| : i = 1, \dots, n\}$$

**PRZ.**  $X \neq \emptyset$ ,  $x, y \in X$

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases} \quad \text{- metryka dyskretna}$$

**PRZ.**  $X = \{a_1 a_2 \dots a_n : a_i \in A, i = 1, \dots, n\}$  - zbiór słów długości  $n$

$a_1 a_2 \dots a_n$  - słowo

$A$  - alfabet

$$d((a_1 a_2 \dots a_n), (b_1 \dots b_n)) = |\{i \in \{1, \dots, n\} : a_i \neq b_i\}| \quad \text{- odległość Hamminga}$$

**PRZ.** Metryka rzeka, metryka kolejowa.

**DEF.**  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna

$$x_0 \in X, r > 0$$

**Kula** o środku  $x_0$  i promieniu  $r$  nazywamy  $K(x_0, r) = \{x \in X : d(x_0, x) < r\}$ .

**PRZ.**  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

$$x_0 \in \mathbb{R}, r > 0$$

$$K(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} = (x_0 - r, x_0 + r)$$

$$-r < x - x_0 < r \quad / \quad +x_0$$

$$x_0 - r < x < x_0 + r$$

**PRZ.**  $(\mathbb{R}^2, d_e)$

$$K((x_0, y_0), r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d((x_0, y_0), (x, y)) < r\} =$$

$$= \{(x, y) : \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\} = \{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}.$$

**PRZ.**  $(\mathbb{R}^2, d_m)$

$$K((0, 0), r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d((0, 0), (x, y)) < r\} =$$

$$= \{(x, y) : \max\{|x|, |y|\} < r\}.$$

**DEF.**  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna

Zbiór  $A \subset X$  nazywamy **ograniczonym**  $\Leftrightarrow \exists x_0 \in X \exists r > 0 \quad A \subset K(x_0, r)$ .

**PRZ.**  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

$A = (a, b)$  jest ograniczony, bo  $K(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2}) \supset A$ .

**PRZ.**  $(X, d_d)$  - p. dyskretna

Każdy zbiór  $A$  w przestrzeni metrycznej z metryką dyskretną jest ograniczony, bo  $K(x_0, 2) \supset A$ , gdzie  $x_0$  jest dowolnym punktem należącym do  $X$ .

**DEF.**

$I$  - dowolny zbiór indeksów

$\forall i \in I \quad A_i$  - zbiór, (rodzina zbiorów)

$$\bigcup_{i \in I} A_i \stackrel{df}{=} \{x : \exists i \in I \quad x \in A_i\} \quad \text{- suma zbiorów}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i \stackrel{df}{=} \{x : \forall i \in I \quad x \in A_i\} \quad \text{- wspólna część zbiorów}$$

**DEF.** (topologii w zbiorze)

$$X \neq \emptyset$$

Topologią  $\tau$  w zbiorze  $X$  nazywamy dowolną rodzinę zbiorów  $A \subset X$  spełniającą warunki:

- 1)  $\emptyset \in \tau, X \in \tau$
- 2)  $\forall i \in I A_i \in \tau \Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \in \tau$
- 3)  $\forall i = 1, \dots, n A_i \in \tau \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau$

Zbiory należące do  $\tau$  nazywamy zbiorami **otwartymi**.

**DEF.**  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna

Zbiór  $U \subset X$  nazywamy otwartym w  $(X, d) \stackrel{df}{\Leftrightarrow} U = \emptyset$  lub  $\forall x \in X \exists r > 0 K(x, r) \subset U$

**Spostrzeżenie**  $x_0 \in X, r > 0$

Kula  $K(x_0, r)$  jest zbiorem otwartym w  $(X, d)$ .

**Spostrzeżenie**  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

Każdy przedział  $(a, b)$  jest zbiorem otwartym (bo  $(a, b) = K(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2})$ )

**TW.**  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna

$\tau_d = \{U \subset X : U \text{ - otwarty w } (X, d)\}$  jest topologią na zbiorze  $X$  (nazywaną **topologią indukowaną przez metrykę  $d$** ).

**Dowód:**

- 1)  $\emptyset \in \tau_d$  (z definicji zbioru otwartego w p. metrycznej)  
 $X \in \tau_d$ , bo każda kula  $K(x, r) = \{x \in X : \dots\} \subset X$ .
- 2)  $\forall i \in I A_i \in \tau_d \Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \in \tau_d?$   
 $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau_d \Leftrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$  jest otwartym zbiorem w  $X$   
 $\stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall x \in \bigcup_{i \in I} A_i \exists r > 0 K(x, r) \subset \bigcup_{i \in I} A_i$   
Weźmy dowolny  $x \in \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \exists i_0 \in I x \in A_{i_0}$  - zbiór otwarty  
 $\Rightarrow \exists r_0 > 0 K(x, r_0) \subset A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ .
- 3)  $\forall i = 1, \dots, n A_i \in \tau_d \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau_d$   
Mamy pokazać, że  $\forall x \in \bigcap_{i=1}^n A_i \exists r > 0 K(x, r) \subset \bigcap_{i=1}^n A_i$   
Niech  $x \in \bigcap_{i=1}^n A_i \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, n x \in A_i \Leftrightarrow$   
 $\forall i = 1, \dots, n \exists r_i > 0 K(x, r_i) \subset A_i$ .  
Niech  $r = \min\{r_1, \dots, r_n\}$ . Wtedy  $K(x, r) \subset \bigcap_{i=1}^n A_i$ .

**PRZ.** Czy przecięcie dowolnej liczby zbiorów otwartych musi być otwarte?

$(\mathbb{R}, |\cdot|)$

$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}) = [0, 1]$  - nie jest otwarty

$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$  - nie jest otwarty

**Spostrzeżenie**  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna,  $\tau$  - topologia na  $X$

$$A \subset X$$

Wtedy  $\tau_A = \{A \cap U : U \in \tau\}$  jest topologią na zbiorze  $A$  (zwaną **topologią indukowaną przez  $\tau$  na zbiorze  $A$** ).

**DEF.**  $(X, \tau)$  - przestrzeń topologiczna  $A \subset X$

**Wnętrzem zbioru  $A$**  nazywamy największy (ze względu na zawieranie,  $\subset$ ) zbiór otwarty zawarty w  $A$ .

Ozn. **int**  $A$  - interior

**PRZ.**  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

$$A = [0, 1)$$

$$\text{int } A = (0, 1).$$

**DEF.**  $x_0 \in X$

**Otoczeniem** punktu  $x_0 \in X$  nazywamy dowolny zbiór otwarty zawierający punkt  $x_0$ .

Ozn. **ot** $(x_0)$  - zbiór wszystkich otoczeń punktu  $x_0$ .

**DEF.**  $B \subset X$ ,

Zbiór  $B$  nazywamy **domkniętym**  $\Leftrightarrow X \setminus B$  jest zbiorem otwartym.

**PRZ.**

$[a, b]$  - jest domknięty.  $(\mathbb{R} \setminus [a, b] = \underbrace{(-\infty, a)}_{\text{otwarty}} \cup \underbrace{(b, +\infty)}_{\text{otwarty}})$

$(-\infty, b]$  - jest domknięty

**TW.** (własności zbiorów domkniętych)

1)  $\emptyset, X$  - zbiory domknięte

2)  $\forall i \in I B_i$  - domknięte  $\Rightarrow \bigcap_{i \in I} B_i$  - domknięte

3)  $\forall i = 1, \dots, n B_i$  - domknięte  $\Rightarrow \bigcup_{i=1}^n B_i$  - domknięte

**PRZ.**  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}] = (0, 2)$  - otwarty

**DEF.**

**Domknięciem** zbioru  $A \subset X$  nazywamy najmniejszy zbiór domknięty zawierający zbiór  $A$ .

Ozn.  $\bar{A}$

**PRZ.**  $\overline{(0, 1)} = [0, 1]$

**DEF.** Punkt  $x_0 \in X$  nazywamy punktem **brzegowym** zbioru  $A \subset X \Leftrightarrow$

$$\forall r > 0 \quad K(x_0, r) \cap A \neq \emptyset \wedge K(x_0, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset.$$

**Brzegiem** zbioru  $A$  nazywamy zbiór wszystkich punktów brzegowych zbioru  $A$ .

Ozn.  $\partial A$ .

**PRZ.**  $\partial(0, 1) = \{0, 1\}$

**DEF.** Punkt  $x_0 \in X$  nazywamy punktem **skupienia** zbioru  $A \subset X \Leftrightarrow \forall r > 0 (K(x_0, r) \setminus \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset$ .

**PRZ.**

$A = \{x_0\}$  - brak punktów skupienia  
 $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ , 0 jest punktem skupienia  
 $A = (0, 1], [0, 1]$  - zbiór punktów skupienia

**TW.**  $A$  jest zbiorem domkniętym  $\Leftrightarrow$  gdy  $A$  zawiera wszystkie swoje punkty skupienia.

**DEF.** (granicy ciągu)

$(X, d)$  - przestrzeń metryczna  
 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X, g \in X$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, g) = 0$   
 $(\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 d(a_n, g) < \varepsilon)$

**PRZ.**  $(\mathbb{R}^2, d_e)$

$a_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}), g = (0, 0)$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, g) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(\frac{1}{n} - 0)^2 + (\frac{1}{n} - 0)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = (0, 0)$

**DEF.** (równoważności metryk)

$(X, d_1), (X, d_2)$  - przestrzenie metryczne  
Metryki  $d_1$  i  $d_2$  nazywamy **równoważnymi** na  $X \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  zbieżny w  $(X, d_1) \Leftrightarrow (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  zbieżny w  $(X, d_2)$ .

**PRZ.**  $X = \mathbb{R}, x_n = \frac{1}{n}$

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  jest zbieżny w  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  ale nie jest zbieżny w  $(\mathbb{R}, d_d)$ .

**DEF.** (jednostajnej równoważności metryk)

Metryki  $d_1$  i  $d_2$  nazywamy **jednostajnie równoważnymi** na  $X \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists m > 0 \exists M > 0 \forall x, y \in X d_1(x, y) \leq M d_2(x, y)$  i  $d_2(x, y) \leq m d_1(x, y)$ .

**TW.** Jeśli  $d_1$  i  $d_2$  są jednostajnie równoważne na  $X$ , to  $d_1$  i  $d_2$  są równoważne na  $X$ .

**TW.** Metryki: euklidesowa, taksówkowa i maksimum są jednostajnie równoważne (i równoważne) na  $\mathbb{R}^n$ .

**PRZ.** Pokazać jednostajną równoważność metryk  $d_e$  i  $d_t$  w  $\mathbb{R}^2$ .

**DEF.** (punktu skupienia)

$A \subset X$   
Punkt  $x_0 \in X$  nazywamy punktem skupienia zbioru  $A \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A \setminus \{x_0\} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

**DEF.** (ciągu Cauchy'ego)

Ciąg  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  jest ciągiem Cauchy'ego w  $(X, d) \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \geq n_0 d(a_n, a_m) < \varepsilon$ .

**TW.** Każdy ciąg zbieżny w  $(X, d)$  jest ciągiem Cauchy'ego w  $(X, d)$ .

**Dowód:**  $0 \leq d(a_n, a_m) \leq d(a_n, g) + d(a_m, g) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ .

**PRZ.**  $X = (0, 1]$ .

Ciąg  $a_n = \frac{1}{n}$  jest ciągiem Cauchy'ego w  $(X, |\cdot|)$  ale nie jest zbieżny w tej przestrzeni.

**DEF.** Przestrzeń metryczną  $(X, d)$  nazywamy **zupełną**  $\Leftrightarrow$  każdy ciąg Cauchy'ego elementów w tej przestrzeni jest zbieżny (do granicy należącej do tej przestrzeni).

**PRZ.** 1)  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  - przestrzeń zupełna

2)  $(\mathbb{R}^n, d)$ ,  $d \in \{d_e, d_t, d_m\}$  - przestrzeń zupełna

**DEF.** (zbioru zwartego)

$(X, d)$  - przestrzeń metryczna

Zbiór  $A \subset X$  nazywamy **zwartym**  $\Leftrightarrow \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A \exists (a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = g \in A$

(gdy z każdego ciągu elementów zbioru  $A$  można wybrać podciąg zbieżny do granicy należącej do  $A$ ).

**TW.**  $(\mathbb{R}^n, d)$ ,  $d \in \{d_e, d_t, d_m\}$

Zbiór  $A \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty  $\Leftrightarrow A$  jest zbiorem domkniętym i ograniczonym.

## ODWZOROWANIA CIĄGŁE

**DEF.**  $f: X \rightarrow Y$

$A \subset X$

**Obrazem zbioru**  $A$  poprzez odwzorowanie  $f$  nazywamy zbiór  $f[A] = \{f(x) \in Y : x \in A\}$

**DEF.**  $B \subset Y$

**Przeciwbildem zbioru**  $B$  poprzez odwzorowanie  $f$  nazywamy zbiór

$f^{-1}[B] = \{x \in X : f(x) \in B\}$

**PRZ.**  $f(x) = x^2$

$f[<-1, 2>] = <0, 4>$

$f^{-1}[<0, 4>] = <-2, 2>$

Ozn.  $x_0 \in X$ ,  $\tau_X$  - topologia na  $X$

$ot(x_0)$  - zbiór wszystkich otoczeń punktu  $x_0$

$\tau_Y$  - topologia na  $Y$

**DEF.** (granicy funkcji)

$f: X \rightarrow Y$

$x_0 \in X$ ,  $g \in Y$

1) Def. topologiczna (Cauchy'ego)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g \Leftrightarrow \forall V \in ot(g) \exists U \in ot(x_0) f[U \setminus \{x_0\}] \subset V$

2) Def. Cauchy'ego (w przestrzeniach metrycznych)

$(X, d)$ ,  $(Y, \rho)$  - przestrzenie metryczne

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X 0 < d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), g) < \varepsilon.$

$\forall K(g, \varepsilon) \exists K(x_0, \delta) f[K(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}] \subset K(g, \varepsilon)$

3) Def. Heinego (w przestrzeniach metrycznych)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g \Leftrightarrow \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X \setminus \{x_0\} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(f(x_n), g) = 0$

$(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \stackrel{(X, d)}{=} x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \stackrel{(Y, \rho)}{=} g)$

**DEF.** (funkcji ciągłej)

$$f : \underset{\tau_X}{X} \rightarrow \underset{\tau_Y}{Y},$$

- 1)  $f$  jest ciągła w zbiorze  $X \Leftrightarrow \forall V \in \tau_Y f^{-1}[V] \in \tau_X$   
(tzn. przeciwobraz dowolnego zbioru otwartego w zbiorze  $Y$  jest zbiorem otwartym w zbiorze  $X$ )
- 2)  $f$  jest ciągła w  $x_0 \in X \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- 3)  $f$  jest ciągła w zbiorze  $A \subset X \Leftrightarrow f$  jest ciągła w każdym punkcie  $x_0 \in A$

**DEF.**  $f : X \rightarrow Y, (X, d), (Y, \rho)$  - przestrzenie metryczne

Odwzorowanie  $f$  nazywamy **ograniczonym**  $\Leftrightarrow f[X]$  jest zbiorem ograniczonym (w przestrzeni  $(Y, \rho)$ ).

**TW.** (o zwartości obrazu funkcji ciągłej na zbiorze zwartym)

Zał:  $f : X \rightarrow Y, (X, d), (Y, \rho)$  - przestrzenie metryczne

$f$  ciągła na  $X$

$X$  - zbiór zwarty

Teza:  $f[X]$  jest zbiorem zwartym.

**Dowód:** Mamy pokazać, że  $\forall (y_n) \subset f[X] \exists (y_{n_k}) \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = y_0$ , gdzie  $y_0 \in f[X]$ .

Niech  $(y_n) \subset f[X]$  będzie dowolnym ciągiem.

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in X f(x_n) = y_n$$

$$(x_n) \subset X, X \text{ - zwarty} \Rightarrow \exists (x_{n_k}) \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0, x_0 \in X$$

$$y_{n_k} = f(x_{n_k})$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} y_{n_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) \stackrel{f \text{ ciągła}}{=} f(x_0) = y_0 \in f[X]. \square$$

**TW.** (Weierstrassa o osiągnięciu kresów)

Zał:  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna,  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

$X$  - zwarty

$f : X \rightarrow \mathbb{R}$  ciągła

Teza:

$$\exists x_1 \in X f(x_1) = \sup f[X]$$

$$\exists x_2 \in X f(x_2) = \inf f[X]$$

**Dowód:** Twierdzenie jest wnioskiem z tw. poprzedniego.

$f[X] \subset \mathbb{R}$  - jest zwarty (a z odpowiedniego tw. oznacza to, że  $f[X]$  jest zbiorem ograniczonym i domkniętym).

**DEF.**  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna

$X$  - nazywamy **niespójną**  $\Leftrightarrow \exists A_1, A_2 \in \tau_d$  <sup>otwarte</sup> takie, że

$$1) A_1 \cup A_2 = X$$

$$2) A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

$$3) A_1 \neq \emptyset, A_2 \neq \emptyset$$

**DEF.**  $X$  jest **spójna**  $\Leftrightarrow X$  nie jest niespójna.

**TW.** (o przyjmowaniu wartości pośrednich)

Zał:  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna spójna

$f: X \rightarrow \mathbb{R}$  ciągła

$x_1, x_2 \in X$   $f(x_1) < f(x_2)$

Teza:  $\forall c \in (f(x_1), f(x_2)) \exists x_0 \in X$   $f(x_0) = c$

**Dowód:** (nie wprost)

Przypuśćmy, że  $\exists c \in (f(x_1), f(x_2)) \forall x \in X$   $f(x) \neq c$

$X_1 = \{x \in X : f(x) < c\}$

$X_2 = \{x \in X : f(x) > c\}$

$X_1 = f^{-1}[(-\infty, c)] \in \tau_d$ , bo  $f$  ciągła i  $(-\infty, c)$  jest otwarty (w  $\mathbb{R}$ )

$X_2 = f^{-1}[(c, +\infty)] \in \tau_d$

$X = X_1 \cup X_2$

$X_1 \cap X_2 = \emptyset$

$X_1 \neq \emptyset \wedge X_2 \neq \emptyset$

$\left. \begin{array}{l} X = X_1 \cup X_2 \\ X_1 \cap X_2 = \emptyset \\ X_1 \neq \emptyset \wedge X_2 \neq \emptyset \end{array} \right\} \Rightarrow X$  jest niespójna, sprzeczność z założeniem.

**TW.** (o własności Darboux)

Zał:  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  ciągła

$A$  - odcinek (przedział)  $\subset \mathbb{R}$

$x_1, x_2 \in A$   $f(x_1) < f(x_2)$

Teza:  $\forall c \in (f(x_1), f(x_2)) \exists x_0 \in (x_1, x_2)$   $f(x_0) = c$

**Dowód:** Stosujemy poprzednie twierdzenie dla  $X = [x_1, x_2]$ , który jest spójny.

**TW.** (o spójności obrazu zbioru spójnego)

Zał:  $f: X \rightarrow Y$ ,  $(X, d)$ ,  $(Y, \rho)$  - przestrzenie metryczne

$X$  - spójna

$f: X \rightarrow Y$  - ciągła

Teza:  $f[X]$  jest spójny.

**Dowód:** (nie wprost)

$Y_1, Y_2 \in \tau_\rho$

otwarte w  $Y$

$Y_1 \cup Y_2 = f[X]$  (- jest niespójny)

$Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$

$Y_1 \neq \emptyset, Y_2 \neq \emptyset$

$X_1 \stackrel{df}{=} f^{-1}[Y_1]$  } - otwarte  $\in \tau_d$ , bo  $Y_i$  - otwarte i  $f$  ciągła

$X_2 = f^{-1}[Y_2]$  }

$X_i \neq \emptyset$  (bo  $Y_i \neq \emptyset$ )

$Y_1 \cap Y_2 = \emptyset \Rightarrow X_1 \cap X_2 = \emptyset$

$Y_1 \cup Y_2 = f[X] \Rightarrow X_1 \cup X_2 = X$

$\left. \begin{array}{l} X_i \neq \emptyset \text{ (bo } Y_i \neq \emptyset) \\ Y_1 \cap Y_2 = \emptyset \Rightarrow X_1 \cap X_2 = \emptyset \\ Y_1 \cup Y_2 = f[X] \Rightarrow X_1 \cup X_2 = X \end{array} \right\} \Rightarrow X$  jest niespójna, sprzeczność z założeniem.

**WN.**

Zał:  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  - ciągła

$A$  - odcinek

Teza:  $f[A]$  - odcinek

**WN.**

Zał:  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  - ciągła

Teza:  $f[[a, b]] = [c, d]$ .



## PRZESTRZENIE UNORMOWANE

$(X, K, +, \cdot)$  - przestrzeń wektorowa,  $K = \mathbb{R} \vee K = \mathbb{C}$

**DEF.** Funkcję  $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$  nazywamy **normą** w  $X \stackrel{df}{\Leftrightarrow}$

- 1)  $\forall x \in X \|x\| \geq 0$
- 2)  $\forall \alpha \in K \forall x \in X \|\alpha \cdot x\| = |\alpha| \|x\|$  - jednorodność normy
- 3)  $\forall x, y \in X \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  - warunek trójkąta
- 4)  $\forall x \in X \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$

Parę  $(X, \|\cdot\|)$  nazywamy przestrzenią unormowaną.

**PRZ.**  $X = \mathbb{R}$ ,  $\|x\| = |x|$ ,  $K = \mathbb{R}$

**PRZ.**  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $K = \mathbb{R}$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$\|x\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} - \text{euklidesowa}$$

$$\|x\|_t = \sum_{i=1}^n |x_i| - \text{taksówkowa}$$

$$\|x\|_m = \max\{|x_i| : i = 1, \dots, n\} - \text{maksimum}$$

**TW.** (każda przestrzeń unormowana jest metryczna)

Zał:  $(X, \|\cdot\|)$  - przestrzeń unormowana

$x, y \in X$   $d(x, y) \stackrel{df}{=} \|x - y\|$  - metryka indukowana przez normę

Teza:  $(X, d)$  - przestrzeń metryczna

**DEF.** Przestrzeń unormowaną i zupełną nazywamy przestrzenią **Banacha**.

**PRZ.**  $\mathbb{R}^n$  z normą euklidesową, taksówkową i maksimum jest przestrzenią Banacha.

## PRZESTRZENIE UNITARNE

**DEF.**  $(X, K, +, \cdot)$  - przestrzeń wektorowa,  $K = \mathbb{R} \vee K = \mathbb{C}$

Funkcję  $\circ : X \times X \rightarrow K$  nazywamy **iloczynem skalarnym**  $\stackrel{df}{\Leftrightarrow}$

- 1)  $\forall x \in X x \circ x \geq 0$
- 2)  $\forall x, y \in X x \circ y = \overline{y \circ x}$
- 3)  $\forall x, y, z \in X (x + y) \circ z = x \circ z + y \circ z$
- 4)  $\forall x, y \in X \forall \alpha \in K (\alpha x) \circ y = \alpha(x \circ y)$
- 5)  $\forall x \in X x \circ x = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$

$(X, \circ)$  - przestrzeń unitarna.

**PRZ.**  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$x \circ y = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i - \text{iloczyn skalarny (standardowy) w } \mathbb{R}^n.$$

**PRZ.** Pokazać, że  $(x_1, y_1) \circ (x_2, y_2) = x_1x_2 + y_1y_2$  jest iloczynem skalarnym w  $\mathbb{R}^2$ .

**PRZ.**

$L^2[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : \int_{[a, b]} f^2(x) dx < +\infty\}$  - zbiór funkcji całkowalnych z kwadratem

$f \circ g = \int_{[a, b]} f(x) \cdot g(x) dx$  jest iloczynem skalarnym w  $L^2[a, b]$ .

**TW.** Każda przestrzeń unitarna jest przestrzenią unormowaną (z  $\|x\| \stackrel{df}{=} \sqrt{x \circ x}$ ).

**DEF.** Przestrzeń unitarną zupełną nazywamy **przestrzenią Hilberta**.

**PRZ.**  $\mathbb{R}^n$  ze standardowym iloczynem skalarnym jest przestrzenią Hilberta.